





\$.1178.


## GLIATTI D E L L' ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DISIENA

D E T T A

DE FISIO-CRITICI

M O II.




SIENA £ 15

Appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico L' A II N O M.DC.CLXIII.

Per reanced o Rolli Stampatore.

CON FACOLTA DE SUPERIORI.





# TAVOLA

## DELLE MEMORIE

C Aggio di Osservazioni intorno ad alcuni prodot-		
ti naturali fatte a Prata, e ad altri luoghi del-		
la Maremma di Siena dal Sig. GIUSETTE		
BALDASSARRI, Dottore in Medicina, e Pro-		
fessore pubblica di Storia Naturale.	c.	τ.
Analisi Fisico-Chimica di un' acqua minerale, che		
scaturisce in vicinanza di Siena, chiamata l'		
Acqua Borra, del MEDESIMO.	C.	44.
Analisi della Termale di S. Casciano fatta dal Sig.		
OTTAVIO NERUCCI, Dottore, e Pubblico		
Profesore in Medicina Teorica.	c.	79.
Methodus utendi aquis S. Cassiani in Senensi ditio-		"
ne quam olim Dominus JOSEPHUS NENCI pu-		
blieus medicina Professor data ad Nobilissimum,		
Amplissimumque Virum Epistola perscripsis. a	c.	100.
Oservazioni intorno alla declinazione della Calami-		
ta fatte in Roma dal M.R.P. GIUSEPPE ASCLE-		
PI della Compagnia di Gesù, Lettore di Mate-		
matica nel Collegio Romano.	Cs	IO7.
Risposta alla sesta Questione, che il Newton pro-		,
pone ai Filosofi nel fine della sua Ottica, del Sig.		
The second secon	C	126.
Porta Armonica di M. MILLER.	c.	132-
Tentativo Fisico-meccanico sulla resistenza de muri		
contro la spinta de terreni, del Sig. ANTONIO		
LORGNA, Professore di Matematica nel pubblico		
C 11 ' 2 6'1' 1' 77	c.	155.
Storia Medica concernente la descrizione di una		
malattia terminata nella morte colla Sezione del		
C		

Cadavere, del Sig. FERDINANDO MAN-
NOTTI, Dottore in Medicina. a c. 176
Mors repentina ex disrupta splenica arteria. Obser-
vatio JOSEPHI NENCI, publ. Medic. Traff.
Profess. a c. 199
Storia del Sig. ANGELO MANCINI, Professore
di Chirurgia nel Cesareo Spedale di S. Maria
della Scala concernente una grave ferita di testa
con offesa delle parti interne, e Riflessioni del
Sig. GIACOMO BORSELLI, Dottore in Medi-
cina, sopra la riferita Storia del Sig. Mancini. a c. 198
Storia del Sig. ANTON FILIPPO LANDI, In-
fermiere del Cesareo Spedale di S. Maria della
Scala concernente l'ingresso di un pezzo di palo
nel Ventre. a c. 203
Storia del MEDESIMO concernente la frattura
sguainata dei due fucili della gamba sinistra col
totale slogamento dei malleoli. a c. 207
Descrizione di uno stravagante delirio in un Uomo,
in cui si trovò dopo la di lui morte un tumore im-
piantato nel cervello, del Sig.VINCENZO GAL-
LI, Professore de Chirurgia, e Settore pubblico
della Università di Siena. a c. 210
Storia Chirurgica di un' Ernia intestinale completa
incarcerata, perfettamente guarita coll' operazio-
ne del taglio, del MEDESIMO . a c. 213.
JANI PLANCI Ariminensis de Duplici Tethyi ge-
nere, & de Manu Marina ad Pium Jannellium
Senensem, Academicum Physiocriticum. a c. 217
Osservazioni sulla Caduta delle piogge nella Città
di Siena dall'anno 1755. al 1763. a c. 225.
Problema sciolto dal Sig. Dot. CANDIDO PISTOJ. a c. 235.
• 16





#### SAGGIO DI OSSERVAZIONI

INTORNO AD ALCUNI PRODOTTI NATURALI FATTE A PRATA, ED ALTRI LUOGHI DELLA MAREMMA DI SIENA

Dal Signor

### GIUSEPPE BALDASSARRI

DOTTORE IN MEDICINA, B PROFESSORE PUBBLICO DI STORIA NATURALE.



Ella relazione, che intraprendo di alcuni prodotti naturali, che si trovano in certi luoghi della Maremma di Siena, non intendo tessere di essi una compiuta Istoria, ma sol tanto rilevare alcune particolari osservazioni da me satte sopra i medesimi in occasione di un mio viaggio per quelle parti, di-

retto a solo fine di vedere sul luogo nativo la Miniera del Rame, che si estrae nelle pertinenze di Montieri.

Nel giorno per tanto 27. di Giugno del 1762. partito da Siena m' incamminai alla volta di Prata di Maremma, e proleguendo a dirittura il mio viaggio, po-

che

che cose, e di non molto rilievo mi si presentarono per la strada da osservarsi. Sosamente in vicinanza della celebre Badia di S. Galgano presso ad un Podere detto Ticchiano raccolsi alcuni pezzi di Gesso filamentoso, chiamato dal Sig. Vallerio nella sua Mineralogia T. 1. Clas 2. Gen. 9. Spec. 49. Gypsum crystallisatum filamentosum, Gypsum Capillare Kentmanni, Drusa selenitica. Questo Gesso è chiaro, e trasparente, ed è composto da una congerie di filamenti disposti con ordine parallelo frà loro, e posano ad angoli retti sul piano delle sue lastre. Esaminato da me con qualche diligenza non seppi ritrovare nelle sue più piccole particelle visibili indizio alcuno, o vestigio di figura romboidale, conforme è solito osservarsi ordinariamente negli altri Gessi chiari, e trasparenti. La sera giunsi in Prata, e la matrina del dì 28. mi portai a vedere la Cava del Rame nella Mersa, Torrente, che hà la sua origine dalla parte di Levante di Prata, & indi scorre in un' prosondo, e tor-tuoso Canale scavato in mezzo ad altissimi monti vestiti di bosco da Mezzo giorno a Tramontana. Il luogo della Cava è appunto in questo profondo Canale della Mersa accanto alla strada, che da Siena conduce a Prata, ed immediatamente sotto la Pescaja di un Mulino detto del Guscione. Quivi si osservano tre Cave, o Cunicoli scavati orizzontalmente, dai quali estraesi la Miniera del Rame, e due di questi corrispondono nell' alveo della Mersa sotto appunto la Pescaja suddetta, e sono diretti da Scirocco a Maestrale; il terzo poi è scavato sopra i primi due, e si distende da Greço a Libeccio. Altre abitazioni quì non sono, che un' semplice Tugurio per comodo dei Cavatori, ed una Capanna, sotto la quale si stritola la Miniera per poscia lavarla, e pulirla dalle arene, e da altre materie, che sono di preciso impedimento per la susione del metallo. Ritrovai qui ammassata gran quantità della Miniera fud-

suddetta di già estratta dalle mentovate Cave, quivi reflata senza essere stata posta in opra a motivo di essersene da alcuni Anni in quà, non sò per qual causa, sospesa la fusione. Senza bisogno dunque di entrare nel sotterraneo orrore di quelle Caverne potei a mio bell'agio considerare allo scoperto la qualità della Miniera suddetta, la sua matrice, ed il suo vario mescuglio con altre sostanze minerali. Sarebbe cosa difficile il descriverne minutamente tutte le particolarità, onde crederò bastante l'avvertire le circostanze principali, e di maggiore rilievo. Questa Miniera dunque è di colore giallo, e vivo, e molto simile a quello dell' oro, e dal Sig. Vallerio chiamasi Cuprum sulphure, & ferro mineralisatum, minera colore aureo, vel variegato nitente. Minera cupri flava. Chalcopyrites. Pyrites flavus Mineral. T. 1. Clas 3. Gen. 47. Non manca però questa Miniera di mostrare in qualche luogo alcune macchiette rosse, violacee, e cerulee. Le porzioni più ricche di essa sono di una grana fina, uniforme, similare, e di un giallo continuato. Nelle meno ricche poi si osserva la materia metallica divisa, e spartita in varie areole, e gruppi tramezzati dalla sostanza della matrice, in cui si trova incorporata. Frequentemente però la pura materia metallica è framischiata di Marcassite, o Piriti di figura ordinariamente cubica, ed il loro colore o è giallo, e simile a quello della Miniera del Rame, o biancaltro a guisa del colore dello stagno, e talvolta nero, e ferrigno. Trà quegli ammassamenti di Miniera vi sono ancora framischiate non piccole masse di altra Marcassita di colore parimente inero, ma che in alcune punte, e facce è lucida, e risplendente, ed è la sua figura simile a quella delineata dal Mercati nella sua Metalloteca Vaticana pag. 373. e da esso chiamata Pyriter Botryites. Queste masse di Marcassita sormano nella superficie varie, e diverse papille, distinte poi da altre papillette minori, e nell'interno

no vi si osservano a luogo a luogo alcune cavità ricoperte nella superficie di vive, e lucide punte piriticose a guisa dei ventri gemmati. Altra massa di questa incontrai, in cui si erano formati alcuni tuboli rotondi, internamente vuoti, aperti in fondo, e diretti con ordine parallelo verso la stessa parte, simili a quei cannelli, o stirie, che si producono pendenti dalle volte delle Grotte sotterranee. In altro pezzo di questa stessa Marcassita viddi espressi a basso rilievo alcuni delineamenti di alberetti, onde poteva giustamente chia-

marsi Pirite dendriforme.

E' cosa notissima, che le Marcassite sono un composto di molto Zolfo, e di una porzione di Metallo, quale suole essere per lo più il Ferro, o il Rame, oppure un mescuglio dell' uno, e dell' altro. Il colore giallo viene comunemente creduto per segno di Marcassita di Rame, ed il nero, e bianco per segno di Marcassita di Ferro. Oltre a ciò potrebbe aggiugnersi una ollervazione del Sig. Hill, il quale in una Lettera scritta a M. Secondat [ observat. de Physiq. ] avverte, che quando le Marcassite sono di figura cubica, è seguo, che in esse predominano il Ferro, ed il Rame uniti insieme. Fondato sù questi principi potrei sicuramente inferire, che in alcune Piriti, delle quali ho fatto menzione, predomina il Ferro, in altre il Rame, ed in altre l'uno, e l'altro combinati insieme. Ma independentemente da questi dati mi si scopre per altra parte la verità della medesima conseguenza. Nell'osservare questi ammassamenti di Miniera mi accorsi ellervi fiorita sopra gran quantità di vetrioli di colori diversi, cioè il ceruleo, il verde, il bianco, ed il misto di verde, e ceruleo, e di questi stessi colori se ne vedevano le tracce nelle pietre inferiori di quello ammassamento, e nel terreno sottoposto macchiato ancor esso da' medesimi, per essere stati antecedentemente i vetrioli disciolti, e trasportati dalle acque piovane. Or siccome alcune Marcassite collo stare esposte all' aria aperta si risolvono in vetriolo, e siccome il vetriolo ceruleo nasce dalla erosione del Rame fatta dall' acido, il verde detto marziale
da quella del Ferro, ed il verde-ceruleo nominato marziale-venereo da quella del Ferro, e del Rame uniti insieme, da ciò senza equivoco si ricava, che nelle Marcassite framischiate con questa Miniera vi predomini il Rame, ed il
Ferro, ora separati, ed ora uniti insieme, e combinati. Del
vetriolo bianco poi averò campo di parlare in appresso.

Le matrici, o pietre, nelle quali non meno la materia metallica del Rame, che le sostanze piriticose sono inserite, e incorporate, quantunque a prima vista sembrino molto diverse frà loro, nondimeno attentamente esaminate penso, che a due sole specie debbano generalmente ridursi, e che dalla sola varietà de' colori nasca la loro moltiplice apparente diversità. La prima di queste è la materia del Quarzo, o sia Cristallo Montano, e la seconda una terra argillosa ridotta a consistenza di pietra talvolta sola, e talvolta

mescolata colle stesse concrezioni quarzose.

In ordine al Quarzo, o Cristallo di Monte, esso molto quivi predomina, e buona parte della Miniera, e delle sostanze piriticose vedesi mescolata, ed inserita nel medesimo. Comparisce questo o a guisa di massa informe, o stretto, e compresso a guisa di rilegatura senza avere potuto spiegare le sue piramidi, oppure si vede ottimamente cristallizzato o nella superficie delle concrezioni, o ne i vani interni delle medesime formandovi tanti ventri gemmati. Bene spesso poi si scorge un mitto di parti metalliche, e quarzose tramezzate si loro, ed in quei vani si osserva un vaghissimo mescuglio d'ingemmamenti brillanti delle une, e delle altre, dilettevole molto a vedersi.

Il Sig. Vallerio nella sua Mineralogia T. 1. pag. 201. alla terza osservazione sopra il Quarzo dice, che nei luoghi,

ne' quali si trova, dee sperarsi di trovarvi ancora delle Miniere, perchè il Quarzo è come la matrice de' metalli. In questi luoghi osservo la regola verificata, essendovi in essi

gran quantità di Quarzo, e di materia metallica.

L'altra specie di matrice consiste in una Argilla indurita a consistenza di Pietra, sotto il qual nome intendo con i Naturalisti una terra pingue, tenace, non friabile, e che al tatto comparisce untuosa, come se fusse imbevuta di olio, o di altra pinguedine, e disferisce dalle terre bolari per non avere la proprietà di attaccarsi come esse alla lingua. Questa, di cui parlo, è di colore piombato, se ne trova però in questi luoghi una quantità considerabile di varj colori, e petrisicata serve di matrice a quelle sostanze metalliche, o sola, o complicata col Quarzo.

Benche queste due specie di petrificazioni siano quelle, che generalmente parlando contengono in se le materie metalliche, tuttavia a prima vista compariscono di specie alquanto diverse; ma questa apparente diversità deriva unicamente dalla varietà de' colori, de' quali queste due petrificazioni sono macchiate a cagione dell' ocra, della rubrica fabrile, ed anco di altre terre con esse rimescolate. Da ciò deriva ancora, che alcune di queste piramidi di Quarzo restano colorite di giallo, o di un rosso alquanto smorto.

Nello scavo satto avanti l' imboccatura del terzo Cunicolo accennato notai a mano destra alcuni strati di Miniera
con poco Rame, e molta Marcassita in pietra di colore piombato, e tabaccato con venature di Quarzo, e suoi Cristalli,
e a mano sinistra corrispondevano a questi primi altri strati di Argilla dei suddetti due colori, in cui erano inserite
le Marcassite, e la Miniera del Rame, e vi osservai con mio
particolare piacere i primi rudimenti del Cristallo di Monte nascente, che consistevano in tanti teneri, gentilissimi, e
friabili ingemmamenti, i quali istropicciati tra le dita con
som-

somma facilità si stritolavano. Di questa Argilla una porzione era tenera, e molle, ed altra aveva acquistato qualche grado di durezza petrosa, e poteva con ragione chiamarsis Argilla semipetrificata, e l'una, e l'altra era alquanto imbrattata da una fanghiglia di ocra di colore ranciato carico. Questa osservazione mi confermò nel sentimento poco avanti formato, che le matrici di queste sostanze metalliche siano il Quarzo, e l'Argilla, e che queste due materie restino a luogo a luogo macchiate dal colore dell'ocra.

Il Sig Domenico Niccoletti Sanese, mio Scolare, e Giovine, che nutre un' genio particolare per le scienze, e specialmente per la Storia Naturale, e che mi favori della sua compagnia in questo viaggio, entrò colla scorta di un' Uomo custode di queste Miniere, e di un lume dentro a quelle due Cave, che sboccano nel Letro della Mersa, non potendosi entrare nella terza per eslere ripiena di acqua, e portò fuori del Vetriolo bianco, verde, e ceruleo, che trovò attaccato a guifa di crosta alla Miniera, alle volte, e alle pareti di quelle Cave nella forma stessa, che vi si trovano le stalattiti, onde potea chiamarsi col Sig. Vallerio Vieriolum stalacticum. Oltre a questo vetriolo vi trovò ancora una terra bianchissima, e molto gentile aspersa di minutissime Marcassite di colore di oro, e che qualche poco si attacca alla lingua a guisa di bolo. Di questa terra ne fui favorito di una mostra cinque Anni sono dal celebre Sig. Giovanni Arduino, foggetto noto alla Repubblica Letteraria, ed allora Direttore di queste Miniere, dandomi di essa la seguente notizia, Latte minerale [ terra così chiamata, e con varj altri nomi] trovasi insieme colle sopradette Miniere trà gli screpoli, e le senditure della matrice delle medesime. E un' minerale in Italia rarissimo, ed ba una proprietà singolare, che posto in fuoco veemente senza mutare la sua esterna figura accidentale, trovast internamente mutato in un vetro di Porcellana.

Per tutta questa Valle della Mersa cominciando dalla Cava fino ad una certa altezza nel salire verso Prata trovasi una indicibile quantità di certa pietra Scissile, o Lavagna disposta a massi, e filoni. Il suo fondo è ordinariamente piombato, ma viene distinto da particelle, o miche di Talco di colore argentino, le quali non sono manifestamente separate le une dalle altre, conforme accade in altre pietre, e specialmente nelle arenarie, ma si distendono con una quasi uniforme continuazione, mostrando in certo modo una leggiera tintura di argento, e rassomigliando le squamme de' Pesci. Buona parte di quelta pietra Scissile vedesi macchiata di colore di croco-marziale più o meno cupo, e talvolta ancora di rosso, o come di Acciaro imbrunito, ed in alcune vi è complicata qualche porzione della Miniera di Rame di colore di oro; perloche dalla varia mescolanza di questi colori, e dallo splendore compartitole dalla fostanza del Talco ne risultano bellissime mostre, che sembrano inverniciate con mescuglio d' oro, e di argento. Sono quelle Pietre di una durezza maggiore, e minore, e più, o meno scissili, e talune si sfaldano in laminette sottili quanto la carta. Tra queste lamine vi è talora di mezzo la sostanza del Quarzo, e spesso ancora quella del Ferro.

Sulla Riva della Mersa vedesi in qualche sito questa Lavagna disposta a siloni orizzontali, rassomigliando un muro sabbricato di mattoni, e trà essi gemono alcuni stillicidij di acqua con ocra ranciata, ch' è quell' appunto, che la tinge del divisato colore. Questa ocra stessa scolando nella Mersa, e mescolata con l'acqua della medesima colorisce di ranciato tutte le pietre esistenti in quel Letto. In qualche luogo, e specialmente accanto l'imboccatura dei due Cunicoli della Mersa s'incontrano ammassi petrificati di un'ampio volume, che altro non sono, che una congerie di rottami di questa Lavagna, e di altre

pietre

mente accanto l' imboccatura dei due Cunicoli della Mersa, s' incontrano ammassi petrificati di un' ampio volume, che altro non sono, che una congerie di rottami di questa Lavagna, e di altre pietre legati dalla Ocra stessa, che ha fatto l' ussizio di sugo petrificante. Nell' osservare i predetti siloni notai, che alcune di quelle lastre non avevano per ancora acquistata una consistenza totale, ma rassembravano una tenerissima pietra, che stropicciata tra le dita si risol-

veva in una molle, e tenera Argilla.

Il Sig. Giovanni Arduino nella sua prima Lettera al Sig. Cav. Vallisnieri, stampata nel 6. Tomo della nuova raccolta di Opuscoli del Padre Calogerà, parlando di questa Pietra scissile, che si trova nel Monte di Recoaro nel Vicentino, da cui scaturisce la famosa acqua Acidula di tal nome, dice, che la base visibile non solo di esso Monte, ma quella ancora di molti altri dal medesimo osservati tanto in Italia, quanto ancora in Germania, costa di questa specie di Pietre, sotto di cui non ha mai potuto vedere strati di pietre differenti. Lo stesso sembra accadere quì alla Mersa, poiche questa Pietra trovasi in gran quantità ne i luoghi più profondi di questo Torrente, il cui fondo vedesi a luogo a luogo dalla medesima lastricato.

Parmi di poter credere, che Vannoccio Biringuccio abbia costituita questa pietra come un' indizio di Miniera di Rame, allor quando nel parlare de i segni di questa Vena metallica disse nella sua Pirotechnia Cap. 3. E acciò abbiate certezza dove tal Miniera sia [oltre a più segnali, che vi ho mossirato] non voglio mancare di dirvi, che poniate cura per trovarla alli sassi scoperti del Monte, infra i quali vi si mostreranno certi

lustri, come di Talco.

Di questa Lavagna sono sabbricati i Forni del Botro a Cagnano, che servono per la sussone del Rame, poichè redel fuoco usato per detta fusione: qual fuoco è solito continuarsi per otto, dieci, ed anche dodici giorni. Estinto questo si trova la Lavagna intatta, e senza cangiamento veruno; ma sopragiugnendo l' umido, e il freddo si sfalda in sottilissime lamine della grossezza di quella della carta. Le macchie però del Croco Marziale divengono di un colore vivo rosseggiante, essetto solito a prodursi dalla forza del fuoco sull' Ocra. Mi sarei facilmente indotto a credere, che questa Pietra susse Apira, o Refrattaria, cioè incapace di essere ridotta in Vetro, o Calcina da qualunque violentissimo suoco ordinario, ma il Sig. Arduino nella sua seconda Lettera asserisce, che quantunque resista molto alla violenza del suoco, nondimeno è vetriscibile.

Intanto prima d'inoltrarmi alla descrizione di altre osservazioni sarà bene il fare qualche rissessione intorno alle precedenti ad oggetto di dedurne a guisa di Fisici corollari, al-

cune conseguenze.

In mezzo a tanti benefizj, che ridondano alle cose create dalla sostanza dell' acqua, uno è quello di servire essa di veicolo alle materie destinate per la vita, per il nutrimento, per la conservazione, e per la propagazione tanto degli Animali, quanto de' Vegetabili. Ma non finisce qui l' uso, che la medessima presti in questo genere, imperoche dee considerarsi come veicolo ancora delle sostanze minerali per le viscere de' Monti, contribuendo in tal guisa alla formazione delle pietre, de' metalli, de' mezzi metalli, e di tante altre innumerabili concrezioni sossili, e minerali, onde dee giustamente l' acqua riguardarsi come il veicolo universale. Questa dunque trapelando a poco a poco, e lentamente trà i sottilishmi meati delle diverse terre, e strati, che compongono i Monti, ne rade, e distacca vari, e diversi principi, quali seco trasporta, e poscia questi in mol-

te guise uniti, congiunti, e combinati, costituisce la serie di tante concrezioni, e le depone o allo scoperto, o ne' vani, e senditure de Monti, oppure in altre appropriate

terre, e matrici.

In tal guisa osserviamo prodursi giornalmente i Tartari, i Travertini, le Osteocolle, le Seleniti, i Spati, i Quarzi, le Stalattiti, e tante altre produzioni petrose; e se da esse costituite ancora in forma liquida sono condensate le terre, o legate altre pietre disciolte, o penetrate le sostanze di altri corpi, nascono gli Alabastri, i Marmi, i Gessi, i Diaspri, i Paragoni, i Calcedonj, le Breccie &c. e si convertono in sostanza petrosa i Legni, le Ossa degli animali, le Conchiglie &c. Ma non si restringe in questi soli limiti l'efficacia dell'acqua; Si estende ancora a i metalli, ai mezzi metalli, alle Piriti, a i Zossi, ed ai Sali, servendo essa in tal guisa di veicolo universale ancora ad altri sossili, e minerali.

Sono i metalli un composto di ascune terre proprie a ciascuna specie di essi, e di una sostanza flogistica, o infiammabile, che li compartisce lo splendore metallico, e li rende capaci ad essere distesi sotto i colpi del martello. Le diverse specie de' metalli bene spesso si uniscono insieme, e si combinano nelle Miniere mischiandosi intimamente fra loro, e nel loro intrinseco mescuglio s' insinuano ancora altri minerali, tra quali segnatamente sono lo Zolfo, e l' Arsenico. In sequela di ciòne deriva, che incontrando l'acqua, che trapela per le viscere di questi nostri Monti, quella terra specifica, che serve di base per il Rame, e la materia flogistica, trasporta seco questi due principi, e poscia li unisce, e li combina, dalla qual combinazione risulta poi la produzione del Rame. Ma siccome vi sono ancora in questo Monte delle terre ferrigne, chiaramente indicate dalla copiosa Ocra ranciata, che qui si osserva, perciò nella stessa gui-

B 2

sa si genera ancora il Ferro, quale bene spesso si unisce col Rame, per essere questo suscettibile di una intrinseca mer scolanza del primo. Lo Zolso, che è un' composto di acido vetriolico, e di sostanza flogistica, nella stessa guisa qui vi prodotto, qualunque volta si combina con scarsa porzione di parti metalliche di Ferro, o di Rame, o delle une, e delle altre unite insieme, derivano le Marcassite Marziali, Veneree, o Marziali-veneree, che quivi ho detto ritrovarsi.

Avvertiscono i Metallurgi, che la mescolanza del Ferro, e dello Zosso colla miniera del Rame è la cagione, per cui il Regolo, che si ricava dalla prima susione di essa, è di un colore nero, ed oscuro, nè può distendersi sotto al martello, poichè non è quello un Rame puro, ma un mescuglio di Rame con altre sostanze metalliche, e minerali, che erano mescolate nella Miniera, e perciò bisognano replicate susioni ad oggetto di separarne le materie eterogenee, e principalmente il Ferro, e lo Zosso. Lo stesso accade di questa nostra Miniera, poiche come dirò parlando del Botro a Cagnano, dove sondevasi la medesima, ritrovai, che detto Regolo della prima susione, chiamato Metallina, o Lapis cupreus, era appunto della descritta qualità, e che per averne il Rame puro, bisogna replicare più volte la susione.

In compagnia del flogistico, dell'acido minerale, e delle terre metalliche, l'acqua, che trapela per le viscere di
questi monti, contiene ancora la materia atta a formare il
Cristallo montano; ma siccome questa non può intimamente associarsi con i metalli, colle Mircassite, e col Zosfo,
quindi è, che nell'atto, che le diverse materie elementari si
condensano ne i loro respettivi prodotti, il Quarzo si rappiglia separatamente dalle sostanze metalliche, e queste da
quello. Di qui deriva, che i gruppi, le venature, e gl'ingemmamenti risultano separati gli uni dagli altri, benchè

poiti

posti a mutuo contatto. Ed ecco la ragione, perchè nelle cavità di questa Miniera, disposte a foggia di ventri gemmati, si vedono gl' ingemmamenti del Quarzo, e della Piriti, distinti fra loro, e separati nella maniera stessa, che sciolti due sali di specie differente nell' acqua, si cristallizzano questi separatamente, ripigliando ciascuno la sua pro-

pria figura specifica.

La sostanza metallica del Rame, e quella della Piriti si condensa talvolta dentro una massa di molle; e tenera Argillo, a cui poscia accoppiato il sugo petrificante del Quarzo l'indurisce a consistenza di pietra, che resta bene spesso macchiata di vario colore a motivo del Croco Marziale più, o meno carico, che vi si mescola, secondo che mostrano le osservazioni sopradescritte, e fatte nello scavo avanti l'imboccatura del terzo Cunicolo.

Siami adesso permesso l'avanzare una mia congettura in ordine al Quarzo, o Cristallo Montano, di cui penso, che l' Argilla ne sia la base, 'ed il componente principale. Alcune concrezioni analoghe al Quarzo, come i Spati, le Seleniti, i Gessi, i Talchi, le Stalattiti, ed altre consimili, si ripongono in oggi dai Chimici, e dai Naturalisti sotto il genere de i Sali, da essi chiamati Selenitici, principalmente perche esse sono prodotte a guisa di un sale da un acido, e da una sostanza terrestre, il che ad evidenza dimostrano nello scomporre quelle concrezioni con un flogistico, e formarne uno Zolfo artificiale. Lo stesso dee intendersi ancora del Quarzo, dovendosi giudicare una concrezione fatta dall' acido minerale unito ad una qualche terra speciale. Ora che quella terra sia appunto l'Argilla, di cui ho finora parlato, multe ragioni, e motivi me lo fanno credere. Potrei in primo luogo addurne per argomento la proprietà comune, che hanno il Quarzo, e l'Argilla di essere sostanze vetriscibili, ma comprendo, che non sarebbe quelta una ragione battance, imperoche le stesse terre Calcarie, benchè per se medesime siano incapaci di cangiarsi in Vetro, pure con l'aggiunta di un sale divengono ancor esse vetriscibili. Dirò dunque, che l' aver trovato gl' ingemmamenti del Quarzo teneri, friabili, e nascenti dentro una tenera massa di Argilla, quasi che avessi colto, come suol dirsi, la natura sul fatto, me ne somministra una prova molto evidente. In secondo luogo dopo di aver preparato il Cristallo di Monte con moltissime calcinazioni estintorie, l' ho alla fine ridotto in una terra molle, e pastosa come l' Argilla. Per terzo finalmente mi porge motivo di crederlo una osservazione fatta nella dirupata sponda di un fosso situato dalla parte di Libeccio di Prata, chiamato il Botro del Venajo, nella quale ritrovai molte glebe di terra poco meno che impietrita, le quali nel centro contengono un nocciolo di Quarzo accagliato, e questo per ogni parte viene abbracciato da una crosta dura di Ocra di colore giallo chiaro, e ad ella succede altra crosta esteriore di Argilla alquanto pastosa. Quì ebbi luogo di persuadermi, che l'Argilla predetta avesse somministrato uno de' principali componenti del Quarzo raccolto nel centro. L' Ocra, e le altre terre ferrigne hanno la proprietà di formare alcune croste, lasciando nel mezzo alcuni vani, e cavità, come vedesi nelle Geodi, nelle Etiti, e in altre simili concrezioni, il che con vari fatti ampiamente moltrai nel Trattato sopra le Acque minerali di Chianciano. Si rende per tanto molto verisimile il credere, che essendo una volta queste glebe una massa confusa di Argilla, e di Ocra, siasi questa conformata a tenore della sua indole in una crosta, col lasciare nel mezzo una cavità, e che nell' Argilla posta all' intorno coll' aggiunta dell' acido minerale, formatosi un sugo petrificante quarzoso, sia questo penetrato in quella cavità trapelando per i pori, e per le fessure della crosta ocracea, ed ivi si sia indurito, e condenfato

densato. Ciò comprova il vedersi le tracce del Quarzo, e i suoi specchietti sparsi per la sostanza di essa crosta, e alcune venature di detta materia quarzosa, che traversata la crosta suddetta avevano communicazione col nocciolo interno, e colla massa esteriore di Argilla, in cui osservai ancora molti ingemmamenti di Cristallo Montano teneri, friabili, e delicati, quasi che quivi ancora avessi sorpresa la na-

tura nell' atto di questa sua produzione.

Quest' Argilla medesima, che combinata con un acido minerale costituisce il Cristallo di Monte, è quella, che imbevuta, e penetrata dal sugo talcoso produce le Lavagne, o Pietre scissili già descritte. L' averne io trovate alcune ancor tenere, e molli, e che stropicciate tra le dita divenivano una massa, che con la sua untuosità, e morbidezza si manifestava per una vera Argilla, sembra a mio credere una riprova più che evidente. Questi due componenti sono quelli, che le communicano la proprietà, che ha relativamente al succo, imperoche il Talco la fa divenire lungo tempo resistente alla forza del medesimo, ma la qualità vetriscibile dell' Argilla sa sì, che dopo molta resistenza all' attività di esso debba finalmente soccombere, e cangiarsi in Vetro.

Mi lusingo di avere sufficientemente reso conto della origine del Vetriolo Verde, del Ceruleo, e del Marziale-Venereo, perciò mi resta adesso da parlare del principio, da cui si produce il Vetriolo bianco, che dissi ritrovarsi in queste Cave. Il Vetriolo bianco nativo, secondo le più recenti scoperte, è un' prodotto derivato dal Zinco corroso da un sale di acida qualità. Lo Zinco, conforme è noto, è un mezzo metallo, che si cava da una Miniera di Piombo presso la Città di Gossar nella Sassonia inferiore. Siccome in queste nostre Cave non si osserva alcun mescuglio di Miniera di Piombo, da cui possa supporsi originato lo Zinco, che

serve di base a questo Vetriolo, perciò bisogna rintraciciare, ove il medesimo debba credersi incorporato. Il Sig. Marggraff ha scoperto, che lo Zinco può cavarsi puro, e direttamente ancora dalla sola Pietra Calaminare, e ne ha pubblicato il processo tra le memorie dell' Accademia delle Scienze di Berlino. Ancora il Sig. Vallerio nella sua Mineralogia T. 1. colloca la Pierra Calaminare tra le Miniere dello Zinco, e al S. 118. Spec. 248. la nomina Zinci minera terrea, colore flavescente, vel susco. Lapis. Calaminaris. Cadmia Officinarum. E' dunque la Pietra Calaminare, chiamata ancora Cadmia fossile, una sostanza di mezzo trà la pietra, e la terra, di colore diverso, ma bene spesso di un rosso tirante al nero', e partecipa molto del Ferro nella sua interna costituzione. E' cosa nota, che questa fusa col Rame, secondo le regole della Metallurgia; lo tinge di colore di oro, e lo sa divenire quello, che noi volgarmente chiamiamo Ottone. In atto di questa sussione in solleva una suliggine bianca, che si attacca alla volta de' Forni, e chiamasi Pomfolige, ovvero nibil album. Il Sig. Gio: Arduino scoprì negli sterri delle antiche Miniere di Pozzoja, e del Poggio alle Cave nel territorio di Massa di Maremma alcune glebe di Rame, alle quali era unita la sostanza della Pietra Calaminare di colore rosso oscuro, ed estrasse da esse la Pomfolige, e un ottimo Rame, e cortesemente mi favori delle mostre tanto delle glebe, quanto ancora della Pomfolige. Ciò supposto avendo fatto un diligente confronto di quelle glebe di Pozzoja con altre affatto consimili qui ritrovate, come ancora con alcune di quelle concrezioni, che parlando in termini generali ho chiamato col nome di Ocra ranciata carica, ne ho ritrovata una esattissima somiglianza, onde non mi relta luogo a dubitare, che in quette Cave della Mersa si trovi la Pietra Calaminare, e che

e che lo Zinco in essa contenuto serva di base al Vetriolo

bianco nativo, che qui si raccoglie.

Dopo queste osservazioni fatte intorno alla Miniera della Mersa di Prata passai in altro giorno ad osservare le Miniere del Botro di Cagnano, ove sono le Fabbriche, ed 1 Forni per fondere il Rame; luogo che resta a Tramontana di Prata. Partito dunque da questo luogo salii verso un Monte detto il Poggione, & indi scesi per una strada molto scoscesa; e disastrosa nel Letto di un Torrente chiamato la Mersa Savjoli, che dirige il suo corso da Ponente a Levante in un Canale scavato in mezzo ad altissimi Monti, e shocca nella Mersa di Prata poco sotto la Cava descritta. Nella scesa di questo Torrente in tutto il suo Letto, per cui proseguii il mio cammino a secondo dell' acqua, e nelle adjucenti pendici vi era una indicibile quantità della sopradetta Pietra scissile tal cosa. Dopo qualche tratto di strada mi si presentò in vicinanza del Letto della Meria una pozzanghera di acqua acida con deposizione di Croco Marziale, e poco sotto scaturisce dalla dirupata sponda della Mersa un acqua acidula, che aveva deposta una quantità considerabile della solita Ocra ranciara in parte ancora tenera, e molle, e in parte indurita a consistenza di mezzo tra la pietra, e la terra. Mi parve al gusto quest' acqua di un'acido più piccante, e alquanto più forte di quello delle acidule ordinarie; per gli esperimenti però, che in altro tempo avevo fatti sopra di essa, trovai, che questi ebbero l'esito stesso, che sogliono avere nelle acidule ordinarie. Giunto poco dopo all' imboccatura del Botro à Cagnano, che scola nella Mersa da Tramontana a Mezzogiorno, e salendo contr acqua pervenni alla Casa minerale, ove sono le Fabbriche, e i Forni destinati alla fusione del Rame; già da qualche Anno rimalta sospesa.

Sono i mentovati Forni composti, o foderati della de-

scritta Lavagna talcosa per l'attività, che possiede di resistere lungamente alla violenza del suoco. Osservata intanto
la Miniera quivi restata non possa in opra, siccome osservate ancora le pareti di una Cava nella sponda opposta del
Fosso in faccia appunto alla Casa minerale, notai, ch'era
della stella qualità di quella della Mersa di Prata, cioè di
colore giallo, mischiata di Marcassite di Rame, e di Ferro,

e incorporata in matrice della stessa natura.

Dopo la considerazione de i Forni, e degli altri Edifizi destinati alla fusione del Rame, la mia principale attenzione su diretta al Forno detto degli Arrosti, in cui si sa la prima cottura della Miniera. Resta questo esposto all' aria aperta, e separato dalle altre Fabbriche, e consiste in una specie di Fornace di figura rettangola compolta della descritta Lavagna, e coperta da un Tetto soltenuto dà Pilastri. Dentro questo Forno eravi un copioso residuo della Miniera cotta per la prima volta, e ridotta in un Regolo di Rame impuro di colore atro a motivo del mescuglio di altre sostanze metalliche, e minerali, e specialmente di Ferro, di cui una grossa mole era nella Piazza avanti a i Forni, ch' era stata fusa, e separata dal Rame. Questo Regolo è necessario esporto più volte alla forza del fuoco ad oggetto di spogliarlo di quelle sostanze eterogenee, e renderlo puro, e capace ad essere disteso sotto il martello.

Attaccata a i muri di questo Forno, e sopra le materie metalliche calate in sondo trovai gran quantità di Vetriolo di colori diversi, poiche eravi il bianco, il cenerino, il giallo, il verde, il ceruleo, ed il rosso. Queste concrezioni vetrioliche erano dure, e consistenti; la loro figura somigliava quella di alcune concrezioni di Tartaro disuguali nella loro superficie a motivo d' innumerabili tubercoli, e papille, ed emulavano in certo modo la figura del Fungus Glaphyrus del Mercati Metall. Vat. pag. 258. anzi per servirmi di una vol-

gare similitudine la loro figura è come quella delle palle del Cavolo Fiore. Ne i vani, e nella cavità di queste concrezioni vi si osserva una fioritura lanugginosa composta di filamenti di colore di Argento. Nelle pareti del Forno stanno fortemente aderenti alle Lavagne, le lamine delle quali ridotte alla grossezza della carta da scrivere si vedono slargate, e allontanate le une dalle altre, conservano lo splendore del Talco, e tra una lamina, e l'altra vi è spesso inse-

rita una porzione di Vetriolo.

Andava meco stesso pensando in qual maniera si fusse quivi aggrumata una quantità tanto considerabile di questo sale. Potevo credere elsere un' effetto di Marcassite scomposte, e risolute collo stare esposte all' aria aperta, tanto più che avevano di già sofferta l'azione del fuoco. Imperoche quantunque alcune si convertino in Vetriolo per la sola esposizione all' aria, altre però da se stesse non sono bastanti per questo effetto, ma è necessario farle sperimentare il fuoco per qualche tempo, acciò bruciando questo una porzione del loro Zolfo, ne renda in tal guila la tellitura meno compatta, dia luogo all' aria, e alla umidità, a cui si espongono di penetrarle, e di procurarle tutti quei cangiamenti, che provano quelle, che vi fioriscono da se stesse. Le Piriti, che contengono del Rame, e molto Zolfo, come sono quelle, hanno per ordinario bisogno per un tal fine di essere sottomesse alla forza del fuoco.

Ma questa regola, e questo principio non mi pare, che possa aver luogo nel caso nostro. Imperoche quando le Marcassite divengono Vetriolo nella divisata maniera, vi nasce sopra una certa efflorescenza lanugginosa, che si risolve in una polvere, e in una massa, le cui particelle restano disunite le une dalle altre, nè si produce una crosta, o gruma vetriolica dura, e consistente. Ciò presupposto hò creduto doversi spiegare diversamente la produzione di queste concrezioni vetrioliche. E' cosa

E' cosa nota, che qualunque volta applicato il fuoco al Vetriolo non si espelle da questo intieramente la parte acida , ma ve ne rimane una porzione, e che esposto questo residuo, chiamato Colcotar, all' aria vi si produce nuovo Vetriolo, detto Vetriolo rigenerato. La ragione di questo Fenomeno è perchè l'acido rimalto nel Colcotar per essere stato privato dell' aquea umidità contenuta in atto della calcinazione attrae, e riassorbisce dall' aria l' umidità medesima, e seco unitamente l'acido universale, quale di nuovo rodendo la sostanza metallica costituisce un nuovo Vetriolo.

In sequela di tutto ciò io ho congetturato, che con la Miniera del Rame vi fosse mescolata una porzione di Vetriolo, o della sua Miniera, che dissi ritrovarsi nelle Cave della Mersa di Prata, quale pure si fondeva in questi Forni del Cagnano, e che non espulso affatto l'acido dalla sua sede, ma spogliato della sua umidità, abbia attratto dall' aria il bisognevole per la formazione di un nuovo Vetriolo. Aggiungasi a ciò qualmente il Sig. Arduino mi notisicò, che il Regolo della prima fusione era un composto di Rame, di Ferro, di Zolfo, e di Acido vetriolico molto fisso; il che tende a confermare la mia opinione, cioè che in quelle materie minerali abbrustolite vi sia l' Acido vetriolico capace a promovere la produzione di nuovo Vetriolo. Finalmente mi ha tolta ogni dubbiezza il confronto da me fatto di questo Vetriolo con quello rigenerato nel Colcotar non infieramente spogliato di acido, poiche ho ritrovata una corrispondenza esattissima tra l'uno, e l'altro, sì in ordine alla consistenza, quanto ancora alla figura, ed al colore giallo, e cenerino della maggior parte dell' uno, e dell' altro; onde da questa Analogia non punto sforzata parmi di potere giustamente conchiudere, che il Vetriolo trovato in quella Fornace del Cagnano è un Vetriolo rigenerato. Mi si presenterebbe qui luogo opportuno di ricercare, se

la varietà di questi Vetrioli abbia alcuna relazione con il Calcitide, col Mysi, col Sory, e con la Melanteria degli Antichi. Imperoche in ordine al rosso dice il Junchero Chem. T. 8. Tabul. 59 Vitriolum Rubrum, quod omnium rarissimum, vocatur Chalcitis, seu Colehotar naturale. E Giorgio Agricola de Natura Fossilium Lib. 3. pag. 219. dice Chalcitis verd rubraest, & aris colore. Relativamente poi a quella efflorescenza lanugginosa, di cui parlai, scrive lo stesso Agricola loc. cit Melanteria lanugini modò similis est, modò salsugini. Del Mysi poi, e del Sory così scrive il medesimo Mysi luteum, & auri . Sory , & Melanteria differunt quidem quibusdam, sed eosdem babent colores cinercum, & nigrum. E questi due colori, cioè il giallo, e il cenerino, si ritrovano appunto ne i nostri Vetrioli. Ma questo esame richiederebbe una lunga discussione, e mi obbligherebbe allontanarmi non poco dal mio istituto principale, e dalla brevità, che mi sono proposta. E tanto più si accrescerebbe la difficoltà, in quanto che si sta ancora sull' incertezza, che cosa veramente fussero quei quattro fossili rammentati dagli Antichi, e specialmente da Dioscoride, e da Galeno, mentre alcuni Scrittori li ripongono nella Classe delle sostanze fossili metalliche, ed altri in quella delle concrezioni vetrioliche.

Nella Cava di questa Miniera del Cagnano trovasi ancora una Gleba di colore nero, e sosco, ripiena di minutislime Marcassite di color d'oro, quale talvolta è di consistenza di pura terra, e talvolta di quella delle pietre. In vece di fiorire sopra di essa il Vetriolo, conforme è solito spesso accadere in glebe di questa natura, vi nasce un sale terzo amaricante molto simile al sale della Creta, o a quello, che si rinviene ne i sedimenti di alcune acque minerali svaporate. Ristettendo a questo non ordinario Fenomeno pensai, che la terra costitutiva di questa gleba soste di natura Calcaria, e che corrosa dall'acido minera-

le producesse questo sale, il che frequentemente accade con terre consimili; tanto più che detta terra è ruvida, e friabile, e perciò non dee confondersi con le argille molli, untuose, e vetriscibili. Lo spirito di Vetriolo per altro, ed altri acidi versati sulla medesima non diedero alcun' indizio di ebullizione. Comunque siasi, a me basterà l'aver ciò rilevato come un punto di pura, e semplice Istoria Naturale.

In un sito della sponda di questo Botro poco sopra la Cava suddetta osservai uno stillicidio di acqua, che deponeva una materia tinta di un bellissimo colore ceruleo, lasciandone una copiosa traccia per dove passava, sino a tanto che si confondeva con l'acqua stessa del Botro. Questa sostanza cerulea deposta è di una consistenza tenera, e molle a guisa di una materia butirracea, ma riseccata si converte in una massa dello stesso colore, friabile come la terra, ed insipida. Nelle pareti pure della Cava vi sono molti stillicidi, che depongono consimile sedimento verde, o ceruleo, oppure misto dell'uno, e dell'altro, parimente insipido, ed in alcuni siti di esse pareti lo trovai secco, e consistente a guisa di terra.

Altro non è la descritta sostanza verde, e cerulea, che un Verderame nativo, che contiene del Rame; anzi altro non è, che un Rame scomposto, e disciolto, oppure una Ocra di questo metallo, e chiamasi presso i Naturalisti col nome di Verde, e Ceruleo montano. Il Sig. Vallerio Mineral. Tom. 1. Clas. 3. Ord. 4. S. 123. Spec 269. nomina il primo Cuprum solutum, vel corrosum, pracipitatum viride. Erugo nativa Chrysocolla Agricola. Ochra Cupri Viridis. Viride montanum. Ed il tecondo Cuprum solutum, vel corrosum, pracipitatum Caruleum. Caruleum montanum. Ochra Cupri carulea. Chrysocol-

la nonnullorum. Azuthum.

Mostra l'esperienza essere diverse, ed anco fra loro opposte le cagioni valevoli a disciogliere il Rame nella divisa-

ta forma; e tra queste si contano i sali acidi, gli alcalini, i terzi, gli olii, l'acqua, e l'aria stessa imbevuta di umidità. Giorgio Agricola pensa, che questo Verde, e Ceruleo montano sia la Crisocolla de Greci, chiamata da esso Chrysocolla nativa, e crede prodursi dalla Miniera del Rame disciolta dall' acqua. Ecco come il medesimo si spiega nel Trattato de Ortu, & Causis subter: Lib 3.pag 47. Chrysocolla qui-dem in venis gignitur cum materia metallica imbuitur aquis, rursusque siccatur, cujus indicia ostendit labrum, aliudve vae aneum, quod est in balneo, id enim si diu, ac multum aqua maduerit, post arescens essorescit insigni viriditate. E nel Trattato De Natura Fossilium Lib. 3 pag. 221. dice Duplex autem est Chry-socolla nativa, & sacticia. Ea quam natura gignit in sibris, & venis, aut reperitur per se plerumque arena similio, aut materia metallica adharet, atque hinc abrasa similitudinem gerit ejus dem arena, qua tamen interdum ita modice aspersa est Chrysocolla, ut nulla, vel admodum exigua abradi possit: aut cum aqua jam di-Etas species lambunt, pulveri similior subsidit, qualem Neusola in Carpato monte aqua viridis ex antiquo cuniculo effluens rapit se-cum, que amplius triginta Castellis excepta subsidit, singulisque annis derasa colligitur, atque divenditur. Sed quod Neusolæ sponte sit, cura hominum quondam sactum Plinius scribit: immissis sci-licet in venam aquis leviter Hyeme tota usque in Junium mensem: dein siccatis in Junio , & Julio .

Il Sig. Vallerio loc. cit. pag. 506. Osserv. 3. asserisce, che alcuni Verdi montani fanno una considerabile effervescenza con l'acqua forte, ed altri non ne fanno in alcuna maniera; dal che deduce essere cosa incerta, se il Verde montano sia precipitato da un acido, ovvero da alcali. Io ho versato l'acqua forte sopra di diversi di questi Verdi montani, ch'erano in varie sorme di arena, di terra, di crosta, e di globuli, ed ho veduto insorgere costantemente so-

pra ciascuno di essi una gagliarda ebullizione.

Quan-

Quantunque l'abbondanza dell'acido minerale predominante in quelti luoghi potesse far credere, che quelta nostra: Crisocolla fusse un Rame scomposto dal medesimo, tuttavia l'effervescenza, ch' essa fa con l'acqua forte; m' induce a uniformarmi al sentimento dell' Agricola, ed a persuadermi, che sia opera dell' acqua, poiche osservo, che il Rame disciolto, e scomposto dall' acido non bolle, nè sa alcun movimento di effervescenza con l'acqua forte, conforme ho sperimentato nel Verderame comune artefatto, e nel Vetriolo ceruleo. Oltre a ciò il Rame corroso da un acido diviene un Verriolo di sapore acido-austero, dove che la nostra Crisocolla si osserva, conforme dissi, asfatto insipida. E tanto più ciò credo, in quanto che non si hanno riscontri, che quivi siano sostanze oleose, o alcaline capaci a sciogliere il Rame; nè ciò può attribuirsi al Sale terzo, di cui sopra ho parlato, stante che ho notato, che questo fiorisce su quelle glebe, senza disciogliere il Rame in esse contenuto.

L' Acqua pertanto imbevuta di questo Verderame nativo seco lo trasporta, e poscia lo depone sotto varie forme, ed apparenze. In una serie di Corpi da me raccolti, ne quali è mescolato questo minerale, osservo, che alle volte si condensa in globuli cerulei di varie grandezze, che pestati si risolvono in una polvere di un bellissimo colore ceruleo, come appunto sono quelli, che si trovano a Pozzoja, e al Toggio Montierino di Massa di Maremma, e a Monte Pescale nelle Maremme di Grosseto. Alle volte vedesi riseccato a guisa di pura terra, che bene spesso forma una crosta, ò distesa sopra altre concrezioni di terra, di pietra, o di metallo, oppure che circonda a guisa di sascia per ogni banda un nocciolo di pietra, oppure di terra, o di arena, o dell' una, e dell' altra insieme unita, e petrisicata. Frequentemente però si osservano i Corpi predetti puramente coloriti

da una tintura verde, o cerulea, o mista di varie macchie dell' una, e dell' altra, e ciò o superficialmente, o nella loro interna sostanza. Questo ultimo caso frequentemente succede nel Quarzo cristallizzato nei suoi soliti ingemmamenti, o condensato in forma di venature, per essere stata mischiata col sugo quarzoso ancora liquido una porzione di questo Verde, e Ceruleo Montano, che gli ha communicata la sua tintura. Questa è la cagione del colore ceruleo del così detto Lapis Lazzuli, del Zassiro, e di varie altre terre, e pietre colorite di Verde, e di Ceruleo. Dissi di varie terre, e pietre, poiche per sentimento di qualche dotto Naturalista non tutte le pietre, e terre verdi, o cerulee contengono sempre il Rame, mentre ve ne sono alcune puramente imbevute di Ferro, o di Arsenico senza traccia, o vestigio alcuno di quel metallo.

Siccome il Castello di Prata è situato in un monte molto elevato, non mancai perciò ne' susseguenti giorni di portarmi in altri luoghi delle pendici, che stanno a i fianchi di questo Monte, dove ebbi notizia ritrovarsi qualche sorta

di minerale.

Dalla parte dunque di Ponente di Prata in un piccolo fosso detto il Botro Mulinello, che scorre dietro la Chiesa della Madonna delle Grazie, trovai una Miniera di Vetriolo in terra nera. In una scoscesa Spiaggia indi poco distante, chiamata la Piaggia Ansedonia trovai alcuni strati di Argilla bianca, e nera con Miniera di Rame, e Marcassite di color d'oro. Dalla parte di Tramontana in un fosso detto il Botro de' Cani sono più filoncini di Miniera di Rame in terra cinerea, e nella ripida pendice di questo fosso incontrai molta pietra arenaria legata dal sugo quarzoso del Cristallo di Monte. Più in alto piegando a Maestrale viddi in un fossetto molti filoncini della solita Marcassita di color d'oro con vetriolo in terra nera, e cenerina. Dalla parte di Sciroc-

D

co in luogo detto Gretaja trovai il principio di un Pozzo, da cui erasi recentemente cominciato a scavare la Miniera del Rame, che osservai presso a poco simile a quella della Mersa, e del Botro a Cagnano. Quivi erano alcune concrezioni quarzose colorite di verde, e ceruleo, e molti Cristalli di Monte sciolti, ma molto chiari, e trasparenti. In altro sosso posto dalla parte di Mezzogiorno, chiamato la Fossa di Colle Pelato, vi erano molte pietre con Miniera di Rame, e Marcassite, Diaspri di vari colori, e Argilla bianca, e nera. Altra Miniera di Rame consimile mi si pre-

sentò pure in un luogo detto Fonte Grilli.

Dalla parte di Ponente vi sono due luoghi, uno de i quali dicesi il Vadino, e l'altro i Gorgoni. Sul fine quasi della scesa, per cui si cala nel fosso del Vadino, vi sono due scavi antichi fatti a Pozzo, ma ripieni, e negli scarichi di essi eravi della Miniera di Rame parimente simile a quella della Mersa con qualche mescuglio di Miniera di Piombo. La strada era sparsa di gran quantità di Marcassita di figura cubica sciolta, e di colore di Ferro. Nel fosso pure vi oslervai molte pietre con detta Miniera, e Marcassita di color d'oro, ed una Cava antica rinterrata nella bocca. Tra le altre cose trovai nel fosso un Cogolo di Miniera di Rame, molto pesante, e della grossezza di un Uovo di Tacchina, che spezzato mostrò nel luogo della rottura una crosta di colore verde vivissimo, e di sostanza simile al vetro. Dopo aver salito dall' altra parte del fosso giunsi nel ripiano di una Collina, e notai alcuni larghi spazzi, ne' quali non nasce un minimo filo di erba. Erano questi coperti di pieere nere ferrigne, e lucide a guisa di una vernice, e tra queste alcune moltravano i colori dell' Arcobaleno, ma non tanto vivi, quanto sono quelli di alcune mostre di Miniera di Ferro dell' Isola dell' Elba.

Ai Gorgoni poi vi trovai diverse Cave antiche rinterra-

te, e nella bocca di una di queste vi erano molti pezzi di Miniera di Ferro. Quivi trovasi ancora una specie di Spato, o Quarzo con piramidi obliquamente troncate, e alquanto colorite di rosso.

Se io dovessi formare qualche congettura in ordine a qualche punto della Topografia sotterranea di questi Monti, dall' osservare in tutte queste pendici tanti filoni di Miniera di Rame, m' indurrei facilmente a credere, che questi siano tante diramazioni della medesima, le quali sboccando in queste pendici si manifestano, ma che vadano ad unirsi al tronco principale, sorse esistente nelle viscere più cupe di detti Monti.

Dalla parte di Maestrale sovrasta al Monte, sù cui è sabbricato il Castello di Prata, un' altro Monte più eminente, chiamato col nome di Poggione. Dalla parte di Mezzogiorno è quasi affatto spogliato di Bosco, ed è composto da una specie di Travertino, o Sasso da Calcina, non distribuito a strati, o filoni, ma formato da una materia petrificata, che a guisa di una breccia ha racchiuso nel suo impasto una quantità grandissima di rottami maggiori, e minori di altri sassi non già ritondati, ma proveduti dei loro tagli, e punte. In somma pare, che questo gran Monte susse una volta uno sterminato ammassamento di sassi di varie grandezze tra loro sconnessi, e che un'acqua petrificante insinuata tra quegl' interstizii li abbia insieme legati, ed uniti.

Mi portai finalmente a vedere le antiche Cave dette della Porta al Ferro, dalle quali, per quanto si ha dalle antiche Memorie, si cavava una volta l'Argento, il Rame, edil Piombo; e si trovano in un' orribile, e profondo Vallone, chiamato il Fosso dello Stregajo dalla parte di Occidente.

ne, chiamato il Fosso dello Stregajo dalla parte di Occidente. Tre di queste Cave surono da me vedute poste in poca distanza l' una dall' altra. Chiamasi una la Cava del Rumore 1 motivo del rimbombo in essa prodotto da. e percosse

D 2 dei

de i Corpi duri, ed è diritta, vi si cammina in piedi, e si estende a una lunghezza di cento passi in circa; sembra scavata a forza di Scarpello, e di Piccone, e le sue pareti sono ricoperte di stalattiti generate dai continui stillicidi di acqua, nella volta pure oltre la crosta grumosa vi sono le stirie pendenti, o vuote a foggia di cannelli, oppure ripiene, colle gocce di acqua attaccate. L' altra chiamasi in oggi la Porta al Ferro, è alquanto più lunga della prima, ed è questa ancora incrostata di stalattite. La terza detta la Tana Nuova per essere stata scoperta da poco tempo è incomparabilmente maggiore delle altre due, ed essa pure vedesi incrostata di stalattite. Il Sig. Niccoletti vi entrò in compagnia di un giovine Pastore, e provveduto di lumi, e di lunghi fili s' inoltrò dentro la medesima per lo spazio di cinquecento braccia in circa, ma giunto in un sito, ove corrispondeva al di sopra un' altissimo Pozzo, che sboccava nella sommità del Monte, ollervò, che la Cava proseguiva ulteriormente; ma perchè prima di giungere a questo luogo, erale di già mancato il filo, che doveva servirgli di guida per retrocedere, non volle avanzarsi più avanti sul dubbio di smarrirsi in quel sotterranco Labirinto, tanto più che aveva notato, che questo Cunicolo si diramava in altri Cunicoli laterali, e che alcune di queste diramazioni ripiegavano indietro. Dopo essersi trattenuto per lo spazio di quasi due ore in questa Cava non potè ritrovare alcun segno di Miniera, e portò fuori solamente alcuni pezzi di stalattite bianca macchiata di ceruleo, ed un sasso con tintura di Verde Montano, indizio manifesto, che quivi una volta si cavasse il Rame; se poi oltre al Rame se ne cavasse ancora l' Argento, ed il Piombo, conforme abbiamo dagli antichi monumenti, non misi presentarono riprove da confermarlo; poiche quantunque praticassi ogni diligenza in farne ricerca negli scarichi intorno alle bocche di quelle Cave, e nelle vicinanze delle medesime, non mi su possibile il ritrovare un minimo segnale di alcuna Miniera metallica. Un altro Pozzo antico, ma rinterrato, è nella riva opposta del sosso, ed alcuni Pastori, e Cacciatori mi asserirono, che in tutto quel Monte vi sono molte Cave antiche.

Osservando intanto le balze, e i dirupi di questo orribile Vallone notai, che il Monte non è composto, secondo il metodo più comune della natura, di strati, o filoni paralleli, e variamente inclinati, o retti, o tortuosi, o ripiegati, ma bensì conobbi non essere altro, che uno sterminato ammassamento di pietre angolate di varie grandezze legate insieme, ed unite da un Tartaro petrificato nella maniera stessa, che dissi essere accaduto nei sassi del Poggione; e lo stesso notai ancora nelle interne pareti di quelle Cave; ora come sia accaduto, che in secoli remotissimi siasi quivi ammassata una quantità sì prodigiosa di sassi rotti, e divisi, e formata per cosi dire una sterminata macerie di essi, non saprei certamente indovinarlo. Ma se ciò si rende difficile a concepirsi, altrettanto riesce facile l'intendere, come questi siano stati insieme conglutinati da un Tartaro petroso; imperochè osservandosi quivi, che gli stillicidi dell' acqua sono tanti sughi petrisicanti, che depongono alle pareti di queste Cave tante stalattiti, e concrezioni di Tartaro, agevole cosa è il comprendere, che queste acque stesse, trapelando negli interstizi frapposti tra un sasso, e l'altro, vi abbiano deposto, ed anco di presente persistino a deporti il loro Tartaro, ed in tal guisa abbiano potuto unire con legame petroso un sasso con l'altro.

Un simile meccanismo penso, che debba essere accaduto ancora nelle pietre descritte del Poggione; ma siccome sono queste in oggi allo scoperto, penso altresì, che in tempi antichissimi susse questo Monte più alto, e coperto di terra, per cui valicando l'acqua a traverso, imbe-

vutah

vutasi di materiali atti alla petrificazione, abbia insieme collegati i sassi sottoposti; ma che poi col decorso del tempo l'acque piovane abbiano astersa, e strascicata seco la terra, sbassata l'altezza del Monte, e messe allo sco-

perto le sottoposte petrificazioni.

Se qualcuno non volesse persuadersi essere in tal guisa accaduto l'affare, potrei in piccolo porgli sotto gli occhi un simile impietrimento, che si va di presente formando nel Botro a Cagnano, dove al piede di una caduta di acqua di quel sosso la medesima vi depone un Tartaro di colore tabaccato, che ha legate insieme, e continua ancora di presente a legare tutte le pietre tanto grandi, che piccole esistenti nel suo Letto; e non dubito punto, che trasportate dalle torbide altre pietre sù questa base, si accrescerà successivamente questo impietrimento, e rialzerassi il sondo stesso del sosso del soss

Non è veramente cosa ovvia il ritrovare una congerie di pietre ammassate, capace a costituire un Monte di non mediocre grandezza; ma pure se ne può vedere in ristretto l'idea a Radicosani, dove accanto la Strada Romana scorgesi una consimile macerie di sassi, quale se susse ricoperta di terra atta a somministrare all'acqua, che per essa penetrasse a traverso, i materiali di un Tartaro petrisicante, senza dubbio vedrebbonsi col progresso del tempo questi sassi insieme uniti, e conglutinati sormare una porzione di Monte simile a questi dello Stregajo, e del Toggione.

Ad oggetto di comprendere quanto abbia il Tartaro predominato in questi luoghi con i suoi ingrumamenti, basta rissettere, che il Castello di Prata è situato sopra il dorso di un vastissimo silone di Travertino. Più di ogni altro però lo dimostra un luogo detto le Vigne nella pendice Meridionale di Prata, ove è una Collina quasi tutta composta di Tartaro, o Travertino, nel quale si vedono moltissime

di quelle curiose concrezioni solite a prodursi dalle acque petrificanti. E non è già, che questo Tartaro consista in una semplice crosta superficiale, ma eostituisce l' intiero corpo della Collina, poiche dalla parte di Ponente vi sono smidella Collina, poiche dalla parte di Ponente vi iono imifuratissimi dirupi composti da questo Tartaro distribuito a
strati orizzontali di varie grossezze. Mi sarei facilmente indotto a credere, che questo sterminato ammassamento susse stato un essetto di qualche sorgente di acqua minerale in
oggi dispersa, ma l'avere oliervato quei filoni sovente tramezzati da altri Letti di arena, e di sassi di ghiaja ritondati
mi sece abbandonare questo pensiero, e giudicai più tosto,
che in antico questo luogo sia stato un Letto di qualche
Torrente, per cui scorresse un acqua petrissicante. Nè certamenta per rendere ragione di questa gran petrissicazione tamente per rendere ragione di questa gran petrificazione può aversi ricorso al Tartaro delle acque marine, con-forme in altri luoghi è realmente accaduto, imperochè per quanta diligenza abbia usato in questi Monti tanto nelle lo-ro sommità, quanto ancora nelle pendici, e nei siti più bas-si non ho saputo rinvenire un minimo vestigio di produzione di Mare.

Da Prata mi portai a Montieri, dove trattenutomi per lo spazio di mezza giornata, altro non seci, che riscontrare le diligenti osservazioni satte quivi dal chiarissimo Sig. Targioni, e descritte con tanta accuratezza nel terzo Tomo de' suoi Viaggi; e indi m' incamminai; per vedere i Lagoni di Travale.

Scesi dunque per una Valle, che avendo il suo principio in vicinanza di quel Castello acquapende da Ponente verso Levante, & in distanza di un miglio in circa da quel Castello trovai i mentovati Lagoni. Il primo, che incontrai, era già da qualche tempo asciutto, ma tramandava un acutissimo odore di Zolso, senomeno da me osservato in altri luoghi, e specialmente nella Montagna di S. Fiora, dove

dove notai, che essendosi acciecate, e disperse le polle di alcune acque sulfuree, non ostante ciò esalava ancora da quei siti un fetore sulfureo acutissimo. Dipoi continuando a scendere per la Valle poco tratto dopo di questa ne incontrai due altri in poca distanza l'uno dall'altro. Il primo di questi è nel fondo della Valle, ed il secondo in un piccolo dorso inclinato della medesima. In ambedue si vede un acqua acida, e calda fgorgare, e bollire con grosse vessighe, facendo nell'atto stesso un gran fracasso, e romore, e si sollevano densissimi volumi di un fumo bianco, caldo, e umido; con questo divario però, che il fumo, ed il fracasso è molto più grande nel secondo, che nel primo. L' acqua, che bolle, retrocede per le stesse aperture, dalle quali comparisce allo scoperto, come di altre accadere si legge presso i Naturalisti, e come avvertij ancor io dell' acqua acida, e fredda di S. Albino presso Monte Pulciano.

Ora quì si presenta ai Naturalisti un Problema da risolversi, cioè in qual' maniera accada, che le stesse acque acide, che hanno almeno in apparenza le qualità medesime, e che producono le stesse grosse vessighe, lo stesso romore, depongono gli stessi sedimenti, e retrocedono per le stesse aperture, alcune bollano a freddo senza elevazione sensibile di nebbia, ed altre a caldo con inalzare densi, ed umidi volumi di fumo. So, che le fermentazioni calde, e fredde de i Chimici potrebbero almeno generalmente soddisfare al proposto quesito, ma ciò non batta a mio credere per una soluzione speciale; poiche predominando in tutte queste acque un' acido della stessa natura vetriolica, sarebbe necessario individuare la diversa precisa qualità delle sostanze, o terree, o saline, o metalliche, che unite all' acido suddetto, e da esso disciolte producessero in alcune la fermentazione calda, ed in altre la fredda. Per qualche diligenza da me usata ad oggetto d' inveltigare

investigare questi materiali ne' sedimenti stessi delle acque, nel terreno, dal quale sgorgano, e nei minerali de i Monti, da' quali derivano, non mi è giammai riuscito il venirne a capo; perciò lasciero, che altri più sagaci Investigatori della Natura incontrino sù questo particolare un' evento più fortunato.

L' Acqua di questi Bulicami, o Lagoni in alcuni siti gorgoglia chiara, in altri torbida, ed in altri simile ad una fan-ghiglia bollente di colore o bianco o nero, o cenerino. In qualche luogo questa fanghiglia resta depositata suori dell' acqua, e quivi asciugata, e indurita, ed anche attaccata alle pietre. Trovai in questa molte sioriture vetrioliche di colore bianco, verde, e ceruleo; trovai lo Zolfo attaccato in maniera di crosta alla terra, alle pietre, a i legni, ai vetrioli; e trovai in detta fanghiglia indurita molte concrezioni selenitiche. Alcune di queste a guisa di lamine tramezzavano quella terra assodata, altre nella superficie vi erano disposte a rosa, costituite da lamine triangolari con base convessa, che con i loro vertici si univano in un centro, ed altre incrostavano quella superficie, e la rendevano aspra, ed inequale, per essere queste una congerie di tante minutissime piramidi dense, ed affollare, che ivi nate sporgevano in fuori a guisa di piccolissimi aghi. Altre di queste glebe consistevano in un confuso, e tumultuario ammassamento di Vetriolo, di Zolfo, e di Selenite. Qui dunque in un sol colpo di occhio mi si presentarono unitamente alla vista tre prodotti derivati dalla combinazione dell' acido minerale con altre sostanze, cioè lo Zolfo da quella col flogistico, la Selenite da quella con la terra, ed il Vetriolo da quella con le sostanze metalliche.

Quindi ritornato a Prata ne partii il dì 9. Luglio per andare alla Rocca Tederighi, che è un Castello indi distante da circa sei miglia, giacchè il Sig. Silvestro Salvestroni degnissi-

mo

mo Pievano di Prata, che per tutto questo tempo, oltre all' avermi con estrema gentilezza, e cortessa favorito continuamente di benigno alloggio in sua Casa, si era preso ancora l' incomodo di onorarmi della sua Compagnia in tutti quei luoghi, ne' quali mi ero portato per fare le descritte osservazioni, mi assicurò, che ivi ancora si sarebbero trovate alcune cose meritevoli di essere considerate.

E' situato il Castello della Rocca Tederighi sul dorso di uno Scoglio, che sporge in suori a gussa di Promontorio dal seno di un Monte, il quale colle sue branche lo cinge lateralmente dalla parte dell' Oriente, e dell' Occaso; ma dalla parte di Mezzogiorno, e di Scirocco vi è un' ampia apertura a motivo del piano della Maremma di Grosseto, che avendo il suo principio alle salde di questi Monti si e-

stende fino al Mare.

Poco prima di giungere alla Rocca cominciai a trovare gran quantità di massi, e di siloni di Gabbro nero, e verde cupo mescolato con Talco risplendente di colore parimente nero, oppure di Argento, del qual Gabbro non avevo incontrato un minimo contrassegno in tutti i Monti di Prata, e di Montieri. Oltre al Gabbro col Talco vi trovai ancora molto Sasso Serpentino, cioè una Pietra, che ha il sondo o cenerino, o piombato, o nericcio, tutto asperso di macchie bianche di sigura rettangola. Lo scoglio, sù cui è sabbricato il Castello, è di Pietra Salina, detta ancora Sasso Peperino, simile assatto alla Pietra, di cui è composto il Monte Amiata, chiamato volgarmente di S. Fiora; e questa stessa serve di pavimento alle strade, che perciò sono ineguali, e scoscese, ed in alcune vi si cammina col mezzo di gradini nella medesima intagliati.

In una spiaggia opposta al Castello della parte Orientale, chiamata la Piaggia del Canale, vi sono tre Cave antiche con molta quantità di getti, e scarichi, tra quali al-

cuni

cuni piccoli pezzi sono coloriti di verde, e vi trovai un pezzo di Miniera gialla di Rame, molto consimile a quella della Mersa, e del Cagnano, dal che congetturai, che la Miniera di queste Cave sia una diramazione, o conti-

nuazione di quella della Mersa.

In vicinanza del Fosso detto il Canale, posto tra la mentovata Pendice, ed il Castello, trovai in un' Aja spianata di fresco dell' Amianto, parte del quale era dura, e indissolubile, e l'altra composta di fili molli, cedenti, separabili, e di colore di paglia; ma la loro lunghezza non oltrepafsava quella di un mezzo pollice parigino. Mi fu in appresso portato altro Amianto trovato nel Letto del Fiume Farma, che scorre per queste Maremme, i cui fili sono più lunghi, bianchissimi, e superano nella morbidezza i primi, nel che non la cedono ai fili del Cotone, ne a quelli della Seta, e perciò sarebbe ottimo per filarsi. Nell' Aja medesima trovai diversi pezzi di Gabbro nero con Talco tramezzati da varie piccole venature di Amianto, formate da una congerie di fili separabili, paralleli fra loro di colore di paglia, della lunghezza di una linea parigina in circa, che tanta appunto era la grossezza di quelle venature. Queste disposte a foggia di Strati tortuosi, e variamente inclinati si diramavano nella superficie del sasso in altre venature minori, che diversamente intrecciate formavano una specie di tessitura reticolare. Altro pezzo ne osservai, in cui cominciando da una parte il Gabbro terminava nell' altra l' Amianto duro, e resistente; ed in altro finalmente notai, che il Gabbro, e l' Amianto erano insieme combinati nella stessa matsa, vedendosi de i sascetti del secondo incorporati nel primo. In somma rilevai, che l' Amianto stava ripartito in queste masse di Gabbro, come sta appunto il Quarzo ne i Diaspri, ne i Paragoni, ne i Calcedonj &c. o come lo Spato nell' Alberese, in alcuni Marmi &c. o come altri sughi petrificanti ne i loro respettivi impietrimenti. Or siccome l' Amianto, il Talco, e la Galattite sono petrificazioni analoghe, le quali oltre la proprietà comune, che hanno di ellere apire, ò refrattarie, cioè di resistere alla violenza di qualunque fuoco ordinario, si trovano per lo più insieme, o complicate, o disciolte ne' Monti stelli; quindi è che apertamente argomentasi la relazione, che passa tra le une, e le altre. Alcuni dotti Naturalisti avendo ciò avvertito hanno pensato, che l' Amianto, e la Galattite siano una stessa cosa, e che il Gabbro col Talco degeneri in Amianto. Sul fondamento della precedente offervazione mi è venuto in mente, se mai dovesse credersi, che l' Amianto fusse il sugo petrificante, che i suoi ingemmamenti siano i fili, de' quali è composto, e che la Galattite, ed il Talco siano le sue petrificazioni. L'analogia, che passa fra questi tre prodotti, e la distribuzione dell' Amianto nella maniera stessa de i sughi petrificanti dello Spato, e del Quarzo, m' induce in buona parte a crederlo; ma comprendo altresi, che molte altre offervazioni sarebbero necessarie per confermarlo.

Scesi poi in un profondissimo Torrente, chiamato Assima, posto dalla parte Occidentale di questo Castello, per osservare una terra alluminosa. Trovasi questa terra in una balza di color bianco, situata dall' altra parte del Torrente, e composta per la maggior parte di terra, e di pietra salina. Alla metà in circa di questa balza vi è una piccola buca, nella quale non può entrarsi, ma serve unicamente per estrarre i saggi di quella Miniera alluminosa. La superficie della terra è piena di Allume, ma scavata piu internamente la ritrovai assatto priva. Vedesi questa terra alluminosa di tre disferenti colori, cioè bianca, carnicina, e nera. Di due specie è la bianca, una farinacea, e in maniera di polvere, e l'altra dura, e consistente come una pietra, an-

zi per meglio dire è una vera pietra salina di colore bianco, che tiene incorporati i soliti lucidi specchietti. La carnicina è un misto di terra bianca, e rossa. E finalmente la nera è un argilla indurita, che contiene molti piccoli pezzi di Cristallo di Monte, non perfezionati nelle loro piramidi, ma che mostravano apertamente il prisma di figura essagona, circostanza, che conferma quanto sopra disti intorno alla base del Cristallo Montano. Nel Letto del Torrente vi era gran quantità di Pietra Salina, di Sasso Serpentino, e di una specie di Alberese con ingemmamenti di Spato di figu-ra lenticolare, del quale Spato, ed Alberese ne aveva osser-vato ancora non poco all' intorno del Castello.

Il Sasso Peperino svegliommi subito in mente il pensiero di qualche antico estinto Vulcano quivi una volta esistente, conforme credesi essere avvenuto a Radicosani, e a S. Fiora, perciò mi diedi a ricercare con qualche diligenza, se avessi potuto ritrovare o vetrificazioni, o pomici, o ceneri vulcaniche, ma in darno mi affaticai, poichè non mi fu possibile il rintracciarne un minimo vestigio. Anzi che mi a presentò una idea affatto contraria per essermi nato un dubbio, se veramente il Peperino sia una produzione Vulcanica, oppure un Granito fatto dall' acqua; imperoche paragonando il Sasso Serpentino col Peperino mi accorsi, che le macchie bianche del primo sono prodotte da alcune massulette spatose di figura parallelopipeda, e che gli specchiet-ti del secondo sono queste stesse massulette. Qui dunque si tratta di due Graniti prodotti nello stesso luogo, e che racchiudono nel loro impasto i medesimi corpi. Non pareva dunque a me verisimile, che nel sito medesimo fussero risultate due petrificazioni affatto simili, ma prodotte in due maniere differentissime, cioè una a umido, e col mezzo dell' acqua, quale senza dubbio è il Serpentino, e l'altra dalla violenza del fuoco, come da molti valenti Naturalisti si crede essere il Peperino. Se la pasta petrificata, che lega, e costituisce questo secondo, è una materia vetrificata, o che per lo meno ha acquistato qualche grado di vetrificazione, riesce cosa disficile l' intendere, come possa questa essere stata corrosa dall' acido minerale, e convertita in Allume, avendo sopra avvertito, che fra le terre alluminose vi trovai ancora del Peperino, mentre gli acidi non hanno alcuna attività sulle materie vetrificate.

A fronte di queste ragioni, che m' inducevano ad escludere il sentimento de Vulcani per la produzione del Peperino, restai tuttavia ondeggiante fra i dubbi per esfermi sovvenuta in savore di questo una osservazione da me satta nell' Anno scorso per la pianura della Maremma di Pitigliano, e di Sovana, ove tra gli avanzi di un antichissimo Vulcano estinto trovai mischiata gran quantità di Peperino. Ma siccome di questo Vulcano non sò, che alcuno abbia scritta, o pubblicata qualche notizia, perciò in proposito di Vulcani estinti mi avanzerò per modo di digressione a dirne brevemente qualche cosa.

Viaggiando dunque per la pianura della sopradetta Maremma da Acquapendente sino a Sovana, che costituisce una estensione di circa quindici miglia, trovai, che la superficie di essa pianura, che in alcuni luoghi s' innalza in piccole, e placidissime Collinette, è terra lavorativa, e coltivata per la maggior parte a semenza di Grano; ma dopo questa prima superficie s' incontrano varie, e diverse croste di maggiore, e minore grossezza di Lava Vulcanica una volta susa, e poi rassodata, nel cui impasso si scorgono imprigionate pietre di natura diversa, una prodigiosa quantità di varie Pomici, di pietre arse, e che ad evidenza hanno sosseria la forza di un gagliardissimo suoco, e di una terra bianchissima simile totalmente alla Calcina. Di queste Pomici, oltre all' esserie racchiuse

chiuse nell' impasto della Lava indurita, se ne vedono moltissime sciolte, e disseminate sparsamente, ed altre rissolute in una polvere, da cui risulta quella specie di arena, ivi chiamata Pozzolana. Le altissime Rupi scavate da Torrenti, che scorrono a traverso di questa Campagna, mostrano chiaramente essere state molte, e diverse queste Lave, ed accadute in tempi diversi, poiche gli strati delle Lave sono alternativamente tramezzati da altri strati di terre diverse, e questi diversi strati di Lave, e di terre si corrispondono esattamente da una parte, e dall' altra delle Rupi predette.

Si presenta adesso una ricerca diretta a stabilire il luogo, dove questo Vulcano aveva anticamente la sua sede.
Non può senza dubbio questa Lava ripetersi da i spenti
Vulcani di Radicosani, e di S. Fiora, imperoche oltre all'
essere questi luoghi distanti per lo spazio di una giornata
in circa di cammino termina la Lava molto lontano da
quei Monti, e vi sono di mezzo altri Monti, Valli, e Colline, dove non si vede un minimo vestigio di avanzo Vulcanico, del che per oculare inspezione mi sono assicurato.
Mi avanzerò per tanto ad indicare il luogo, dove da varj
contrasegni ho argomentato, che ardesse una volta questo
suoco sotterraneo.

Dalla parte Orientale di Pitigliano, e in distanza di miglia quattro da quel Castello trovasi nello stato Pontisicio un piccolo Lago, chiamato comunemente il Lago di Mezzano. La sua figura è circolare, la cui circonferenza si estende a poco più di un miglio, e viene circondato all'intorno da una corona di Monti, i quali sbassati dalle parte di Ponente vi lasciano una foce, o gola aperta. Il suo sondo, e le sue rive sono coperte di arena, senza punto di sango, e senza alcuna sorta di pianta tanto nel contorno, quanto ancora nel mezzo. L'arena è un tritume, e

sminuzzolamento di Pomici di varj colori, le quali in larga copia si vedono disseminate sulla riva. Oltre alle Po-mici incontrai sulla stessa riva molti grossissimi massi di pietra, i quali in parte erano divenuti Pomice, e in parte erano nel loro stato naturale. La sterminata mole di questi sassi, ch' erano stati sottoposti all' azione del suoco Vulcanico, mi fece credere, che in questo sito, o almeno in poca distanza dal medesimo ardesse il fuoco sotterraneo; imperocche non è verisimile, che sassi di mole così smisurata fussero stati scagliati da luoghi remoti, e particolar-mente da i lontani di S. Fiora, e Radicosani, benche gran-dissima sia la veemenza dei suochi Vulcanici. I descritti materiali trovati intorno a questo Lago, e nelle sue rive, possono facilmente dar motivo di credere, che esso medesimo sia stato il cratere del Vulcano, quale spento si sia il cratere ripieno di acqua, e convertito in Lago. Ne dovrebbe fare ostacolo a questa credenza il sito basso, e il luogo posto alle radici dei Monti, perche ordinatiamente i Vulcani sboccano nelle sommità de' medesimi, mentre sappiamo per la relazione di più Geografi, che la cima del Monte Ecla della Irlanda è continuamente coperta di neve, ed alle sue falde vi sboccano di profonde voraggini fiamme inestinguibili, e ricuoprono le adjacenti campagne di cenere, e di altre materie liquefatte. Ma pure quando il Lago sembrasse improprio per il cratere di questo Vulcano, bisogna almeno necessariamente supporto in uno dei Monti, che gli fanno intorno Corona.

Dalla Rocca Tederighi passai a Sasso Fortino, dove mi trattenni solamente per lo spazio di una notte, a motivo che il caldo fortemente incalzava, e mi rendeva sofpetta per la salute una più lunga permanenza in quell' aria, e perciò ritornai alla volta di Siena. In poca distanza da Sasso Fortino dalla parte di Tramontana vi è molto Ges-

so disposto a massi disseminati di colore bianco, e nero, e trasparente, ma ruvido nella sua superficie. I suoi ingemmamenti sono piramidi sopra base quadrata, concorrenti con il vertice in un Centro. Altra Cava di Gesso pure vi è dalla stessa parce, ma in maggiore distanza dal Castello, ma questo è Opaco, di color bianco macchiato di giallo, chiamato Gesso Marmorino.

Soggiungerò per ultimo alcune poche piante vedute in questa occasione, le quali non avevo altre volte incontrate, o almeno di rado, ne i luoghi dello Stato Sanese, per i

quali ho viaggiato.

1. Polypodium Angustifolium, folio vario. I. R. H. 540. Lonchitis minor. C. B. Pin 359. Lonchitis altera folio Polypodii I. B. 3. 744. Lonchitis aspera Dod. Pempt. 469. Asplenum Sylvestre Lugd. 1216. Pteris fronde pinnara, foliolis linearibus parallelis. Van-Royen flor., Leyd. Prodr. 497. 2 Polypoides vulgaris, folis angustis partim ad terram reclinatis, & sterilibus, partim ere-Etis, & seminiferis. Targ. App H. Flor. 163. Di questa pianta ne trovai molta quantità nella Valle della Mersa di Prata fra gli stillicid, dell' acqua. Alcune sue foglie sono piegate a terra, ed altre più lunghe s' innalzano dal mezzo, e queste seconde sono quelle, che portano il seme nel dorso, dove che le prime sono sterili.

2. Alcea folio rotundo, & laciniato C. B Pin. 316 Malva Montana, sive altera rotundifolia, laciniata. Colum. P. 1. 148. Vedesi frequentemente ne i contorni di Prata,

e in altri luoghi.

3. Aquilegia Sylvestris C. B. Pin. 144. Aquilegia flore simplici I. B. 3. 484. Nella Valle della Mersa di Prata, e

in altri luoghi.

4. Thalictrum Alpinum majus Aquilegiæ foliis, florum staminibus albis, caule viridi I. R. H. 270. Thalictrum MonMontanum, album, altius C B. Pin. 337. Thal ctrum Montanum Clus. Hist. 234. Nasce ne' luoghi stessi, dove è l' Aquilegia Sylvestris, e queste due piante quando sono senza siore, o frutto difficilmente si distinguono fra loro a motivo della somiglianza grande delle foglie. Questa specie di Talitro ha le capsule alate, a diffe-

renza di altre specie, che non le hanno tali.

5. Osmunda Vulgaris, & palustris I. R. H 347. Osmunda Regalis, seu silix storida Park. Theat. 1038. Filix storibus insignis I. B. 3. 736. Filix ramosa, non dentata, storida C. B. Pin. 357. Filix palustris Dod. Pempt. 463. Osmonda frondibus caulinis, simpliciter pinnatis, pinnis lanceolatis Linn. H. Cliss. 472. 3. Ne trovai molta in un Bosco di Castagni in vicinanza delle Cave della Mersa di Prata, nella Valle medesima, e in una pozzanghera di acqua acida nella Mersa Savjoli.

6. Allium Sylvestre latifolium C. B. Pin. 74. Allium Urfinum latifolium, vernum, sylvaticum I. B. 2. 265. Allium Ursinum Math. Nel fosso dello Stregajo, accanto

alle Cave della Porta al Ferro.

7. Allium Sylvestre, amphicarpon, foliis porraceis, sloribus, & nucleis purpureis Raii Synops. 230. Nei Monti dello Stregajo.

8. Veratrum flore ..... I. R. H non avendo veduto il fiore non sò se sia Veratrum flore subviridi, oppure

flore atrorubente: Nei Monti dello Stregajo.

9. Cratægus folio laciniato I.R. H. 633. Melpilus Apii folio fylvestris, non spinosa, sive sorbus torminalis C.B. Pin. 454. Sorbus torminalis, & Cratægus Theophrasti I. B. 1. 63. Sorbus torminalis Math. Cratægus foliis cordatis, acutis, lacinulis acutis, serratis Linn. H. Cliff. 55. 1. Di questo Albero ne trovai tre piante con i suoi frutti in alcuni Boschi per la strada tra Prata, e la Rocca Tederighi.

10. Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo I. R. H. 110. Datura pericarpiis erectis, ovatis Linn. H. Cliff. 55. 1. In alcuni siti delle Praterie sotto Prata.

11. Tithymalus foliis brevibus aculeatis C. B. Pin. 292. Nel fosso dello Stregajo. Di questa pianta si veda il Sig. Seguier delle Piante Veronesi T. 1. pag. 154.

12. Cardamine altera, sive Silymbrium Lugd. 659. Nel-

la Valle della Mersa di Prata.

13. Cardamine glabra Chelidonii folio I. R. H. 225. Nel

fosso dello Stregajo.

14. Cardamine major, Hellebori nigri folio, flore purpureo, radice nodosa. Di questa ne trovai alcune poche piante nel fosso dello Stregajo. Che sia una Cardamine secondo il metodo di Tournefort non può dubitarsene, mentre ne ha tutte le note caratteristiche. Il suo fiore è Cruciforme, il frutto è una Siliqua divisa in due spartimenti da un tramezzo, e le due valve si contorcono in spira quando il frutto è maturo, scagliando con impeto il seme. Sarà questa forse descritta da qualche Scrittore Bottanico; ma non avendola ritrovata in quelli, che ho consultato, l' ho nominata nella predetta maniera. Cresce all' alcezza dell' Elleboro nero, ed ha le foglie simili a quelle del medesimo, e della stessa grandezza.



## ANALISI FISICO-CHIMICA

DI UN' ACQUA MINERALE, CHE SCATURISCE IN VICINANZA DI SIENA, CHIAMATA L' ACQUA BORRA

Del Signor

## GIUSEPPE BALDASSARRI

Dottore In Medicina, E Professore Pubblico Di Storia Naturale.

Comments of the Control of the Contr



Acqua Minerale, che chiamata comunemente col nome di Acqua Borra scaturisce in distanza di miglia quattro dalla Città di Siena, fu nei tempi passati molto accreditata per la guarigione di gravi, ed ostinate malattie; ma, siccome suole accadere di quasi tutte le mondane cose, ha dovuto ancora essa sossirire la sua de-

cadenza, di modoche in oggi solo da qualcuno del Popolo minuto, e dagli Abitatori delle Campagne viene per ordinario praticata. Alcuni degli antichi Scrittori, tra i quali il Baccio, secero di essa menzione nei loro libri; e Leandro Terucci Filosofo, e Medico Sanese, compose sopra la medesima un breve, e succinto Trattato impresso in Siena l'Anno 1647. Ma siccome la maggior parte degli Autori I-drografici, che scrissero fino a quasi tutto il Secolo decimosettimo, si mostrò poco esperta, e diligente nell' esame delle acque minerali, anzi dagli essetti puramente da esse prodotti nel Corpo Umano pretese dedurne i principi, e le sostanze elementari, quindi è, che non può ricavarsi da i loro scritti alcun lume sufficiente ad instruirci

stuirci circa la vera, e naturale costituzione delle medesime. In congiuntura di avere esaminate altre acque del Territorio di Siena, volli sare l'Analisi ancora di questa; e siccome l'ho scoperta molto disserente dalle altre, perciò mi sarò lecito esporre tutto ciò, che col mezzo di varj, e replicati tentativi satti colla maggiore diligenza a me possibile mi è sortito di ricavare.

Sgorga dunque quest' acqua presso la Riva di un pie-colo Torrente, ed esce gorgogliando da piu aperture al piede di un ampio Scoglio di Travertino prodotto dall' acqua stessa a cagione del copioso Tartaro successivamente deposto, da cui di quando in quando, chiuse le an-tiche aperture, altre poi dall' acqua nuovamente si for-mano. Si osserva per dove scorre, particolarmente in vicinanza delle sue bocche, una traccia di materia untuosa, variamente colorita di bianco, di cenerino, di giallo, di verde, e di nero, quali colori sono distintamente ri-partiti in tante piccole areole, e di essi scorgesi ancora macchiato il riferito Scoglio di Travertino. Sono queste sostanze variamente colorite specie diverse di quelle piante chiamate dai Botanici col nome di Conferve, e di Tremelle, che sogliono frequentemente nascere nelle acque Termali, e che amano di vegetare ad un certo grado di calore, consorme ha osservato il chiarissimo Sig. Dot. Domenico Vandelli nel suo detto Trattato de Thermis Agri Tatavini pag. 119. e 120. esiccome osservò ancora M. de Se-condat nelle acque di Dax, e di altri luoghi, e lo stesso confermasi da M. Hill accadere nelle acque di Bath in Inghilterra (Secondat Osservations de Physique, & d' Histoire naturelle pag. 12. sino alla pag. 16.]
Si osserva l'acqua mentovata chiara, e trasparente,

Si osserva l'acqua mentovata chiara, e trasparente, spira un leggierissimo odore di Zolso particolarmente in certe ore, e in certi tempi; osservasial tatto alquanto cal-

da, in ordine a che è soggetta a varie irregolari alternative comparendo or piu, ed or meno calda, e sacendo tali variazioni da un momento all'altro, essetto derivato dai gorgogliamenti, ed esplosioni, che accadono con maggiore, o minore violenza. Al palaco si mostra alquanto salata, e di un salso simile a quello del Sale Marino, solo che vi si osserva complicato un altro sapore tendente alquanto al lissivioso, qualunque volta vi si faccia attenta rissessimo.

Nell' intraprendere dunque l' esame della medesima non cominciai le mie ricerche con le assusioni di varie sostanze secon do il metodo consueto, mentre queste si sanno per lo piu a caso, tumultuariamente, e senza le necessarie, e precise relazioni agl' ingredienti delle acque, onde molte riescono inutili, e infruttuose, e bene spesso si tralasciano le piu importanti, e necessarie. Perciò stimai bene incominciare immediatamente dalla separazione dei principi, riserbando in ultimo le assussaria adattate a quanto avessi scoperto, acciò in tal guisa riuscissero di una opportuna con-

ferma per le mie determinazioni.

Feci per tanto svaporare al fuoco in vaso di terra vetriato una porzione di quest' acqua a siccità, e compita l' evaporazione restò un sedimento di colore in parte cenerino, e in parte giallo, che assaporato mostrava ad evidenza il sapore di Sale Marino con l'aggiunta di qualche altro sapore diverso, ed inclinante al lissivioso. Questo sedimento sciolto in acqua piovana, e feltrato per carta, lo seci svaporare a suoco leggierissimo di sabbia in vaso di vetro, tantoche comparisse la Cuticola, e allora posto il tutto in luogo quieto, e freddo, aspettai che si formassero i Cristalli, qual ruovamente sciolti, festrati, e cristallizzati, accioche sulla puri puri, ne ottenni i Cristalli di sigura cubica, di sale Marino, e gettati sulla brace crepitarcino a

guifa

guisa dello stesso Sale. Il Mercurio sciolto dallo Spirito di Nitro si depose al sondo del vaso a guisa di una Calce metallica, subito che vi affusi la soluzione di questo Sale cristallizzato, e l'Olio di Vetriolo versato sul medesimo svegliò l' effervescenza, e si sollevarono alcuni sumi biancheggianti, che spiravano l'odore dello spirito del Sale Comune. Nè per questo capo mi proposi il sare ulteriori tentativi, mentre parevami, che il notato sin quì susse più che bastante ad assicurarmi, che il Sale cristallizzato estratto dalla nostr' Acqua Borra sia un vero Sale Comune, o Marino, che dire si voglia, trattandosi particolarmente di un soggetto così ovvio,

e noto ad ognuno.

In atto che svaporava la soluzione seltrata del sedimento ad oggetto di avere il Sale cristallizzato mi accorsi, che il fumo esalante aveva lo stesso odore del Ranno comune, o della Maestra preparata con acqua, cenere, e calcina, oppure del Sale calcinato di Tartaro, allorquando sciolto in acqua si fa svaporare per asciugarlo. Compita la cri-stallizzazione, rimase un sedimento liquido, di colore oscuro rubicondo, e simile a quello del Ranno comune, ed assaggiatolo lo ritrovai di sapore di Urina putrefatta, quale appunto sogliono avere i Sali alcalini tanto fissi, quanto volatili. Feci nuovamente condensare a Cuticola questo sedimento, e dopo le debite diligenze si produssero altri Cristalli cubici di Sale Marino. Questo residuo liquido, e lissivioso oltre all' avere, conforme ho detto, il sapore urinoso, fece ebullizione con ogni forta di acido, colorì di verde il siroppo violato, gettato nella soluzione del Mercurio sublimato, la colori di un bellissimo colore ranciato, e lo Zolfo bollito in porzione di questo umore lissivioso vi si sciosse, e li comparti un odore sulfureo alquanto oscuro.

Sfumato intanto a siccità il rimanente di questo sedimento, in ultimo con molta difficoltà si spogliava affatto dell' umido, stentando molto a riseccarsi persettamente, e sormando grosse vessighe, come appunto accade nel rasciugare il Sale di Tartaro calcinato, e sciolto nell' acqua, quale a motivo della sorte attrazione; che ha con l'acqua stessa, non può asciugarsi se non da un calore molto superiore a quello dell'acqua bollente; anzi, come vuole il Boerave (Chem. Par. Alt. pag. M. 393) è necessario, che per questo sine superi un calore di 600. gradi. Da questa evaporazione adunque ottenni finalmente un Sale bianco, di sapore urinoso, che facilmente andava in deliquio esposto all'aria, e che a tutte le prove si manifestò ad evidenza di qualità alcalina, e molto simile al Sale calcinato di Tartaro, se non che mostrava sulla lingua un acrimonia alquanto più mite, e meno intensa di quello faccia il secondo:

Io non poteva avere riprove piu convincenti, ne argomenti piu incontrastibili per determinare sicuramente, che questo secondo Sale cavato dalla nostra Termale sia un vero, e legittimo Sale alcalino. In mezzo a ciò per altro può nascere un sospetto, se tale veramente fusse nell' acqua sul dubbio, che possa essere divenuto di detta qualità a motivo dell' azione del fuoco applicato nell' atto della evaporazione. E noto quanto facilmente in certe circostanze alcuni Sali per la forza del fuoco divengono alcalici, quando prima non erano di questa natura. La sola combustione dei vegetabili all' aria aperta riduce il loro Sale acido in alcalico, di cui una prozione è fissa, che resta nelle ceneri, e l'altra volatile, che ritrovasi nella fuliggine. Il Nitro fuso diviene alcalino col solo gettarvi dentro il Carbone acceso; Il Nitro, ed il Tartaro crudo mischiati insieme divengono in un momento alcalici col solo gettarli in un vaso di ferro arrovito; ed il Nitro stesso, naturalmente facilissimo alla fusione, diviene in un momento alcalico, e di fusione difficile per il solo contatto del Regolo di Antimonio fuso. Su questi ristessi adunque pensai prevalermi di un grado di calore molto piu piacevole di quello, che avevo praticato la prima volta; e perciò posi ad evaporare quattro libbre della nostr' Acqua in vaso di vetro sopra un leggierissimo suoco di arena, acciò ssumasse con somma lentezza; ma il risultato su, che dopo essere svaporata circa la metà incominciai a sentire l'odore di Ranno, quale si rese piu sensibile allor quando si ridusse a tre quarte parti in circa, ed assaggiato allora il residuo, si

manifestò a chiare note il sapore urinoso.

Tutto questo però non lo credei sufficiente a togliere ogni dubbiezza circa l'azione del fuoco. Erami noto, che
dopo avere M. du Clos, ed altri Accademici di Francia scoperto nelle Acque Minerali di Bourbon l' Archambault un Sale
alcali minerale, che credettero lo stesso del Nitro, o Natron
degli Antichi, esci in pubblico un Libro sotto il nome di M.
Paschal, trattante di queste acque, in cui l' Autore si oppone intieramente al sentimento de' predetti Accademici.
Rende per sospetto il mezzo del suoco impiegato nella evaporazione, e pretende, che questo sia un Sale misto composto di un acido volatile, e di un alcali sisso, e che dall'
azione del suoco essendosi scomposto, sia svaporato il primo,
restando il secondo, e questa opinione su dal pubblico molto applaudita.

M. de Boulduc riassunse di nuovo l'Analisi di queste Acque, e ne su pubblicata una Memoria tra quelle dell'Accademia Reale delle Scienze dell'Anno 1729. Esso dunque volendo dileguare l'objezione di M. Paschal, e dimostrare, che l'alcalescenza del Sale trovato nella sua Termale non era un prodotto del suoco impiegato nella evaporazione, ricorse al mezzo del ghiaccio, ed avendo esposte quattro libbre della sua acqua al forte rigore dell'Inverno, ed essendosi questa agghiacciata, asserisce, che ve ne restò circa

G

mezza oncia liquida, in cui si erano formati de i Cristalli molto minuti, e che il rimanente dell' acqua aveva un gusto molto lissivioso. Ad imitazione di questo valente Accademico posi ancora io quattro libbre della nostra Acqua in un catino di terra, e l'esposi per lo spazio di una notte all' aria aperta nel Mese di Gennajo in tempo di un rigidissimo freddo. Trovai la mattina la maggior parte dell'acqua gelata, a riserva di circa due once della medesima, che nel fondo era restata fluida, ma non ebbi la sorte di ritrovarvi alcuna cristallizzazione, nè di sperimentarla di un gusto molto piu lissivioso, benche per due volte replicassi l'esperimento. Mi parve dunque in questa occasione di trovare piu tosto verificato il sentimento di M de Mairan, il quale nella sua celebre Dissertazione sopra il Ghiaccio Part. 2. Sez. 3. Cap. 6 apertamente dimostra contro il parere del Kircherio, del Borichio, e del Bartolini, che l'acqua salata gelandosi non diviene dolce, nè si spoglia del suo Sale; ed in fatti avendo io assaggiato il mentovato Ghiaccio mi parve sentirlo salato nella maniera stessa, ch' era l'acqua avanti di congelarsi. Deluso circa il tentativo fatto col mez-20 del ghiaccio, pensai ad altro ripiego con l'idea di porre finalmente in chiaro, se quelto Sale minerale sia naturalmente alcalino.

Furono per tanto da me poste libbre dodici di Acqua Borra in un catino di terra, e dal principio di Novembre sino a tutto il seguente Febbrajo l' esposi al Sole in quei giorni, che questo era scoperto, che surono piu totto pochi, del rimanente poi lo collocavo in luogo dominato dal vento, o lo lasciavo puramente in una stanza. Finalmente ottenuta in tal guisa l' evaporazione dell' acqua con estrema lentezza, e dopo essersi prodotte successivamente varie deposizioni di terra, e cristallizzazioni di Sale comune, al termine di quattro Mesi osservai il liquido residuo del solito odo-

re, e colore di Ranno, e che in tutte le altre prove mostrò chiarissimamente le proprietà di un legittimo Sale alcalino, e produsse gl' istessi effetti prodotti da quello cavato con l'ajuto del fuoco. Da ciò dunque resta posto suori di ogni dubbio, che la qualità alcalina di questo Sale è naturale, e non prodotta dall'azione del suoco nell'atto dello svaporamento, e che in una parola è un vero Sale alcalino nativo.

Ma se mi è permesso dire con libertà ciò che ne sento, parmi, che susse totalmente vana, e senza sondamento l' objezione fatta da M. Paschal al du Clos, ed agli altri Accademici Parigini, ed in sequela di ciò inutili ancora le diligenze praticate da Boulduc, e da me. Imperochè quantunque sia vero, che il fuoco in certe occasioni induca l'alcalescenza in alcuni Sali, nondimeno questa proposizione è limitaca fino ad un certo segno, ne ha tutta quella estensione, che alcuni si persuadono. Primieramente da innumerabili Chimici sperimenti a noi non costa, che altri Sali si riduchino in alcalici dalla forza del fuoco, fuori che il Nitro, ed i Salı de' Vegetabili, onde per questo capo non saranno mai foggetti ad una tale mutazione i Sali fossili, quali appunto sono quelli delle Acque minerali. In secondo luogo ciò si comprova mirabilmente dal Sale, che nelle Rupi sulfuree di Pozzuolo s' innalza da i fuochi sotterranei, e si attacca a i sassi posti nelle aperture degli spiragli, e da quello, che si getta fuori ne i piu violenti incendi del Monte Vesuvio, quali due Sali, chiamati Sali Ammoniaci nativi, a dispetto della maggior violenza del suoco sosserto ritengono la natura di terzi, senza acquistare un minimo grado di alcalizzamento: mentre io stesso ho piu volte sperimentato, che l'affusione in essi dei spiriti acidi non produce alcun segno di effervescenza; e ciò notarono ancora gli Accademici Napolitani, che scrissero l'Istoria dell'Incendio del Vesuvio del 1737. i quali al Cap. 4. ci dico-

a no

no che mescolato il Sale del Vesuvio con olio di Tartaro non fermenta, siccome non fermenta ne anche collo spirito di Vetriolo, e di Sale: argomento da fare intendere, che sia que sto un Sale: neutro, cioè che non abbia nè dell' acido, nè dell' alcali. Il Sale di verro, che non è altro che una spuma salsa, che si leva dal vetro fuso nelle fornaci, è della natura del Sal Gemma. che vale a dire di un Sale neutro, e non bolle con alcun acido ordinario, e perciò non mostra alcun contrassegno di alcali, benche abbia sofferto un fuoco violentissimo, e benche provenga dalla soda, ch' è un' alcali potente. Per terzo vuole M. Paschal, che nell'acqua esaminata dal du Clos vi fusse un Sale neutro composto di un Sale alcali fisso, e di un acido volatile, e che dalla forza del fuoco adoprato nella evaporazione si sprigionasse l'acido, e restasse l'alcalino. Ma quì bisogna rissettere, che quando un Sale alcali ha assorbito un acido, ordinariamente la forza del fuoco non ha piu attività di separarli, ma per ottenere questo fine vi sono necellari altri mezzi piu opportuni. Quando il Sale di Tartaro è imbevuto dell' acido vetriolico, o di quello del Sale Marino come nel Tartaro vetriolato, e nel Sale digestivo di silvio, non è bastante il calore del fuoco a separare la parte acida dall' alcalica, ma vi bisogna nel primo l'unione di una sostanza flogistica, e nel secondo la mescolanza di un' acido vetriolico. Il Sale Ammoniaco è cosa nota non essere altro, che un Sale composto da un alcali volatile, e dall' acido del Sale Marino, eppure la sola attività del fuoco non giunge a scomporlo, nè a separare questi due principj, ma vi abbisogna il mezzo, o di un' alcali fisso, o di uno spirito acido piu potente, come è quello del Vetriolo, o del Nitro. Da tutto questo dunque chiaramente comprendesi, che la potenza del fuoco in alcalizzare le sostanze saline debbe ristringersi dentro a certi limiti, e relativamente ad alcune di esse, nè debbe

debbe estendersi così generalmente, come sembra aver satz to M. Paschal contro il du Clos.

Si riunirono poi a dimostrare con evidente chiarezza l' esittenza di un alcali nativo dentro la nostr'acqua Termale certe affusioni fatte in essa di alcune opportune sostanze: Non parlo di quelle di certe materie acide, come dell' Olio di Vetriolo, che vi bollì fortemente, nè degli spiriti di Verriolo, e di Sale Marino, che vi produssero una effervescenza alquanto piu leggiera, nè del Giulebbo violaceo, che colori l'acqua di verde, perche conforme mostrai nel trattare delle Acque di Chianciano, queste sono dubbiose, ed equivoche; ma mi prevalsi di altri mezzi piu sicu:i. Mischiatovi dunque il Rabarbaro polverizzato produsse una tintura rubiconda, e dalla polvere di Galla dopo qualche tempo ne nacque un colorito di verde, effetti, che sappiamo derivare da un Sale alcalico. Affusa poi la nostr' Acqua nella soluzione del Mercurio sublimato divenne il mescuglio lattiginoso. Ma sopra disti; che mescolato il nostro Sale alcalico, o la sua liscia colla predetta soluzione, ne nacque una mistura di colore ranciato. Or quì è necessario osservare qualmente, gli al. calini volatili, come lo Spirito di Sale Ammoniaco, quello di Urina, o di Corno di Cervo producono l' intorbidamento lattiginoso nella soluzione del Mercurio sublimato, dove che gli alcali fissi, come il Sale di Tartaro, le Ceneri clavellate, o altro consimile, vi cagionano un colore ranciato. Se dunque il Sale di Tartaro, o altro fillo si pone nel mescuglio lattiginoso prodotto dallo Spirito di Sale Ammoniaco, o da altro alcali volatile, persiste, e si conserva lo stesso colore lattiginoso; dove che versato lo Spirito di Sale Ammoniaco, o altro alcali volatile nel mescuglio ranciato prodotto dal Sale di Tartaro, o da altro alcali fillo, detto mescuglio di ranciato

ranciato ch' era, diviene subito lattiginoso, quasi che gli alcalini volatili in produrre il loro rispettivo colore nella soluzione del sublimato avessero maggiore attività de' Sali alcalici sissi. Nella predetta soluzione adunque divenuta ranciata col mezzo del nostro Sale alcalino vi mescolai la nostr' acqua Termale, e quella di ranciata che era divenne lattiginosa; dove che colla detta soluzione unitavi l' Acqua Borra divenne il mescuglio lattiginoso, ma versatovi poi il nostro sale alcalino, e la sua liscia, non cangiossi punto il colore, ma rimase lattiginoso. Da ciò sembrerebbe nascere motivo di congetturare con molta verisimiglianza, che oltre un' alcali sisso si contenga ancora nella nostr' Acqua un' alcali volatile, che in atto della evaporazione si sollevi per l' aria, e per essa si vada dissipando. Il che per altro senza ulteriori maniseste riprove non oltrepassa i termini di una sem-

plice, e mera congettura.

Sicchè dall' esposto fin qui chiaramente rilevasi, che si trovi un' alcali nativo minerale nella nostr' Acqua Borra; nè realmente è cosa nuova, che diasi un Sale nativo di simile natura. Celebre molto è presso gli Scrittori il Sale fossile dell' Egitto, chiamato Nitro, ò Natron degli Antichi, che ci viene descritto per un Sale alcalico minerale, e tale veramente io stesso l' ho ritrovato con diversi sperimenti fatti sopra il medesimo. Di piu Francesco Stefano Geoffroy nel Trattato de Materia Medica T. 1. Sez. 4. Cap. 2. ci fa sapere per relazione del Tournefort, che ne i Campi dell' Asia minore non lungi da Smirna, e da Eseso, la terra forma nella Primavera, e nell' Autunno certi piccoli monticelli, dai quali si estrae un Sale lissivioso atto a ripulire le vesti, ed a formare il Sapone. Il du Clos, e Boulduc, conforme ho detto, scoprirono il Sale alcali nativo nell' Acqua di Bourbon l' Archambault, e Federigo Offmanno lo ritrovò nelle Acque delle Terme Caroline, come può vedersi dalla dillertadissertazione de Thermis Carolinis, e da quella de Sale Medicinali Carolinarum. Il Sig. Vallerio poi nella sua Idrologia re-

gistra diverse acque imbevute di Sale alcalino.

Può pertanto ognuno comprendere quanto si allontanasse dal vero l'immortale Boerave, dalla cui somma autorità sedotto ancor io pensai in altro tempo diversamente, il quale volle farci credere, che ogni Sale alcalico sia un puro prodotto del fuoco, e che tale senza l'ajuto di questo naturalmente non si ritrovi. Ecco come il medesimo si spiega Chem. Tom. 1. de Artis Theoria pag. m. 388., e 389. Quousque werd rerum naturam novi exploratam hactenue, nunquam inventus fuit ullus Sal naturalis, cui (parla dell' alcalico) dicta modò nota convenunt. Omnes autem illi de vegetabili materia sola ignis actione producti fuerunt. Verùm a nato orbe, atque in illo combustione facta vegetabilium, semper orti fuerunt hi sales, quando arsere vegetabilia in cineres collapsa. E poco dopo soggiunge sequitur autem inde, quod natura quatenus eam cognoscimus hucusque, nunquam agat per Sales alcalinos sixos, ut instrumenta sibi propria, nisi solum dum ea accipit primo per ignem prapara-ta, aliter verò nunquam. A ciò potrebbe aggiungersi qualche altro luogo del medesimo indicante lo stesso, che per brevità tralascierò.

Quantunque sopra io abbia detto, che il Sale, di cui si parla, è molto simile a quello di Tartaro, nondimeno non bisogna supporre, che passi fra essi una totale uniformità, e convenienza senza qualche notabile divario; onde spiegherò alcune dissernze specifiche, che con varj, e replicati tentativi, ed osservazioni ho discoperto passare tra i medesimi. In primo luogo l'acrimonia del nostro è alquanto minore, e più mite di quella del Sale di Tartaro. Secondo. I spiriti acidi non bollono nel primo con quell'impeto, e veemenza, con cui bollono nel secondo. Terzo Il Fegato di Zosso preparato col nostro, e sciolto nell'acqua, o nello spirito

di Vino, vi produce una leggiera tintura aurea, o di Zolfo, ma quello preparato col Sale di Tartaro vi produce una tintura rubiconda. Quarto. Se s' infonde l' aceto nella soluzione del Fegato di questo ultimo, esala un ingrato, e fetido odore sulfureo, ma nella soluzione del Fegato del primo versatovi l'aceto esala un alito non così grave, nè tanto sulfureo. Quinto. I Sali terzi prodotti dall' unione dell' acido vetriolico con questi due Sali alcalici hanno ancor essi le loro differenze, poiche quello che nasce dal Sale di Tartaro è più acre, e più amaro di quello derivato dal Sale alcalico della nostr' Acqua. Sesto. Questo Sale terzo più facilmente si fonde, che quello. Settimo. L' Alcali della nostr' Acqua esala, e si dissipa per l'aria al calore di un Fornello di riverbero, a cui l'altro si osserva rimanere fisso, e costante. Queste sono le differenze, che ho sperimentato passare tra questi due Sali alcalici, ed altre forse ne avrei rilevate, se il tedio, e la pazienza di proseguire piu a lungo simili minuti tentativi me l'avessero permesso.

Passiamo adesso ad una ricerca non poco importante per lo schiarimento di un' Articolo di Chimica, diretta a stabilire, se questo Sale alcali nativo sia una sostanza affatto distinta, e separata dal Sale Marino, e che non abbia alcuna parte nella composizione del medesimo, oppure se sia la base alcalina di questo, alla quale accoppiata la parte acida, e spiritosa si produca il Sale predetto di quella terza natura, di cui viene costituito. Imperoche per essere il Sale Marino un Sale composto debbe per necessaria conseguenza avere una base o metallica, o terrea, o salina, e siccome la prima debbe per ogni conto escludersi, perciò si riduce la questione a sistare, se detta base sia terrea, o salina. La maggior parte de i Chimici, particolarmente dopo la pubblicazione delle Opere del Tachesio ha creduto, che il Sale Marino nasca dall' u-

nione di un acido, e di un alcali antecedentemente prodota ti. Il Boerave prevenuto dal sentimento, che ogni Sale alcalico sia un prodotto del fuoco, si oppose a questa opinione sul sissesso, che è molto probabile, che il Sale Mari-no esistesse avanti, che alcun Sale alcalico nascesse dall' abbruciamento delle piante. Ecco come il medesimo si spiega nella Chimica Part. alt. de Artis Theoria pag. M. 400. Multa super hac materia cogitanti succurrunt: credibile admodum salem in mari extitisse, prinsquam Spiritus acidus hujus salis ullam notam sue dederit presentie, priusquam ullum alchali sixum de plantis exustis suerit repertum. Il sunchero poi molto confusamente parla di queita base alcalina del Sale Marino, asserendo esfere una terra, che chiama ora Calcaria alcalica, ed ora Salina: nel Tom. 4. Tavol. 5. così dice Sal comune, & ejus praparata. Triplex hoc obvenit vel marinum, vel fontanum, vel fissie, quod etiam sal gemme dicitur, omnia ex sin-gulari acido mercuri alis indoles. E terra alcalina calcaria natura generat. E nel Iom. 8. Tav. 64. cost si esprime Ex acido specifico, & terra alcalina singulari sal comune constare diximus. De prioris nempe acidi specifici indole pragressa tabula exposuimus: ergo de terra alcalina, eaque singulari dicendum nunc restat. Altera hac pars constituta sali acido suppeditat consistentiam densam, & compagem Cristallinam: unde illius acrimonia occultatur, temperatur, & infringitur. Vocatur vulgo alcalina, & non solum est salina, sed etiam specialis indolis, id quod varia illius pre-prietates confirmant. Ma le proprietà, che egli adduce di que-Ita sua terra alcalica calcaria, salina, sono tutte convenienti ad un vero, e legittimo Sale alcalino, e non ad una terra.

Stefano Francesco Geoffroy nel suo Trattato de Materia Medica Tom 1. Sez. 4. Art. 2. dice, che sciolto il Sale Marino nell'acqua, ed evaporata la soluzione a cuticola, di una porzione si formano mediante il freddo de i Cristalli cubici, ma che l'altra porzione, cicè l'alcalina, non può ri-

H

seccarsi se non per via del calore, che non forma alcuna figura regolare, e che esposta all' aria umida va prestamente in deliquio. Da ciò deduce, che il Sale Marino è un composto di un' acido particolare, e di un' alcali minerale, la cui parte acida è talmente avviluppata dall' alcalica, che appena può esercitare la sua forza. Ciò comprova con altro esperimento, in cui dimostra, che se lo spirito di Sale Marino venga faturato dal Sale alcalico di Tartaro, il misto si converte in un Sale terzo, che nel sapore, e nella figura cubica rappresenta esattamente il Sale Marino. Quantunque Geoffroy abbia determinato questo punto con molta esatrezza, tuttavia non ci da una cognizione sufficientemente estesa intorno alla natura di questo alcali minerale. M. Macquer nella sua Chimica Pratica Tom. 1. pag. 84. asserisce, che il Sale Marino è un Sale neutro, il cui acido non si trova o sia dentro l'acqua, o sotto la terra, se non unito ad un alcali fisso di una specie particolare, ch' è la sua base naturale: Ma niente avanza di preciso intorno alle particolarità specifiche di questo alcali sisso; solamente nel Tom. 2. pag. 341. e 347. asserisce, che l'alcali della soda è analogo alla base del Sale Marino. Io veramente non sò vedere questa analogia, anzi parmi di scorgervi delle differenze molto notabili. M. Geoffroy Juniore in una Lettera scritta al Cav. Hans-Sloane Presidente della Società Reale di Londra, sopra il Sale Policresto di M. Seignette, il cui Estratto è inserito nelle Transazioni di Londra del 1735. avverte, che il Sale della soda, con tutto che sia un alcali sitio, nondimeno si cristallizza di una maniera, che gli è particolare, nè si scioglie facilmente all' aria, come altri Sali sissi, anzi al contrario vi si calcina come il Vetriolo, o il Sale di Glaubero . Replicai ancor io questo sperimento di Geoffroy, e fatte le debite preparazioni alla cenere della soda, trovai, che il suo Sale benche alcalico si cristallizza, e che di piu i suoi Cristalli

cristalli sono appunto della figura del Cristallo di Monte; cioè terminati da due piramidi essagone, colla colonna intermedia parimente essagona. Non apparisce dunque la pretesa analogia tra il Sale della soda, e quello, che serve di base per il Sale Marino, anzi vi si scorge una notabile disferenza, poiche questo ultimo, come osservò Stefano Francesco Geossroy, non si cristallizza, ma si scioglie esposto all'aria aperta, e lo stesso si verifica del Sale alcalico della nostra Termale, quale passerò adesso a dimostrare essere la vera base alcalica del Sale Marino.

Che questa base sia un Sale, e non una terra può in due maniere ad evidenza dimostrarsi, cioè per via di sintesi, e di analisi, o sia di composizione, e resoluzione. In ordine alla prima mostra l'esperienza, che le terre alcaliche non possono servire di base per costituire il Sale Marino, poiche saturate del suo spirito le terre di tale natura come sono gli occhi di Granchi, la terra di Nocera, i gusci di Uovo, le Conchiglie preparate, l'osso di Seppia &c. non diviene questo misto un Sale Marino, ma bensì un Sale salso, amaro, e subastringente; dove che mescolato detto spirito con un Sale alcali fisso ne deriva un Sale molto simile al Sale Marino. Relativamente poi all'analisi è noto, che qualora uno spirito acido unito ad una sostanza o terrea, o metallica compone un Sale calcario, o metallico, disciolro questo nell' acqua, e versato nella soluzione l'Olio di Tartaro si produce subito un turbamento nel misto, ed una deposizione al fondo del Vaso, senomeno, che deriva dalla maggior forza di attrazione del Sale di Tartaro verso le parti acide, a motivo di che le assorbisce, seco le congiunge, e le separa dalle parti terree, o metalliche, le quali abbandonate dalle parti acide, in virtù delle quali stavano disciolte nell' acqua a guisa di Sale, turbano prima la trasparenza dell' H 2 acqua

acqua stessa, e quindi per ragione della maggiore grazvità specifica relativamente a quella dell' acqua, debbono per necessaria conseguenza cadere al fondo del Vaso. Non così accade, se nella soluzione del Sale Marino si versi l'Olio predetto; poichè allora non succede nel misto ombra alcuna d' intorbidamento, o di deposizione, ma si mantiene chiaro, e trasparente. Or qui bisogna necessariamente conchiudere, che o la parte acida si mantiene unita all' alcalica senza cedere all' azione del Sale di Tartaro, e perciò debbe essa essere un Sale, poiche se fusse una sostanza terrea resterebbe separata, e cagionerebbe il turbamento, oppure se resta separata bisogna parimente inferire essere un Sale, poiche non ostante questa separazione si mantiene disciolta nell' acqua senza produrre alcun cangiamento nella chiarezza, e rrasparenza della medesima, ne alcuna deposizione al fondo del Vaso.

Ma per autenticare con i fatti questa proposizione seci saturare collo spirito di Sale una porzione di terra di Nocera, ed altra porzione del Sale alcalico della nostr' Acqua, ed ottenni dalla prima mistura un Sale salso, e amaro, e subastringente, e dalla seconda un vero, legittimo Sale Marino. Sciolte separatamente queste due sostanze in acqua pura, e seltrate le soluzioni per carta, infusi nell' una, e nell' altra l' Olio di Tartaro, e subito nella prima insorse un coagulo denso, e lattiginoso, che in appresso si depose al sondo, ma nell' altra non si sece alcun minimo cangiamento. Da ciò dunque chiaramente rilevasi, che la base del Sale Marino è un Sale

alcalico, e non altrimenti una terra.

Ciò supposto sembrerebbe già dimostrato, che il Sase alcalico dell' Acqua Borra sia quello stesso, che serve di base al Sale Marino, qualunque volta si rissetta a quanto ho di già avvertito, cioè che saturato questo alcali

dal-

dallo spirito acido di Sale si rigenera un Sale, che mostra totalmente la natura di Sale Marino. Ma questo a dir vero non basta, poiche quantunque dalla unione di detto Spirito con un' alcali sisso nasca sempre un Sale simile al Marino, nondimeno secondo la varietà degli alcalici sissi i Sali rigenerati hanno sempre qualche loro specifica proprietà, per cui in parte differiscono dal nativo. In riprova dunque della mia proposizione sarà mio incarico il sar vedere, che tra il rigenerato col Sale della nostr' Acqua, ed il nativo non vi passa alcuna differenza. Ma siccome mi conviene rispondere ad alcuna differenza. Ma siccome mi conviene rispondere ad alcune objezioni del gran Boerave, la cui autorità per essere di un Maestro così dotto, e rispettabile merita giustamente ogni attenzione, perciò nelle risposte medesime mi caderà in acconcio il dimostrare la verità del mio assunto, e far vedere la totale uniformità del Sale rigenerato coll' alcali dell' Acqua Borra al Marino nativo.

Il Boerave adunque fissato nel sentimento, che alla produzione del Sale Marino non concorra alcun Sale alcalico, produce varie dissicoltà, le quali esportò con le stesse su produce. -- Multa super hac materia cogitanti succurrunt: credibile admodum Salem in Mari extitisse priusquam Spiritus acidus hujus Salis ullam notam sue dederit presentiæ, priusquam ullum alcali sixum de plantis exustis suerit repertum. -- Chem. P. alt. pag. m. 400. Ma già a questo si è di sopra risposto, che non ogni Sale alcalino deriva dal suoco, ma che si ritrova ancora sossile, e naturale. Segue poi -- quin etiam de Sale Marino nemo mortalium huc usque per ullum experimentum cognitum dedit vel unum granum alcali sixi. Rem exploratam narro: si Sal Maris purissimus, siccissimus, triplo boli vulgaris siccissuma diu terendo intime permiscetur, deinde autem igne summo, omnique arte urgetur, dabit certam semper portionem Salis acidi. Neque plus deinde quocumque d. mum igne urseris, elicies unquam. Superest autem tum semper in fundo vasis bolus aduch

adbuc falta. Si de bac ope aque, eluis omnem omnino bunc falem bunc colando cum cura depuros, atque iterum in salem cogis, quid babebis ? Ego sane nibil penitus alcali deprehendi unquam, sed salem marinum adbuc. Che il Boerave non trovalle punto di alcali nel capo morto rimatto dopo la distillazione del Sale marino col mezzo del bolo, non è cosa da farne maraviglia, anzi secondo ogni buona regola, e principio di Chimica cosi appunto doveva seguire, nè poteva trovarvesene un minimo vestigio, quantunque un alcali concorresse a costituire il Sale Marino. Uno dei principali motivi, per cui non si distilla il Sale Marino senza l'aggiunta di qualche mezzo, è perche il fuoco non è capace da se stesso di scomporre questo Sale, ma vi è necessario un acido di maggiore essicacia, quale scacci dalla sua sede l'acido del Sale Marino, e vi subentri esso in sua vece; e perciò si adoprano le terre bolari, che contengono un acido vetriolico più potente di quello del Sale Marino. Con tutto che dunque la base di questo sia un Sale alcali, non potrà giammai comparire nel residuo della distillazione, perche se resta separato dal suo acido, è rimpiazzato dal vetriolico, e si forma un altro Sale neutro differente dal primo. Quelle porzioni poi di Sale Marino che non restano investite dall' acido vetriolico del bolo rimangono nel suo stato primiero senza alcuna mutazione. Quello poi, che soggiunge il Boerave Ego sane nibil penitus alcali deprehendi unquam, sed Salem Marinum adhue, non accorda con quanto il medesimo dice nella terza Parte della Chimica Proces. 144. dove parlando della distillazione del Sale Marino col bolo dice -- In fundo Bolus manet salsa Hinc coxi in aqua: percola-vi ad limpiditatem usque lixivium. Inspissavi, babui Salis slavi non alcalini, sed salsi stiptici copiam satis magnam, videbatur novum Salis genus. Alla prima ci dice, che avendo sciolto, colato, e condensato il capo morto rimalto dopo la distillazione

che Sale Marino col bolo; non aveva trovato altro; che Sale Marino, e dopo asserisce, che ritrovò un Sale giallo, salato, stittico, e che pareva un genere di Sale nuovo. Per schiarire intanto questo punto dirò, che dopo la di-

stillazione del Sale Marino col bolo hò ritrovato in fondo della storta una massa con qualche grumetto di Sale, che non erasi scomposto, e che disciolta in acqua calda questa massa, colata, e condensata la soluzione, ho in fine ottenuto oltre à qualche Cristallo cubico una quantità di Sale giallo neutro, che veramente può dirsi di un nuovo genere, poiche si cristallizza in una maniera particolare, formando tante piramidi quadrangolari internamente vuote. Sono queste piramidi composte da quattro laminette triangolari, ed il luogo della base quadrata è vuoto senza alcuna lamina, che serve di base. Un Sale consimile, dice il Sig. Vallerio Mineral. Tom. 1. S. 91. Gen. 35. Spec. 194. trovarsi nella Botnia Orientale, ed esso lo chiama. Sal neutrum purum, pyramidale cavum, e soggiunge Ses pyramides sont quadrangulaires, & leurs quatre côtes wont se terminer en pointe, comme on peut le woir sig. 18. Elles sont creuses par dedans, & ressemblent a des ettonoirs quarres; il y a de ce sel neutre dans la Bothnie Orientale. Sopra questo Sale giallo vi hò versato l' Olio di Vetriolo, ma non si è prodotta alcuna ebullizione, nè sollevamento di fumi, il che oltre la diversità de' suoi Cristalli basta per escluderlo dalla natura del Sale Marino.

Or questo Sale giallo concavo piramidale da me scoperto nel capomorto restato dopo la distillazione del Sale Marino col bolo, della quale figura non sece alcuna menzione il Boerave, ma che da esso su creduto argomento sufficiente per escludere l'alcali dal Sale Marino, è quello appunto, che serve di una forte ragione per dimostrare, ch'esso Sale alcali vi è congiunto. Imperoche se nella soluzione di questo Sale giallo satto nell'acqua pura vi si mescola l'Olio

di

di Tartaro, non si produce turbamento alcuno, o deposizione, e perciò da quanto ho sopra notato ad evidenza si deduce, che la base alcalica di questo Sale terzo è un Sale, e che questo non poteva esservi stato lasciato se non dal Sale Marino scomposto. Ma per convincersi ulteriormente di ciò altro non vi bisogna, che ricomporre per via di artifizio lo stesso Sale piramidale concavo. Saturato per tanto collo spirito di Vetriolo una porzione del Sale alcalico della nostra Termale, dopo la dovuta soluzione, filtrazione, e condensazione, ottenni i Cristalli della mentovata figura piramidale concava molto belli, e di colore bianco per mancanza della terra bolare, che non poteva tingerli di giallo, come nel primo caso. Alcune di queste piramidi però non terminavano in punta, ma erano troncate con una sezione parallela alla base. Se dunque l'acido vetriolico o si unisca col nostro Sale alcali fossile, o con ciò, che lascia il Sale Marino scomposto nel fondo della Storta, produce nell' uno, e nell' altro caso lo stesso Sale neutro di una particolare figura di piramide quadrangolare internamente vuota, bisogna necessariamente inferire, che se il primo è un alcali fisso, sia ancora il secondo della medesima natura, e specie di quello.

Passa poi il Boerave ad un altra dissicoltà, ch' è la seguente -- Fateor acida hec affusa, lege artis, alcalicis, regeneratos dare Sales, qui quam proximè videntur accedere ad eos sales integros, de quibus igne expulsi suerunt illi spiritus acidi. Sed tamen aliquid semper observatur discriminis inter nativos illos Sales, interque regeneratos. Accorda dunque il Boerave, che lo spirito acido del Sale Marino assuso in un alcali dia un Sale, che si accosta alla natura del Sale suddetto, ma che però vi si scorge sempre qualche disserenza tra il rigenerato, ed il nativo. Vediamo intanto quali siano queste disserenze notate dai Chimici, da qual cagione derivino, ed in sequela

di ciò se l' objezione possa avere la forza pretesa. Le disserenze principali, che passano tra il Sale comune, ed il ri-generato col Sale di Tartaro, sono, che questo ultimo è molto piu sisso, che non può distillarsi in spirito, nè tampoco sublimarsi in fiori, il che accade diversamente nel nativo, da cui si estrae agevolmente lo spirito, senza molta difficoltà si fonde al fuoco, e fuso che sia, si solleva in forma di fiori bianchissimi, che si attaccano a qualunque corpo, che vi si tenga sopra. Or se io non m'inganno, ecco manifesta la ragione di un tale divario. Il Sale artefatto con quello di Tartaro contiene uno spirito acido legato ad un Sale alcalico dotato di molta forza di attrazione, difficile alla fusione, e molto fisso nella violenza del fuoco; quindi si concepisce, che non così agevolmente potrà da esso distrigarsi la parte acida per sollevarsi in spirito, nè tutto l' aggregato fondersi ad una mediocre violenza di fuoco nè sublimarsi in fiori. Ma nel Sale rigenerato coll' alcali della nostra Termale per essere la parte acida legata ad un' alcali molto mite, e per conseguenza dotato di minore forza attrattiva verso la medesima potrà essa con maggiore facilità separars, e distillarsi in forma di spirito. E siccome ho fatto offervare, che questo nostro alcali nativo facilmente si fonde al fuoco, e poi svanisce, e si solleva nell' aria, quindi è, che unito alla parte acida ancor essa volatile potrà facilmente fondersi, e unitamente sublimarsi in siori. Che un' alcali piu disposto ad innalzarsi per l'aria costituisca Sali terzi dotati della stessa inclinazione, oltre l'esempio del Sale Ammoniaco ce lo attesta lo stesso Boerave Chem. Tom. 1. p. M. 421. ove dice -- Sed ubi acidis his fossilibus nativis admiscentur Sales puri alcalini volatiles, tum verd exurgunt Salia Ammoniaca singularis generis, qua ex acido fossili, & alcali vo-latili composita forte Tartari vitriolati semivolatiles appellari distinctionis gratia possent. Ma

Ma ad oggetto di convalidare con fatti, ed esperienze queste mie rissessioni, e congetture soggiungerò, che aven-do posto in un crogiuolo il Sale Marino rigenerato col Sale di Tartaro, ed in altro quello rigenerato col nostro alcali, e collocati ambedue in un Fornello allo stesso gra-do di calore, dopo le consuete decrepitazioni il secondo facilmente si fuse, e quindi sollevato nell' aria si attaccò in forma di fiori ad una lastra di ferro sopraposta, dove che l'altro restò immobile, e fisso a quel gradodi fuoco. Ecco dunque che nel Sale rigenerato col nostro alcali non si manifestano quelle differenze dal nativo, che, si osservano in quello rigenerato col Sale di Tartaro, e perciò ancora per questo capo svaniscono le objezioni del Boerave. Quindi è facile argomentare ancora quanto il medesimo s' ingannasse, pensando, che l' estrazione dello spirito di Sale Marino succedesse piu tosto per via di una mutazione, che per via di una separazione delle parti concorrenti -- tumque semper commutatione longe potius, quam serparatione concurrentium partium loc. cit. Mentre la sola riunione è sufficiente a produrre lo stesso concreto, ch' era avanti, il che non seguirebbe se le parti concorrenti sussero mutate, ed alterate.

Il Sig. Enrico Pott nelle sue Osservzioni, e Animadversioni Chimiche sopra il Sale comune determina, che la sua base non sia un Sale alcalino, ma bensì una terra alcalina particolare, di cui la composizione, e mistura usata dalla natura per produrre questo Sale è a noi incognita. Ma io non so vedere per quale motivo si debba ricorrere ad una terra, e composizione incognita, quando l'alcali nativo cognito, e la mistura parimente cognita, di cui ho parlato, sono piu che bastanti a rigenerare un vero, e genuino Sale comune, consorme con piu

esperimenti ho dimostrato fino ad ora.

Non

Non tutte però le acque imbevute di Sale comune contengono questo alcali nativo separato dal primo, imperoche nella celebre Acqua del Tettuccio, abbondante, conforme è noto, di Sale Marino, che seci ssumare sul luogo medesimo, e di cui portai meco i sedimenti per esaminarli a mio bell' agio, non ve ne seppi ritrovare un minimo contratsegno. Il chiarissimo Sig. Dot. Domenico Vandelli nel suo eruditissimo Trattato De Thermis Agri Patavini, asserisce, che in quelle Acque Termali vi e il Sale comune, ma non sa menzione di alcun Sale alcalico, di cui averebbe certamente parlato, se vi susse stato, avendole esaminate con tanta diligenza, ed attenzione.

Tra i Crittalli cubici di Sale comune ottenuti dopo la condensazione della nostra Termale ve n' erano framischiati altri piccoli di figura lunga a guisa di aghi, ma in poca quantità. Il loro sapore era salso amaricante, e la figura per quanto potei comprendere con l'ajuto di una lente mi parve di parallelopipedi obliquangoli. A motivo dello scarso numero di questi Cristalli, e della loro piccolezza non mi su possibile il sare alcuna diligenza per rintracciare, se sullero di Sale calcario, ovvero del Sale mirabile di Glaubero, e perciò non mi è permesso l'avan-

zare niente di preciso su questo particolare.

Oltre i tre Salı gia divisati trovasi incorporato ancora nella nostr' Acqua lo spirito acido minerale volatile, che, conforme è noto, si rinviene nella maggior parte delle acque medicate, e da cui sovente deriva l'efficacia principale di esse nella cura delle malattie. L'esistenza di questo spirito è cosa facile il dimostrarla col solito esperimento di agitare un siasco pieno sino alla metà di quest' acqua, chiudendone la bocca con un dito, poiche dopo qualche notabile agitazione, levato il dito, succede una esplosione dell'acqua stessa, che viene spruzzata con forza in distanza di

alcuni passi. Replicata nella stess' acqua nuova agitazione immediatamente dopo la prima successe un debole spruzzo, ma dopo la terza non ne osservai alcun contrassegno. Lafciato il tutto in quiete per lo spazio di una notte, nella mattina seguente accadde la stessa esplosione, il quale esfetto continuò per alcuni giorni ma sempre piu debole, dimodo che finalmente del tutto svanì. Il chiarissimo Sig. Beccari nel suo Aureo Opuscolo sopra l' Acqua di Recoaro, inserito nel Tomo terzo dei Commentari dell' Accademia di Bologna, per rendere ragione di questo senomeno saviamente pensa, che non tutto lo spirito trasportato con l'acqua dal seno della terra svanisca in una sola volta, ma che ve ne resti ancora una porzione riposta nella sostanza della medesima, la quale poi successivamente si svi-

luppi, e si dilegui.

Ma qui può nascere un dubbio, il quale consiste in rappresentarsi per cosa inverisimile, che in uno stesso umore possino stare insieme un Sale acido, ed un alcalico in una totale inazione, senza fare effervescenza, e senza unirsi in un terzo composto, ma ritenere ciascuno le sue particolari proprietà, mentre è notissimo, che nell' approssimarsi insieme fanno tumulto, si uniscono, e si convertono in un Sale di terza natura. Quindi nasce, che non può fembrare credibile, che nell' Acqua Borra si contenga un Sale alcali nativo, ed uno spirito acido col ritenere l'uno e l'altro la sua qualità naturale, è senza degenerare in un Sale terzo. A ciò per altro si risponde, che poste le stesse cagioni non sempre accadono i medesimi ef-fetti, poiche alle volte si frappongono alcune circostanze particolari, che sono d' impedimento alla produzione degli effetti ordinari. Hanno offervato i Chimici piu famofi, e tra questi l' Ombergio, e Lemery il figlio (memorie dell' Accad. Real. delle Scien. dell' Anno 1719 ] che alle vol-

te gli acidi si ritrovano nel medesimo liquore con i Sali alcalini, e che a dispetto di questo mescuglio non succede fermentazione sensibile, ne detti Sali si riuniscono in un solo corpo, ma vi conserva ciascuno le sue proprietà particolari uno di Sale acido, e l'altro di alcali. Tralasciato per ragione di brevità il sentimento dell' Ombergio sopra l'inazione in certi casi di questi due Sali fra loro opposti, soggiungerò, che il Lemery pensa, che alcune parti oleose, che si trovano sparse nel liquore con-traendo una particolare unione con gli acidi gl' inviluppino, e contribuiscano molto a impedire la loro azione sopra i Sali alcalini. Quanto sia giusto, e ragionevole il sentimento del Lemery lo dimostrerò in appresso parlando del Sale Selenitico, dove sarò vedere, che le parti oleose, anzi per meglio dire flogistiche, non solamente impe-discono l' unione dei Sali acidi con gli alcalini, ma che ancora promuovono la loro separazione, quando sono di gia uniti, e congiunti. Che poi nella nostr' Acqua si contenga un Olio minerale volatile, o sostanza slogistica l' odore sulfureo dalla medesima tramandato in certi tempi chiaramente ce lo dimostra. E però vero, che tanto quest' Olio minerale, quanto lo spirito acido sono sostanze così volatili, che deludono tutte le diligenze de' Chimici per raccorle, imperocche svaniscono, e si dileguano per l' Aria.

Esposta la natura delle materie Saline ritrovate nella nofira Termale passerò adesso ad esaminare le altre sostanze contenute ne' sedimenti della medesima. Svaporatane una quantità restò un sedimento di colore in parte cenerino, e in parte giallo, alla vista dei quali colori poco mi volle a comprendere derivare questi da terre di natura diversa framischiate col sedimento. Sciolto per tanto questo in acqua pura, e colato per carta ad oggetto di separarne le par-

ti saline, restò in essa una materia di colore di tabacco aspersa di specchietti selenitici. A motivo dei mentovati colori da me notati nel sedimento sospettai essere quella materia un aggregato di terra alcalica, e di ocra, e perciò pensai di venirne in chiaro col mezzo degli esperimenti. V'infusi per tanto lo spirito di Aceto sul rislesso, che sciogliendo questo la terra alcalica averebbe con essa prodotta l' effervescenza, ed in sequela un Sale terzo amaricante, e con la seconda come partecipe del ferro una specie di Vetriolo, che unito con la Galla polverizzata averebbe dato una tintura nera, o violacea. Ne andai errato nelle mie congetture, poiche versato l' Aceto stillato sulla detta materia si svegliò subito l' effervescenza, quale cestata, divisi il misto in due parti, una delle quali lasciata in quiete produsse un Sale terzo amaricante, che si sublimò ai lati del vaso di vetro sopra il livello del liquido; ma gettata poi sull' altra parte la polvere di Galla si produsse subito un colore di violato oscuro. Ma per assicurarmi maggiormente, che tal colore producevasi dalla Galla per il mescuglio della parte del Ferro esistente nell' ocra, e sciolta dall' Aceto, colla soluzione del sedimento colata, e perciò spogliata di ocra ferrigna vi mescolai lo spirito di Aceto, e la Galla polverizzata, ma con tutto questo non si vidde nascere alcun colore nero, o violaceo, ma aggiuntavi una porzione dell' ocra suddetta comparve immediatamente il colore violaceo.

Finalmente altra esperienza mi convinse, che quella terra gialla susse una legittima ocra, piena di materia di Ferro. Potta una porzione di questa ocra, a cui per accidente era accoppiato un poco di Sale alcalino, in un crogiuolo, lo collocai tra i carboni di un ardente Fornello di riverbero; dopo estersi questo molto infuocato la predetta massa si fuse, e avendo cavato il crogiuolo, e lasciatolo rassreddare, trovai, che svanito il Sale alcalino vi era rettata una massa

folida, secca, e nera piena di specchietti risplendenti simili al Ferro, di modo che questa massa rassembrava una vera Miniera ferrigna. Staccatala a forza, e polverizzata vi accostai la Calamita, ed osservai, che quei specchietti obbedivano prontamente alla medesima: il che suori di ogni controversia apertamente dimostrò essere nella nostr' Acqua un vero, e legittimo Ferro sotto la forma di ocra. Questa stessa conseguenza deducesi pure da un altro fatto. Feci sciorre con lo spirito di Aceto una porzione della Gruma depositata dall' Acqua Borra, la qual Gruma per essere di colore gialloscuro su da me giudicata una ocra, che contenesse del Ferro; In questa soluzione mischiatavi la Galla polverizzata divenne il misto di colore viclato oscuro. Il Ferro dunque si ricrova ancora nelle deposizioni della nostr' Acqua indurite naturalmente a consistenza di Pietra.

Quantunque io abbia fatto manifestamente comprendere, che nella nostr' Acqua vi sono mischiate le due terre descritte, non bisogna per altro credere, che le medesime vi siano disciolte tali, quali le ho ritrovate, ma bensì sotto un' aspetto differente. Per intendere ciò bisogna prima rammentarsi, che le terre, e le materie metalliche non sono generalmente parlando dissolubili dall'acqua, nè possono stare ripartite, e sospese nella medesima, ma bensì qualunque volta per via di agitazione, e di forza meccanica con essa si confondono, la intorbidano, e le tolgono la trasparenza; ma poi lasciato il tutto in quiete appoco appoco per ragione della loro maggiore gravità specifica relativamente a quella dell' acqua, le dette materie cadono al fondo, e l'acqua in tal guisa ricupera la sua naturale, limpidezza. Or siccome l' Acqua Borra attinta dalla sonte si osserva limpida, e cristallina, bisogna necessariamente inferire, che le dette terre vi stiano intimamente sciolte, poiche se vi sussero puramente consuse, e rimescolate ca-

gionerebbero una manifesta torbidezza. E' adunque necessario, che un qualche Sale acido le disciolga, e seco le unisca in forma di Sale, ed in tal guisa le tenga ripartite nell' Acqua senza intorbidarne la trasparenza. Ma qualunque volta si fa la separazione dell' acido come col mezzo di qualche Sale alcalino o del fuoco, le medesime disunite dall' acido, e divenute inabili a mantenersi sciolte nell'acqua producono subito la torbidezza, e si depongono al fondo. Da cio dunque debbesi argomentare, che lo spirito acido tenga disciolte queste terre nella nostr'acqua, e che espulso questo per via del fuoco, o della sua innata fugacità, esse si deponghino in forma di sedimento. In riprova di ciò feci colare per carta quattro libbre di questa nostr' acqua, stata in riposo per più giorni in un vaso, e la colatura su sì chiara, limpida, e cristallina, che di più non poteva desiderarsi, e tale si mantenne ancora per qualche giorno senza fare alcuna deposizione. Fi-nalmente sopra una piccola dose di essa vi versai l'Olio di Tartaro, ed in altra lo Spirito di Sale Ammoniaco, e si produsse in ambedue le misture il solito intorbidamento lattiginoso; Il rimanente poi lo seci evaporare, e nel sedimento oltre i divisati Sali vi trovai una quantità delle terre suddette. Or qui si rissetta, che oltre a quel tanto già detto, se queste terre fussero state in forma di pure terre, non sarebbero passate a traverso del-la carta, ma sarebbero state in essa depositate, conceden-do quella libero il passo puramente alle parti saline, ed alle acquose; il che è facile ad ognuno il chiarirsene con facili esperimenti.

Qualunque volta una quantità di quest' Acqua posta in un vaso o si faccia lentamente svaporare al suoco, o si esponga al Sole, o si lasci in quiete in qualche luogo ombroso, poco dopo osservasi, che nella superficie di essa si formano

ascuni punti di colore cenerino, quali uniti, e combinati successivamente fra loro degenerano in tanti piccoli ramu-scelli simili a quelli delle dendriti; questi ramuscelli poi congiuntisi insieme occupano tutta la superficie dell' acqua, tessendo una membrana con molti vani lavorata a soggia degli ornamenti muliebri chiamati Merletti. Quindi i vani esistenti tra quelle diramazioni si riempiono successivamente quasi del tutto, riducendosi ad una membrana, o crosta quasi continuata, quale poi per l' aumento del-la mole, e del peso, e per la diminuita gravità specifica dell' acqua a conto del Sale rappreso, e cristallizzato a i lati del vaso, si precipita al sondo. Queste croste, che sono ruvide al tatto, e di consistenza petrosa, si chiamano col nome di Sale selenitico, perchè si formano nella maniera stella dei Sali neutri, cioè dall' unione dell' acido minerale con qualche terra. Non imprime però questo Sale alcuna sorta di sapore sulla lingua, ma si sperimenta affatto infipido, e cristallizzato che sia, difficile cosa è il discioglierlo nell'acqua. Vi si scioglie nondimeno quando si adopri di essa una quantità molto considerabile, al che è necessario ancora, che l'acqua sia all' estremo bollente, poiche a misura che si raffredda, la maggior parte del Sale selenitico disciolto nuovamente sa consolida, e si precipita in forma di polvere in fondo del liquore. Sotto a questo genere si riducono da M. Macquer (Chem. Prat. Tom. 1. pag. 24.) gli Allumi, i Gessi, i Talchi, le Seleniti, i Boli, e tutti gli altri consimili composti, i quali non differiscono fra loro se non a motivo della propria terra particolare. La ragione poi per-che quelli, che sono Alluminosi, si rendono facilmente solubili nell' acqua, esso crede essere, perche questi con-tengono molta quantità della medesima nella loro cristallizzazione, e perciò acquistano ancora facilmente la fluidità K

dità acquosa esposti al suoco. Quelli poi, che sono della la natura della Selenite, non prendono secondo il medessimo, nella loro cristallizzazione se non una piccolissima quantità di acqua, e perciò restano poco meno che indissolubili in essa, ed il suoco non può loro compartire la fluidità.

Comunque siasi di ciò debbe notarsi, che ancora a i Filosofi, ed a i Chimici de i tempi passati erano cogniti questi Sali selenitici, ma li credettero pure terre indurite a consistenza di Pietra. Adesso per altro vogliono i Moderni doversi ridurre a i Sali neutri, e composti, i quali possono per via di artissicio risolversi ne i loro primari componenti. Passerò per tanto a spiegare con qual mezzo siasi ne i tempi nostri discoperto essere queste concrezioni un composto di acido vetriolico, e di terra. Per bene intendere ciò è necessario premettere, che l'a-cido sulfureo, o vetriolico si unisce talmente con i Sali alcalici fissi, che non può da essi separarsi nè col suoco, nè con l'acqua, nè con altri Sali, conforme si sperimenta nel Tartaro vetriolato, nel Sale policresto, nel Nitro antimoniato, e nell' Arcano duplicato. La maniera adunque, colla quale riesce di separare con agevolez-za l'acido suddetto dal Sale alcalico, è l'unirvi una materia flogistica, la quale avendo una affinità, ò attrazione particolare con l'acido suddetto sa sì, che de-bolmente stia unito al primo; onde aggiuntavi poi una materia precipitante, si separa affatto l'acido vetriolico dal Sale alcalino. Da ciò appunto deriva, che i Sali alcalici non hanno una stretta connessione collo Zolfo, mentre un leggierissimo acido può disciorne l' unione. Perciò disciolto nell' acqua il Fegato di Zolfo, ch' è un composto di Zolfo, e di Sale di Tartaro, se vi si affonde lo spirito di Aceto, lo Zolfo, ch' è un' aggregato

di materia flogistica, e di acido vetriolico; si precipita al fondo del vaso. Ma se si sa ardere il predetto Fegato di Zolfo, non solo brucia la parte superflua del medesimo, ma quella ancora, che sta intimamente unita col Sale di Tartaro, onde consumata la parte infiammabile, l' acido sulfureo della medesima abbandonato si unisce strettamente al Sale alcalino di modo che non può separarsi, se non quando gli viene restituita la parte sogistica, che si ottiene col fare sondere detto Sale, e aggiungervi un poco di Carbone polverizzato, col qual mezzo si sorma nuovamente un Fegato di Zolso. L' artisicio adunque, di cui si prevalgono i Chimici per scopri-re, se in qualche sostanza vi sia annidato l'acido vetriolico, ò sulfureo, è di far fondere quella sostanza col Sale di Tartaro, e poi gettarvi il Carbone polverizzato, poichè se da tale mescolanza ne risulta il Fegato di Zolfo, è questo un sicurissimo indizio della esistenza di tale acido in quella sostanza. E la ragione si è, perchè essendo lo Zolfo, come si è detto, un composto di acido vetriolico, e di materia flogistica, essendosi in quel caso rigenerato lo Zolso, l'acido unito alla parte infiammabile del Carbone non poteva essere nel Sale di Tartaro, ch' è di qualità alcalica, nè tampoco nel Carbone, per essere una materia terrea, e tendente pure all'alcalico, onde debbe necessariamente inferitsi, trovarsi in quella sostanza, che si è fatta fondere col Sale di Tartaro; e questa è una scoperta, di cui siamo debitori al celebre Stalio.

Ciò presupposto soggiungerò, che seci sondere in un crogiuolo due parti di Sale di Tartaro asciutto, e bene secco, e che custodito ottimamente in vaso di Vetro, non aveva avuta alcuna libera communicazione con l'aria esterna, da cui avesse possuto assorbire alcuna parti-

cella di acido, e vi aggiunsi una parte di quelle concrezioni lamellari, che si erano formate nella superficie dell' acqua, e sul fine vi gettai dentro una sesta parte di Carbone polverizzato, si formò allora una massa nera, e tirante alquanto al rosso oscuro, la quale posta nell' acqua vi si sciolse esalando un leggiero odore sulfureo, quale notabilmente si accrebbe, quando v'infasi lo spirito di Acceto, per mezzo di cui si precipitò una piccola porzione di Zolso in sorma di una polvere bianca.

Può per altro quelta operazione farsi con metodo piu breve, e compendioso, ch' è quello di fare infuocare il detto Sale selenitico con l'aggiunta della polvere di Carbone, o di altra materia slogistica, conforme nota il chiarissimo Sig. Dot. Domenico Vandelli nel suo Trattato de Thermis Agri Patavini pag. 154. Poichè in tal guisa ancora si produ-

ce il Fegato di Zolfo.

Questo Sale selenitico derivato dall' unione dell' acido vetriolico con la terra è quello appunto, che costituisce la Gruma, o Ammassamento di Travertino deposto intorno a quella Sorgente, poiche dalla riunione dei piccoli punti, o molecule di esso Sale nascono le già divisate croste, e queste sopraposte successivamente fra loro innalzano alla sine un Ammassamento di sostanza petrosa. Una facile esperienza mi assicurò, che in questo Ammassamento sia nascosto l' acido vetriolico, allor quando postane una porzione in un crogiuolo, e collocato questo tra i carboni fortemente accesi di un Fornello di riverbero, dopo essersi molto infuocato, lo cavai, e viddi da quella Gruma sollevarsi un abbondante sumo biancastro, che tramandava l' odore stesso dello spirito di Vetriolo.

Dall' espotto dunque fin qui si conchiude, che in quest' Acqua minerale si contiene il Sale comune, o marino, un Sale alcalino nativo, un Sale terzo amaricante, uno spirito acido

minerale volatile, una terra alcalina, ed il Ferro in forma di ocra. In quanto alla dose poi di alcuni di questi ingredienti notai, che dalle libbre 12. di acqua fatta sfumare lentamente per lo spazio di quattro Mesi senza l'ajuto del suoco, si estrassero dramme sei di Sale Marino framischiato da vari Cristalli del divisato Sale terzo amaricante, circa a due dramme di Sale alcalino, ed una dramma, e mezza delle due terre consuse fra loro, e piene di specchietti selenitici.

Soggiungerò per ultimo, qualmente corre in oggi opinione coltante tra non pochi Filosofi, che le Acque Termali attualmente calde tardino più a bollire di quello faccia l'acqua comune fresca; ed in fatti in alcune esperienze fatte a S. Casciano de' Bagni osservai, che quell' Acqua Termale calda tardò a bollire piu dell'acqua fresca di un poz-zo per lo spazio di dieci minuti. M. de Secondat per altro nelle sue Otservazioni di Fisica, parlando dell' Acqua bollente di Dax contro l'opinione comune, per cui si credeva come un fatto costante, che l' Acqua di questa sorgente; benche caldissima, posta al suoco nel medesimo tempo, che l'acqua comune siedda, tardasse piu lungo tempo a bollire, afferisce di aver fatta l' esperienza in contrario alla presenza di un gran numero di Persone, che ne restarono maravigliate. Giacche per mancanza di qualche opportunità non mi era permesso il replicare questa esperienza alla sorgente della nostr' Acqua per averla attualmente calda, perciò pensai in altra maniera di fare un consimile tentativo. Poste due parti eguali di acqua co-mune, e di Acqua Borra tenute per non poco spazio di tempo alla stessa tenute per non poco spazio di tempo alla stessa temperie di aria in due vasi di vetro affatto uniformi, e collocati questi a fuoco di arena egualmente compartito, bollì l'Acqua Borra sempre prima della comune per lo spazio di tre minuti, avendo replicata l'esperienza per tre volte. Di piu il Mercurio nel Ter-

Termometro di Farenehit polto nell' Aequa Borra bollente si sermò a gradi 207. dove che nell' acqua comune bollente salì sempre a 212. gradi.

Osservando un piccolo recinto di terreno all' intorno della sorgente, che da quest' Acqua è del continuo bagnato, o che lo è stato, quando da altre bocche sgorgava la medesima, viddi, che copiosamente vi vegetava
il Coronopus marittimus minimus C.B. Prod. 28. alimentato dalla salsedine del Sale Marino. Ricercando suori del mentovato recinto non seppi ritrovarne pure una pianta. Di quelto stesso Coronopo ne osservai ancora una indicibile quantità intorno alla sorgente dell' Acqua del Tet-tuccio, e nel tempo stesso mi si presentò l' occasione di osservare nel Salsero, ch' è un fosso, nel quale scolano l' Acqua del Tettuccio, e le altre acque Termali di Monte Catini, il Kali, la Salicornia, ed altre erbe marittime descritte dal chiarissimo Sig. Targioni nel Tomo terzo dei suoi Viaggi pag. 326. Ma è oramai cosa notissi-ma presso i Naturalisti nascere intorno alle sorgenti imbevute di Sale Marino alcune piante proprie del Lido del Mare.

Resterebbe a me adesso di parlare del preciso grado di calore di quest' Acqua, della sua gravità specifica, e di non poche altre minute cose, ma per non dilungarmi soverchiamente mi contenterò di avere esposte sin qui le cose piu importanti, e di maggiore rilievo.



## ANALISI DELLA TERMALE DI S. CASCIANO

Fatta dal Signor

## OTTAVIO NERUCCI

Dottore, a Pubblico Professore Di Medicha Teorica Nell' Universita' Di Siena



A Termale di S. Casciano, detto col munemente dei Bagni, è fra le molte, che scaturiscono in varj Luoghi del Territorio Sanese, la più nota, e la più accreditata. Imperciocche, anche senza crederla quella stessa degli antichi Fonti Clusini, celebrari già da Orazio, conta Ella nondimeno superiormente alle

altre di questo nostro Stato per una lunga, e continuata serie d' Anni il concorso numeroso, e frequente di moltissime Persone, che da più, e diverse croniche infermità incomodate, alla suddetta Acqua ricorrono annualmente, o per ristabilirvisi del tutto in salute, o per ritrarne almeno qualche sollievo. Varj sono stati gli Scrittori, che in più, e diversi tempi han parlato de' componenti suoi, e della sua salubrità, fra' quali merita certamente una singolar distinzione il Sig. Dott. Jacopo Filippo Bastiani, Medico ivi condotto, come il più fedele, ed accurato esploratore de veri ingredienti di questa Termale, avvenga che ha Egli in una sua Opera intitolata de' Bagni di S. Casciano, e stampata in M. Fiascone il 1733., disingannato fra i primi le persone non meno intendenti, che le volgari dalla strana opinione, che di essa portavano intorno alle diverse specie de' mi-

nerali

nerali, dei quali credevasi piu o meno carica, e ripied na. Onde allontanatosi dal sentimento di coloro, che l' avevano esaminata prima di lui, dimostrò il primo per via di replicari esperimenti, e col mezzo di vari tentativi, che non il Zolfo, non l' Allume, e molto meno l' Oro, l' Argento, il Rame, e gli altri minerali, che da essi vanamente le si attribuivano, erano i veri, e sinceri ingredienti, dai quali essa acquistava la qualità di salubre. Se bene però di questo disinganno aver si debba prima che ad ogn' altro buon grado al celebre Friderico Offmanno, il quale nella esame satta della piu parte de' sonti medicati della Germania s' accertò non solo dell' insussitenza di tutta quella varietà di minerali, che per l'avanti il capriccio degli Indagatori poco esperti nel-le operazioni di Chimica vi avea riposto, ma determinò inoltre la natura, e quantità dei veri loro principi, distinse l'affinità, e convenienza, che passa fra di loro non meno, che fra quelli ancora delle altre chiamate acidule. Egli finalmente sgombrò dagli Animi preoccupati il timore, che questa sorta di Acque partecipassero di qualche Miniera venefica, e dimostrò con prove saldissime, che a riserva di quei Metalli, che, o di gia siano disciolti, o trasmutati in Sale, null' altro ven ha, che alterar possa la sostanza delle acque, e comunicar loro le proprie qualità, o perniciose, o salubri che elle siano. Ora dovendo io qui espor tutto quello, che da me fu osservato nella nuova esame commellami di questa nostra Termale, sarebbe espediente, che prima d' ogn' altra cosa mi facessi a descrivere la situazione del Luogo a parte a parte con le sue adjacenze, e che divisato minutamente tutto ciò, che in esse s' incontra di piu rimarcabile, riferissi inoltre tutti quegli avanzi di Antichità, che presso alcune di queste Terme anche a dì d'oggi si conservano, come quelli che posson servire d'incontra-

Rabile argomento per dedurne quindi il credito, e la riputazione, nella quale anche nei piu remoti tempi si tennetazione, nella quale anche nei più remoti tempi si tennero. Ma siccome tutto questo è stato di gia eseguito dissusamente, e con piena accuratezza dal sudd. Sig. Bastiani in
quella sua Opera, e siccome obbligo di mia incumbenza
al presente è soltanto quello d'esporre sedelmente, e con
tutta sincerità in questa mia breve relazione quel tanto,
che dall'analisi di questa Termale risultar può di schiarimento per meglio intenderne le sue qualità; Così voglio lusingarmi, che non sia per essermi fatta accusa da
chi in leggendola, la ritroverà unicamente ristretta, e limitata alla pura, e semplice narrazione di tutto ciò, che
alla natura di esse si appartiene

alla natura di essa si appartiene.

Se diasi un occhiata ai Colli adjacenti, che circonda-no in qualche distanza la Terra di S. Casciano, e si conderi la qualità del suolo, specialmente da quella parte, che stendesi da Levante verso Ponente, si osserva questo tutto spogliato, e cretoso. Questa creta di sua natura molto tenace, allorche bagnasi dalla pioggia, non è tutta di colore uniforme, ma dove rossa, dove gialla, dove ferrigna, ed è sparsa da per tutto d'una copia grande di piu, e diverse specie di Testacei, conforme sogliono essere per l'ordinario tutte le crere. Dall'altra parte poi che rignarda la dinario tutte le crete. Dall' altra parte poi, che r guarda la Linea di Tramontana, le sue Colline son tutte vestite, non essendo il terreno quasi niente pietroso, ma molto sertile, ed abbondante, solo è sparso piu quà, e piu là d'ogni sorta di Massi, e di gusci d'Ostriche impietrite, consus con quella terra piu disciolta. Il Colle poi, ove risiede la Terra di S. Casciano, specialmente da quella parte, che guarda il Mezzogiorno, ha qualche Masso di pietra ferrigna, detta volgarmente Manganese, ed ha ancora in qualche copia delle Agate, o Pietre socaje di varj altri colori, oltre alle Bianche, Rosse, Nere, e Lattiginose, le quali si trovano. dilpodisposte a strati, parte orizontali, e parte obliqui, ma non molto prosondi. Se sinalmente si ricerchi con qualche attenzione il territorio tutto, internandosi persino dentro a quei sossi, che incontransi tratto tratto sra via, si scuoprono in taluno di essi delle Marchesite in pezzi molto duri, d'un color d'Oro piu tosto slavato, ed in talun altro delle piu colorite, ma sciolte in minutissimi globetti, i quali, o sono consusi con certa terra tusacea di colore scuro, o sono attaccati alla superficie di certa pietra dura della natura della Selce.

Non v' ha Luogo in tutto lo Stato Sanese così copioso di acque calde, quanto questo di S. Casciano; Mentre da per tutto scaturiscono polle, e sorgenti piu, o me-no doviziose, ed abbondanti. Dimaniera che sembra a farvi della riflessione, che la Natura abbia costituito quel territorio, come sede particolare della Termale salubre. Imperciocche con quelta specialmente s' innassiano quelle Campagne, si nutriscono le piante, e gli erbaggi tutti, che, o vi nascono naturalmente, o che vi si coltivano che, o vi natono naturalmente, o che vi li coltivano dall' industria, e dall' Arce, e di questa soltanto si so-stentano gli Animali, ed i Bestiami, i quali non solo non la ricusano per loro bevanda quotidiana, ma pare anzi, che la preseriscano all' acqua fresca, della quale scarseggia assa tutto quel Luogo. Onde può ritrarsene quindi anche un argomento dell' innocenza grande di queste Acque, e dei loro componenti, specialmente, se aggiungasi a tutto questo la vivacità, che mostrano sotto di esse e le Rane ed i Granchi, i quali sogliono dimorare in conia dentro a quei sossi per i quali scorre l' rare in copia dentro a quei fossi, per i quali scorre l'acqua già rissutata dai Bagni, e la candidezza, che acquissano i Panni Lini lavati con la medesima. Quello però, che sopra d'ogn altro da nell'occhio, si è, conforme abbiamo già detto di sopra, la copia grande, ed abbondanza

danza di queste Acque, le quali dopo di aver fornito largamente il servizio di dodici Bagni, destinati parte alla bevanda, parte all' immersione, e parte alla doccia, il risiuto poi delle medesime suol servire a varj altri usi, e comodi della secretà; Imperciocche concorrendo tutte le suddette acque risiutate dai Bagni entro un fosso, formano elle il Fiumicello detto dell' Elvella, il quale sommiaulte, poi conissemente la acque resi un fosso, formano elle il Fiumicello detto dell' Elvella, il quale somministra poi copiosamente le acque agli Edisizi di tre Mulini, e di due Gualchiere. Ma cio per altro non debbe recar maraviglia a chi sacendo ben rissesso alla situazione del Luogo, di dove derivano queste Termali, comprende, che nascendo elle dalle interne viscere de piu alti Monti di questo Stato, cioè di Radicosani, e di Sarteano, debbono essere non solo perenni, ma abbondantissime ancora, consorme osservo Friderico Ossenno. Ed all' autorità di sì accurato Osservatore, sembra, che corrisponda ancor la ragione; Perocche la copia grande delle Nevi, che si sciolgono di continuo sulle cime di così alte Montagne, unita ai continui vapori volanti, che dall' aria incessantemente vi si depositano, si sa, che suol esser piu che bastante a somministrare ai sonti, ed anche ai siumi

che bastante a somministrare ai sonti, ed anche ai siumitutti l'abbondanza delle loro acque. Ma passiamo oramai a divisar le qualità di questa nostra Termale.

La trasparenza, che questa costantemente ritiene, senza mai alterassi a mutazione alcuna o di Stagione, o di tempo, ancorche trasportata lungi dalla sorgente, osfervasi maggiore di quella, che suole ordinariamente avere l'acqua comune, di modo che si distingue con maggior chiarezza qualssia oggetto sotto il corpo di quella, che di questa. Una tal dote, che per altro suol esser commune a tutte le acque minerali, la riconoscono esse da quello spirito acido, che in se contengono, il quale condensando quella porzione d'aria, che tramezza fra le particelle delle medesime, viene a riuguagliar cosi in densità

tutto quel mezzo aqueo, che può con maggior facilità dalla luce essere attraversato. Basta per assicurarsi di questa verità consultare la esperienza. Se si versino dentro un bicchiere d'acqua comune poche gocce di Spirito di Vetriolo, tosto si vede, che accresciutasi in essa la trasparenza, ha di già ella acquistato ciò, che nelle Gemme suol comunemente chiamarsi Spirito. E di quì certamente nasce, e non d'altronde quella limpidezza, che sopra a tutte le acque maggiore, e più brillante dimostrano le fredde minerali acidule, tanto cariche, come ogn' un sa, di Spirito volatile vitriolico. Non dimeno questa Termale, quantunque limpida, e cristallina, depone tuttavia in quei gorelli, per dove ella passa di continuo un Tartaro duro, formato di tante Lamine sottili sovraposte l'una all'altra, i corpi delle quali nel rompersi compariscono bianchi, e le superficie piane tinte d'un color giallo cupo. Esse dopo calcinate diventano ancor piu scure, passando col tormento del fuoco dal color leonato a quello d'un casse cupo.

Il Sapore non iscuopre sensibilmente in questa nottra Acqua ne alcuno de suoi componenti, ne alcuna delle loro qualità, comparendo al gusto del tutto insipida come l'acqua comune. Io però, a dir vero, nell'assaggiarla alla sorgente, ho sentito alcuna volta nel primo sorso serimi delicatamente la lingua da un agretto gentilmente piccante, appena però sensibile, il quale dopo quel primo sorso svaniva; tanta era la sugacità della sostanza, che produceva tal sensazione. Or questa a ben ristettervi, si comprende essere originata dallo Spirito volatile della Termale, che si manisesta appunto nell'atto di svilupparsi da essa, e volar via. Anche l'acqua comune, facendovi seria attenzone, dopo di essere stata agitata lungamente dentro alla bocca, lascia in sine nella lingua una certa asprezza, mista a un certo non so che di piccante,

che dimostra essersi sprigionato in quella violenta agitazione dalle intime parti di essa un qualche Spirito. Questo da
alcuni esserti, notati dalla sagacità del celebre Stalio, e riferiti poscia dall' Junchèro, comparisce appunto di una natura acida molto analoga a quello delle Termali. Imperciocche, oslerva egli, che tenuto del Sale alcalico a bollire alla lunga dentro all' acqua comune, degenera finalmente in
un Sal terzo, e che cristallizzata quella materia viscida,
lasciata dal medesimo in sondo al vaso, somministra dei Cristalli Salini della stessa indole del Tartaro vitriolato. [Juncher.
Tom. 8. Tab. 58. de acido universali] Tanto è vero, che
lo Spirito, detto comunemente acido universale, e primigenio, se bene non si manifesti egli sempre sensibilmente in
tutti i Corpi, trovasi non dimeno sparso da per tutto nella
Natura.

Per quanto uno s' aggiri intorno a quelle Vasche ripiene della Termale, non si sente odore alcuno, che faccia impressione sulle Narici, ancosche si osservi nelle mutazioni dei tempi, ed in particolare allora, che è imminente la pioggia, velata quell' Atmosfera, che sovrastà alle medesime d' una certa nebbia, che rende tutto quel trarto d' aria alquanto caliginoso. Nulla dimeno se nei tempi asciutti, e sereni s' appressino le Narici alle Cannelle di dove zampilla senza intermissione la Termale, o a qualche vaso ripieno di fresco della medesima, si sente tosto esalar da essa un alito sulfureo molto gentile, che velocemente svanisce. Questo su, che m'indusse a porre una moneta d'Argento ben tersa, e rilucente entro una polla della suddetta Termale, per veder, se si coloriva punto di giallo; Ma per quanto ve la lasciassi immersa per lo spazio d' un giorno, e d' una notte intera, non m' accorsi, che ella comparisse in nessuna parte macchiata d' alcun colore.

Tutta questa copia d' Acqua, somministrata da piu sorgenti, che scaturiscono a varie distanze, in tutto quel Territorio, ove ton sicuati i Bagni, oltre all' altra molta, che va scorrendo negletta per la Campagna, si raccoglie in dodici Bagni, tutti distinti con il loro nome particolare, alcuni dei quali sono contigui, altri separati, e discosti a qualche distanza fra di loro. Tre di questi servono per l'uso della bevanda, come il Bagno grande, il Bagno Bollo, e quello detto abulivamente della Ficoncella. Quattro sono destinati per le Docce, cioè il Bagno grande, quello detto la Doccia della testa, le Docce di S. Giorgio, e la Ficoncella. Gli altri servono per le immersioni, come il Bagno della Grotta, i due chiamati di S. Maria, e quello di S. Giovanni, quantunque anche il Bagno grande, e la Ficoncella servano a quest'istesso uso. A quelti se ne possono aggiunger due altri, in oggi non piu in uso, uno detto dei Fraticelli, l' altro del Loto, dalle lutazioni, alle quali è destinato, attea vigorar quelle parti d' un Corpo, che siano per qualche infermità rimaste soverchiamente infracchite.

Fra le qualità sensibili, che si rendono maniseste nella nostra Termale, quella del calore si è la piu notabile. Questo è stato da me esaminato piu volte, & in diverse ore del giorno diligentemente, a sine d'investigare i gradi, ai quali ascender suole tanto in quella contenuta dentro alle Vasche, quanto nell'altra, che cade di continuo dalle Cannelle. L'Istrumento del quale mi son servito è stato il Termometro Franneizziano, fatto d'Argento vivo, e racchiuso dentro a un tubo di Cristallo. Questo immerso nel ghiaccio indica il punto della congelazione al grado 32. e quello dell'acqua bollente al grado 212. Di questi il novantesimo suol esser quello per l'ordinario, che addita il calore dell' Uomo sano, e i gra-

di sotto a questo mostrano quello della nostra Atmosse-ra nella stagione piu calda in quei Luoghi, dove non giunga a ferirgli il Sole con i suoi raggi. Con questo mezzo giunsi a scoprire, che non eran tutte queste Acque della medesima temperie; mentre le piu calde nella loro sorgente arrivano a sar salire il Termometro dal grado \$5. indicante allora la temperie di quell' Atmosfera, sino al grado 192, e mezzo, e le meno calde a gradi 97. senza, che si noti accadere in esse la minima variazione nelle mutazioni tanto dei tempi, quanto delle stagioni. Una soltan-to ven ho osservata, ed è quella variazione di temperie, che sopravviene loro nella dimora, che san dentro alle Vasche, ove per esser elle esposte alla continua mutazione dell'amove per esser elle esposte alla continua mutazione dell' ambiente, che rinnuovasi pell'ingresso successivo di nuova aria, che entra di continuo per le finestre, perdono in quella loro dimora otto gradi di calore. Tanto si è sperimentato nell' Acqua del Bagno della Ficoncella, la quale alla sua sorgente alzava il Termometro sino a gradi 107. e nella vasca a soli gradi 99. Fra turte le sorgenti, quella del Bagno detto le Docce della Testa, è la piu calda, mentre alza ella il Termometro sino ai gradi 192 e mezzo. Le altre poi si ristringono tutte dentro a quelli, che tramezzano fra l' grado 192, e mezzo, e il nonagesimo settimo Ed in satti quella del Bagno S. Maria è di gradi 109., quella di S. Giorgio 105, quella delle Docce dette parimente di di S. Giorgio 105., quella delle Docce dette parimente di S Giorgio di gradi 107. quella di S. Giovanni di gradi 102. unitamente con quelle dette i Bagnini nuovi: Novantanove quella del Bagno Bosso, e 97., quella del Bagno della Grotta, che gli sta appresso. La costanza di queste Acque nel ritenere il loro calore, invariabile sempre in qualsivoglia stagione, e fin nel cuor dell' Inverno in mezzo alle nevi, dimostra chiaramente, che il suoco, onde son riscaldate sourcera sia non solomente prosondo, ma grande esteso. socterra, sia non solamente profondo, ma grande, esteso, e. perenperenne. Se poi si voglia indagarne la sua prima origine, non si trova nelle vicinanze di questi Bagni cosa di particolare, cui attribuire si possa. Sicche sa duopo ricorrere a quelle cagioni generali già stabilite, che sono, o le sermentazioni metalliche delle Marchesite tanto Marziali, quanto Sulfureo-vitrioliche, risvegliate per entro alle viscere delle Montagne dal passaggio delle acque, nell' atto, che sciolgono quelle terre Metalliche, o l' incendio sotterraneo dei Carboni sossili, e dei Bitumi, consorme osservasi nei Vulcani.

La specifica gravità, o peso della nostra Termale, esaminata piu volte coll' Idrometro, si osservò minore quando è ella calda, come suol esser subito estratta dalla sorgente, che quando è ridotta dell' istessa temperie dell' ambiente, consistendo la differenza in due soli gradi. Mentre nella Termale calda l' Idometro s' immergeva fino a gradi quindici, nella gia raffreddata fino a gradi tredici. Fu paragonata inoltre coll'acqua piovana, e si avvertì, che fra questa, e la Termale non vi passava la minima differenza di peso, purche fussero ambedue d'ugual temperie. Sicchè su facile il poterne dedurre, che i gra-di del calore piu, o meno intenso, sacevano, come d' ordinario suole accadere, la differenza del peso fra la Termale, e la piovana. Lo stesso esfetto su notato ancora nel porre al cimento, e paragonare la Termale di un Ba-gno, con quella degli altri. Imperciocche fu osservato, che tutte variavano fra di loro nel peso a proporzione della diversità del loro calore; quindi è che nei Bagni piu caldi scendeva l' Idrometro fino a gradi quindici, e mez-20, e nelle piu temperate a soli gradi quattordici.

Mi piacque oltre a ciò di tentar la Termale suddetta col fuoco, ponendola a bollire in confronto dell'acqua piovana fresca. Pigliate adunque due porzioni uguali d'

Acqua

Acqua, una della Termale subito estratta dalla sorgente, e l'altra della piovana naturalmente fresca, e riposte ambedue in vasi uguali, e sopra all'istesso suoco, osservai, che la Termale giunta, che ella su 112. gradi del Termometro alzò il bollore, ma dieci minuti dopo alla piovana. Questo senomeno mi ridusse alla memoria, che M. Astruch avea osservato altrettanto nella Termale di Balaruch, ma con tutto ciò non mi persuasi, che que-sto sosse un carattere proprio di tutte le Termali, sapendo bene, che vene son di quelle, che bollono ancora prima dell' acqua comune. Non contento di tutto questo, replicai lo stesso esperimento con le acque medesime, ma condite prima coll' Olio di Tartaro, nè altro osservai di particolare nel loro bollore, suor che le gallozzole nella piovana si erano augumentate di volume sopra a quelle della Termale, e che si rompevano piu sollecitamente. In sine posi a bollire due porzioni d'acqua Termale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta, e l'altra mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta di volume sopra a quelle della Termale, una schietta di volume sopra a quelle della Termale, e che si rompevano piu sollectita mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta di volume sopra a quelle della Termale, e che si rompevano piu sollectita mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta di volume sopra a quelle della Termale, e che si rompevano piu sollectita mescolata coll' Olio di Tarmale, una schietta di volume sopra a quelle della schietta di volume sopra taro. Questa ancora osservai, che faceva delle gallozzole piu voluminose dell' altra schietta, e piu resistenti nel rompersi, ma accompagnate sempre da un certo rauco mormorio, e da certe esplosioncelle in atto, che le me-medesime si rompevano. Avrei desiderato di potere avanzar piu oltre le mie osservazioni sopra alle diverse maniere di bollire della nostra Termale rimescolata con varie sostanze; Ma siccome questo non mi su allora per-messo, così mi rivolsi a porre in uso quel metodo stato gia solito praticarsi da tutti gli Scrutatori delle Acque Minerali. Laonde infusi nella Termale suddetta, ora dell' Olio & ora del Sale di Tartaro, e tanto dall' uno, quanto dall' altro osservai, che si produsse per tutto il corpo di quelli acqua un annebbiamento lattiginoso, con questo divario, che in quella condita col Sale di Tartaro, il Sale dopo qualqualche tempo precipitò a fondo, lasciando tutto il corpo dell' acqua suddetta trasparente; In quella poi condita coll' Olio restò, dopo di esser seguita una qualche precipitazione, un certo annebbiamento a sior di acqua, a soggia di tanti siocchetti. Anche coll' assusione dello Spirito di Sale Ammoniaco si produsse nella Termale un coagulo lattiginoso, che in capo a qualche spazio di tempo precipitò a sondo, tramandando un alito così acuto, e grave d' Orina, che seriva sensibilmente le Narici, e lasciando tutta quell' acqua tinta d' un color ceruleo Verdemare.

Il Sublimato corrosivo poi, rimescolato con essa, non vi fece la minima mutazione, non restando ne pure sciolto dalla medesima, ma precipitando intatto tutto quanto era in sondo del vaso. Solo cols' Allume vi si produsse un leggierissimo annebbiamento, il quale non su accompagnato da alcun moto sensibile; Siccome accadde quando vi si rimescolarono gli Spiriti acidi dell' Aceto, del Nitro, del Sale, e del Vetriolo, che non vi risvegliarono ne pur essi il minimo ribollimento. Il Giulebbo di Viole poi, e la Polvere della Galla insus nella Termale suddetta, la colorirono, questa d' un color giallognolo, quello di verde; Ma questo disparve subito, che vi si aggiunse una porzione di Spirito di Vetriolo, comparendo in seguito l'acqua tinta di un rosso simile a quello delle Rose secche.

Dopo di averla tentata con questi mezzi, passai a quelli dell' evaporazione. Pigliai pertanto da tre diverse vasche dei Bagni trentanove libbre d'acqua, cioè, tredici da quello detto della Ficoncella, tredici dal Bagno Bosso, e altrettante da quello, che chiamasi il Bagno Grande. Possa ciascuna di queste porzioni d'acqua separatamente a svaporare al suoco, nello spazio di ore quarantotto, ricavai da quella porzione d'acqua della Ficoncella dramme tre e mezzo di un sedimento bianchissimo, insipido, ruvido,

fria-

friabile, e ripieno di specchietti lucidi; Dalla porzione dell' acqua del Bagno Bosso dramme tre, e da quella del Bagno Grande sole dramme due. E qui è da notarsi, come sattasi la stessa prova della Termale in diversi tempi, non si ricavò sempre dalla stessa quantità d'acqua svaporata, la medesima dose di sedimento. Imperocche alcuna volta da libbre trentuna d'acqua, sen ebbero appena tre sole dramme. Onde si può credere con qualche sondamento, che non in tutti i tempi costantemente sia questa Termale carica

della medesima copia di sedimento.

. Volendo io pertanto far qualche prova ancora sopra di questo sedimento, principiai dal mescolarvi degli Spiriti acidi, i quali vi risvegliarono subito dell' ebullizione; Indi stempratane una porzione in acqua piovana, mescolai con detta acqua del Giulebbo di Viole, il quale in breve tempo la tinse tutta d'un verde scuro, calando a poco a poco in fondo del bicchiere, il sedimento, che conservava ancora la sua bianchezza primiera. Non contento di ciò, stemprai nuovamente un altra porzione di questo sedimento in altr'acqua, e aspettando, che calata a fondo la terra, l' acqua sopranatante fosse ben chiarificata, la decantai; Indi infuso in essa così chiarificata lo stesso Giulebbo Violato, vidi, che l'acqua diventò d'un color verde scuro, simile al primo, ma meno carico. Or siccome tutte queste assussoni furono fatte non molto tempo dopo alla mescolanza del sedimento coll' acqua, così provai a tenervelo piu a lungo; Poscia decantata per due volte l'acqua, ed aggiuntavene della nuova, mescolai il Giulebbo Violato con essa, e con quel sedimento, dalla qual mescolanza si produsse parimente la solita tintura di verde, ma piu bello, e piu chiaro. Continuata finalmente sopra allo stesso sedimento nuova affusione d'acqua, e nuova decantazione della medesima, accadde, che nell' acqua decantata, il Giulebbo ap-

M 2

appena mostrava un ombra di color verde; e nel mescuglio d'acqua, e di sedimento insieme, compariva un verde piu chiaro, e piu slavato dei primi, e un poco tiran-

te al giallo

Inoltre furon poste once undici di questo sedimento a suoco di riverbero, entro una storta lotata. Stillò sul principio una stemma insipida, torbida, di color giallastro, al peso di dramme dieci. Subito che comparve il getto parabolico del sumo, su tolta via la stemma del recipiente, quale vi su poi di bel nuovo riposta, lotandone le giunture, e compiuta la distillazione, non si ebbero, che poche dramme di una stemma acidula, si-mile in tutto alla stemma del Vetriolo.

Terminata questa operazione, posi un oncia del solito sedimento in una libbra d'acqua comune, e tenutolo in digestione al suoco leggiero di Sabbia per lo spazio di ore ventiquattro, su l'acqua suddetta decantata, e siltrata, che riuscì limpidissima di colore, e di sapore Salso-amaricante. In quest'acqua così filtrata, mescolatovi il Giulebbo Violato, non si produsse alcun colore, ma aggiuntavi poi una porzione di sedimento, comparve subito nell'Acqua suddetta il solito color verde. Di piu raccolta quella terra insipida, che era rimasta nella carta dopo la filtrazione, la mescolai con porzione d'acqua, in cui avendo insuso del Siroppo Violato, diventò ella subito di color verde.

La foluzione poi del fedimento di sopra accennata, la quale dopo di essere stata decantata, e siltrata, si osser-vò d' un sapore Salso-amaricante, su da me riposta a ssumar lentamente entro un orinale di vetro. Formatasi in superficie della medesima a poco a poco, conforme suole accadere, la solita cuticola, su da me lasciata in riposo, sulla speranza della sutura cristallizzazione del Salse. Tornato il giorno dopo ad osservarla, trovai la cu-

ti-

ticola galleggiante a fior d'acqua, ed insieme con essa dei corpicciuoli lucidi, e cristallini, che si erano attacca-ti piu quà, e piu là ai lati dell' orinale. Decantata allora destramente tutta l'acqua, feci asciugare unitamente colla cuticola, anche quei corpicciuoli lucidi, e cristallini sulla credenza, che sossero veri Cristalli Salini. Ma ricrovai in effetto non essere altrimenti tali, accertandomi anzi essere i medesimi una congerie di minuti specchietti insipidi, che osservati attentamente colla Lente, comparivano trasparenti come il Cristallo di Monte, o la Selenite. Onde ebbi giustissimo motivo di credergli spec-chietti selenitici, non gia esistenti nella prima soluzione del sedimento, ma formatisi bensì dopo la siltrazione del medesimo dalle parti Terreo-Saline nell' atto dell' eva-porazione dell' acqua, e cio sul giusto ristesso dell' impossibilità del loro passaggio a traverso della carta in tempo della filtrazione. Mi provai pertanto a versare in essi dello Spirito di Aceto, e di Vetriolo, ed osservai, che non si svegliava da alcuno di questi due Spiriti acidi nessun bollore. Affusovi poi dell' Olio di Vetriolo, gli vidi tosto non senza qualche stupore agitarsi, e ribollire.

Da tutti questi esperimenti adunque sopra riferiti si scorge chiaramente, che il sedimento, il quale rimane dopo l' evaporazione della Termale, è un composto purte di terra alcalica, che resta nella carta dopo la filtrazione del sedimento, stato gia disciolto nell' acqua; e parte d' una sostanza Terreo-Salina, che filtrasi per la carta assieme coll' acqua, e che non ribolle, come abbiam veduto, nè collo Spirito d' Aceto, nè di Vetriolo, ma sostanto coll' Olio del Vetriolo suddetto. La prima di queste sue parti, oltre all' essere di natura alcalica, perche ribolle con ogni sorta d' acido, si dimostra ancora esser quella, che produce il color verde nel Giulebbo

di Viole. Imperciocche, secondo quel che abbiamo gia dimostrato di sopra, non può attribuirsi questo colore alla parte salina, atteso che la soluzione salsa del sedimento siltrata per carta, non produste nel Siroppo suddetto colore alcuno, ma bensì alla terra, che spogliata affatto di Sale, era rimasta sopra alla carta, poiche lo colorì di un verde, sempre tanto piu carico, e cupo, quanto su maggiore la copia, che se ne venne a rimescolar con esso siccome per lo contrario comparve sempre il color verde piu chiaro, e piu slavato a proporzione, che su minore la copia della terra, che s' incontrò col Siroppo.

Quantunque siavi in questo sedimento una terra alcalica, secondo quello, che abbiamo gia mostrato di sopra, ella nondimeno pestata assieme col Sale Ammoniaco non produce alcuna esalazione, che sappia d' orina, conforme accade allora, che pestasi detto Sale Ammoniaco, o col Sale di Tartaro, o con altro Sale Alcali sisso. La cagione d'un tal divario, a mio credere, si è questa cioè, che essendo il Sale Ammoniaco un composto dello Spirito acido di Sale Marino, e di un alcali volatile, l'alcali fisso, che ha coll'acido una attrazione, ed una affinità maggiore di quello, che vel'abbia l'alcali volatile, tira però egli a se l'acido, che ritrova in tutto quel composto, onde rimasto per tal motivo in liber-tà l'alcali volatile, sen esala facilmente, e sugge via, dissondendo per l'aria quell'esalazione setida d'Orina. Ma nel nostro caso poi, in cui l'alcali volatile ha con quell' acido istesso un' attrazione, ed una affinità molto superiore a quella, che vi ha la terra alcalica, non è da maravigliarsi, se dalla mescolanza del Sale Ammoniaco col sedimento della nostra Termale, composto nella maggior parte della terra suddetta; non succede emanazione alcuna urinosa pari a quella, qui sopra riferita. In 🤻

In ordine poi all' altra parte del sedimento, che suol passare assieme coll' acqua a traverso della carta, questa non è altro, che un misto di terra e di Sale acido, per quanto io credo, i quali uniti assieme nello svaporamento dell' aqueo veicolo, formano, conforme gia dicemmo, quelli specchietti lucidi, i quali, se bene insipidi al gusto, e difficilmente solubili dall' acqua, pur non dimeno son chiamati in oggi col nome di Sale Selenitico. L' acido, che si ritrova in questa parte di sedimento, egli è di natura vitriolica, o sulfurea, che dir la vogliamo. Ciò deducesi dal veder, che egli non ribollì, ne collo spirito d' Aceto, ne con quello di Nitro, che io vi affusi, ma ribollì ben è vero gagliardamente coll' Olio di Vetriolo, esalando nell' atto della ebullizione suddetta, un grave ed in-tenso odore di Zolso. Ed in satti essendo vitriolico l'acido componente questa parre di sedimento, non poteva egli come piu sorte, e piu sisso, cedere in conto alcuno all' azione di quello meno sisso, e piu debole degli Spiriti d' Aceto, e di Nitro, che vi erano stati di gia infusi, ma su bensì forza, che cedesse all' azione di quello dell' Olio di Vetriolo come piu fisso, e piu forte di quello, che contenevasi nel sedimento.

Or da questo sedimento, o Sale Selenitico, che chiamar si voglia, osservai, che ne per mezzo della insusione, ne della decozione, sene può ricavare alcun Sale. Ma se si faccia questo calcinare, e riverberare a suoco gagliardo per qualche tempo, nel modo che suol praticarsi dai Chimici, allora quando vogliono estrar una maggior quantità di Sale sisso dalle ceneri dei vegetabili, allora soltanto sene ricava un Sale terzo, e Salso, e questo in dose scassissima per quanto ho potuto osservare. Impercioche da tre dramme di sedimento ricavato da libbre trentuna della nostra Termale, appena riuscì di potere estrar

quattro grani di questo Sale. Sicche fatto il confronto fra la copia del Sale, che si contiene nella nostra Termale, ed in quella delle Terme Pisane, nelle quali, secondo le ofservazioni ultimamente fatte dal Sig. Antonio Cocchi pag. 81., si ritrovano sei grani, e mezzo di Sale per ciascuna libbra d'acqua, vidi, che la proporzione fra Sale, e Sale in queste due Termali, stava come l'1. al 50. in circa.

Esaminati i sedimenti, che si ricavano dalla nostra Termale, mi rivolsi in fine a far qualche osservazione sopra alle grume depositate da esso in quei luoghi per dove el-la scorre incessantemente. Posi pertanto in un bicchiere una porzione di questa gruma polverizzata, la quale; cioè una parte bianca, e l'altra tinta d' un color giallo cupo. A questa aggiunsi dello Spirito d' Aceto, e vidi, che vi si risvegliò immantinente del bollore, il quale continuò per qualche tempo. Terminato che fu, osservai, che nella quiete si era depositata in fondo del vaso della terra gialla, e che nei labbri del medesimo si era già formato il confueto Sale bianco amaricante dall' accoppiamento, ed unione dello Spirito acido colla terra alcalica. Io pertanto, che era di gia persuaso esser quella terra gialla una vera ocra, perocche avendola posta al fuoco l' avea veduta diventar d' un color rollo scuro, considerai, che lo Spirito averebbe dovuto roder quel ferro, che v' esisteva e che in oltre la polvere di Galla rimescolata collo Spirito suddetto d' Aceto, dovea tinger tutto quel misto d' un color nero, o violato. Infusa pertanto la detta Galla, polverizzata in una porzione di questo spirito, saturato colla soluzione della gruma, divenne subito egli infatti di un bellissimo colore atro-purpureo, il quale mi accertò, che in queste grume vi era una terra alcalica, ed un' ocra vera, e legittima, composta di pura terra, e di ferro.

ferro. Ma per assicurarmi ancora di piu, che un tal collore derivasse unicamente dalle grume, e non gia da altra straniera cagione, presi due bicchieri, in uno dei quali posi dentro dello Spirito d' Aceto, nell' altro dello Spirito di Vetriolo allungati ambidue con porzione d'acqua comune, ed infusavi poscia della Galla polverizzata, non m'accorsi, che si producesse ne nell' uno, no nell' altro dei bicchieri suddetti tintura alcuna di color nero, o violetto. Aggiuntavi poi della polvere gialla delle suddette grume, vidi subito tutto quel sluido contenuto dentro ai bicchieri tingersi di colore nero, onde non mi restro allora piu luogo alcuno di dubitare della vera esistenza dell' ocra nelle grume depositate dalla nostra Termale.

In tale occasione ebbi luogo ancora d' osservare non senza mio piacere un altro fenomeno, il quale, se bene non guidi direttamente ad una maggior cognizione della nostra Termale, può servir non dimeno a toglier via molti equivoci nelle Analisi, che s'imprendono talora delle Acque Minerali. Osservai adunque, che l' Aceto in tal guisa saturato della terra alcalica, e del ferro esistente in quell' ocra produceva due diversi esfetti, tingeva cioè di verde il Giulebbo Violato, e colorivasi egli stesso di nero, quando vi si aggiuntava della polvere di Galla. Se poi accadeva mai, che predominasse nell' aceto suddet-to sopra a tutte queste sostanze, di cui era impregnato, qualche poco l'acido, compariva anche il terzo effetto di ribollir cogli alcalici, come coll'Olio di Tartaro, cogli occhi di Granchio &c. Un tal fenomeno mi fece comprendere, che per quanto la terra alcalica, l' Aceto, ed il Ferro così rimescolati insieme formassero allora un sol composto, pur non dimeno ciascun de suoi componenti conservava intatta la sua forza natia verso di quelle soltanze, con le quali avea una maggiore affinità, e relazione

fenza che l' una servisse all' altra d' impedimento. Così parimente lo Spirito d' Aceto, che suole, come a tutti e noto, tinger di un color rosso il Siroppo Violato, imbevuto, che egli sia di terra alcalica, lo tinge di color verde, solo perche ha la terra una maggiore attività sopra al Siroppo suddetto per tingerlo di verde, di quello che vel abbia l' acido dell' Aceto per colorirlo di rosso. Or se si fosse posto mente dai primi Scrutatori delle Acque Minerali a queste varie relazioni di forze, che confervano verso certe sostanze particolari, le parti d' un misto benche rimescolate, e confuse fra di loro, noi non saremmo stati cred' io tanto nell' inganno intorno alla vera natura di quel Sale, che contengono in se le fredde Minerali acidule, creduto, non ha molto tempo da tut-

ti alcalico sol tanto per uno di questi equivoci.

Dal complesso adunque di tutti gli esprimenti fatti sopra alla nostra Termale, si ricava, che la parce piu attiva, ed operante in ella sia lo Spirito Minerale volatile, che in se contiene abbondantemente, Spirito molristoratore, e permeabile in tutte le piu riposte viscere d'un corpo, non si potendo in nessun conto ripor-re alcuna delle facoltà Mediche, che ella possiede nelle parti fisse, attesa la scarsissima copia, che di queste in essa ritrovansi. Converrà pertanto conchiudere, che fra tutte le nostre Termali salubri, questa sia la piu mite, ed innocente, perche di tutte meno carica di Miniera, ma non pertanto meno di tutte efficace, e salubre. Anzi se si consideri l'abbondanza delle sue acque, onde s possono elle distribuire in un istesso tempo a piu, e diversi us, fra quali si è quello dei Lavativi, e delle Docce, le quali si possono con tutta facilità applicare, e rivolgere a qualsivoglia parte del corpo inferma, o male afferra, e delle quali si può agevolmente moderare

eziamdio, e proporzionare a misura dei bisogni l'ur-to, e la grandezza del raggio d'acqua, che da esse tramandasi, si potrà da chi che sia comprendere, quanto anche per quelto capo accrescasi alla nostra Termale la estensione dell' uso suo, e della sua essicacia nella maggior parte delle croniche infermità, ed in quelle eziamdio, che non possono ottener dalla Farmacia se non che pochissimo vantaggio. Quindi è che nei tagli estesi, e profondi, che talora far si convengono in qualche parte del corpo, ove si tema, o insopportabile pel gran dolore la operazione, o poco felice per lo sgorgo abbondante del sangue, che allaghi con troppa sollecitudine la ferita, rivolgendosi subito dopo il taglio la parte alla Doccia, si sente poco dopo mitigare in essa dall' urto non interrotto della nostra Termale il dolore, e dissiparsi l' inondamento intempestivo ancora del sangue. Finalmente se si risterra alla situazione eminente, e scoperta del Luogo, ove raccogliesi a comun vantaggio la salubre nostra Termale, circondato da pertutto da un aria pura, fottile, ed ellastica, e perciò non affannosa di soverchio, ed incommoda per l'eccedente suo calore, o pregiudiciale per altre sue nocive qualità a tutti coloro che, vi si portano, e vi dimorano anche nel cuor dell' Estate, si avrà ben giusto motivo di contare fra le altre sue doti particolari anche questo benesico dono della Natura non così ovvio, ne così comune a tutti i fonti delle Termali.



## METHODUS UTENDI AQUIS

S. CASSIANI IN SENENSI DITIONE

Quam olim Dominus

## JOSEPHUS NENCI

Publicus Medicinae Professor

DATA AD NOBILISSIMUM, AMPLISSIMUMQUE VIRUM EPISTOLA PERSCRIPSIT



Ogitanti Tibi, Vir Nobilissime, atque Amplissime, S. Cassiani Thermas adire, & salubres eas aquas, ut Tux valetudini consulas, adhibere, etsi Te nulla præcepta, nulla adjumenta sugiunt, quibus sanitas conservatur, tamen munere meo non sum arbitratus alienum ea nunc Tibi, qux de recta bibenda-

rum aquarum ratione dicenda censui, præscribere.

Cum de oculorum inflammatione, deque molesta quadam cutis exulceratione conqueraris; Cumque Tibi inæqualiter venæ pulsent, & hypochondria paulum dura, atque intenta sint, ciborumque concoctio minus bene peragatur; Cum hæc inquam Te male habeant, eaque ab humorum concretione, & acrimonia quadam, ac forte in minimis vasis obstructione proficiscantur, facile intelligis, quantum ab hisce aquis auxilij expectare possis. Hujusmodi aquas tenui, ac volatili spiritu maxime præ-

Hujusmodi aquas tenui, ac volatili spiritu maxime præditas esse multis argumentis docemur: Tali igitur medicina sanguis, viscera, & quælibet pars corporis eluitur, humorum concretio dissolvitur, aliaque vitia quamplu-

rima maximè emendantur.

Hinc

Hinc vis, atque efficacitas Thermarum populorum o-mnium consensu cognita, & comprobata celebratur; lon-goque usu compertum est, has præsertim, ad quas con-tendis, plurimis, ac vetustis morbis opitulari. Mitto libenter ca remedia, quæ pro solemni corporis præparatione, quemadmodum sunt sanguinis detractiones, cathartica, atque alia ad alterandos, ut dicunt, humocathartica, atque alia ad alterandos, ut dicunt, humores, adhiberi solent a Medicis; hæc autem ut sanguine, & prava humorum colluvie scatentibus hominibus necessaria sunt, sic minime iis conveniunt, qui corpore tenui, & imbecillo utuntur, quique diuturnis morbis non ita pridem laborarunt. Hi enim remediorum usu magis debilitati, graves ab hujuscemodi aquis patiuntur offensiones: Quare hac corporis præparatione Tibi nullo modo opus est, qui & ex longo morbo nuper evasisti, & rectam vivendi rationem jam diú amplexus es.

Ergo ubi cadente jam vere ad aquas veneris, si ab iis, quem Tibi jure Medicina promittit, percipere fructum velis, ea Tibi in iis adhibendis tenenda ratio est, quæ & Tui corporis naturæ, & morbis, quibus afficeris, maximè accomodata sit: Neque enim eorum consuctudinem probare possum, qui suis Ægris, quavis habitudine præditis, quovis morbi genere laborantibus indiscriminatim eàdem bibendæ aquæ ratione medentur, eandemque ipsius aquæ quantitatem singulis præcipiunt.

Tu enim, qui stomacho laboras, quique tumidis hypochondriis assiligeris, primum maximè curabis, ut quam aquæ quantitatem singulis diebus assume curabis, ut quam aquæ quantitatem singulis diebus assumes, non affatim,

aquæ quantitatem singulis diebus assumes, non affatim, neque plenis cyathis, sed lente, partitisque vicibus sumas; Sic enim epota aqua nullam stomacho, nullam intestinis vim insert, sanguinique permista penitiores corporis recessus persustrat, & quidquid in iis aut concretum, aut inhærens offendit, commodius arripit, & per apta glandularum foramina expellit.

Quæ

Que autem aque quantites Tibi potissimum opportu-Que autem aque quantites l'ibi potissimum opportuna sit, proxime dicam. Nonnulli sunt, qui aut longioris medicine pertessi, aut quavis alia ratione permoti,
ut rem quamcitissime expediant, aquarum copia se penè
obruunt. Quanto autem cum periculo id faciant, precipue si obstructo, tumidoque jecore sint, Tute probe
intelligis, quem minime sugit, sepe nausea, interdum
vomitu, non semel etiam vertigine eos affici, quorum ventriculus ab incumbente jecore nimis comprimitur.

Ab hac prava methodo recedendum Tibi omnino est,

& semper memoria tenendum, quod ratio ipsa, & Sa-pientum auctoritas suadet, eam scilicet aquæ quantitatem unicuique else potandam, quam sacile stomachus serre possit, quamque & palmo, & cor bene sustineant, &

moderentur.

Si ergo tuarum virium rationem habere velis, recte fortasse potationem incipies a tribus circiter libris, & sequentibus diebus uno, vel duobus parvis cyathis potum adaugebis, donec quinque plus minus libras compleveris. Hujusmodi maximam quantitatem per sex aut ultra dies, si res bene cedat, adhibere poteris, ac deinde ab hac summa portione sensim ad insimam rursus descendes sic, ut totum potationis curriculum viginti diebus absolvas.

Cum vero ab usu calentium aquarum naturalis ventriculis motus interdum per initia potationis inversatur.

culi vero ab ulu calentium aquarum naturalis ventriculi motus interdum per initia potationis inverratur, &
aquæ ipsæ jam epotæ maxima ex parte evomantur, id
Te a costanti earum usu deterrere minime debet; Ut
plurimum utilis ille vomitus est, & per eum quidquid
biliosæ, aut pituitosæ in stomacho materiæ est, utiliter
educitur, & paulatim spontè cessat, quæ prius suerat & nausea, & vomitus.

Eadem quoque dicenda sunt, si tarde, ac difficile a-qua ipsa per alvum, aut vesicam initio perlabatur, &

prætersluat, quemadmodum in calido, & pituitoso corpore, quandoque contingit; Nam pertinacia bibentis objecta impedimenta superat, & saluberrimos essectus ab aquis, natura propemodum reluctante, reportat, dummodo blandæ, diùque protractæ potationes sint, a quibus sensim agentibus vidimus sæpe, & recreari stomachum, & lienis, jecorisque tumores discuti, & totum, ut Aretei verbis utar, hominem penè renovari.

Hinc Tibi nunquam auctor ero, ut aquis, quo faci-lius alvi, & urinæ vias adeant, diuretica, multoque minus cathartica remedia adjungas, ut in more positum apud complures est, quorum nonnulli sal marinum quotidiè aquis adjungentes, a frequentibus alvi dejectionibus, quas sal illud concitaverat, insirmato corpore, non modo nihil emolumenti ab epotis aquis acceperunt, sed sto-machi molestiis, aliisque incommodis per mensem & am-plius vexati sunt, cum omnibus morbis, ut Celsus ait, obnoxia maxime infirmitas sit.

Præterea cum præcipua aquarum vis, & potestas ea fit, ut canales, & viscera omnia perlustrando, sangui-nem, cæterosque humores irrigent, & eluant, quid quæ-so ab aquis emolumenti expectandum est, si ipsæ ca-tharticis immistæ, ablutis tantummodo intestinis, serè omnes ad alvum ruant?

Hæ igitur alvi purgationes, quæ quantum plenis hominibus, iisque, quorum viscera lenta bile, crassaque pituita obducta sunt, interdum prodesse, tantum tenuibus, & calidis nocere possunt, Tibi quammaximè sugiendæ sunt: Meminisse Te enim oportet, eam esse Tui corporis naturam, ut minima quæque sentias, & a levi etiam purgatione offendaris. Nihil igitur aquis ad solvendam alvum adiicito, maximè quod eæ sæpe ipsæ ventris dejectiones essectiones, & si quando nihil per se venter excernit, elyste-

steribus huic inertiæ mederi poteris, qui sola, & tepi-

steribus huic inertiæ mederi poteris, qui sola, & tepidissima Thermarum aqua parantur, quique per siphones assabre in sontibus ipsis extructos injiciuntur.

Neque Te sollicitum este oportet, si, postquam aquas mane potaveris, non tam promptè eas excretas vides; Ego enim in ea semper cum cordatioribus Medicis opinione sui, longe quidem salubriores aquas sore, si aliquamulum in corpore restitent, quam si statim ac assumptæ sunt, excernantur. Ubi vero aut ex toto, aut magna ex parte aquæ dessucrint, ad resiciendas vires, si opus sit, poteris aut diluto jure vitulino, aut recenti lacte uti, quod cum hujusmodi aquis bellissime commiscetur.

Quia vero non eo loci Te consers, ut tantummodo ad potum, sed ut ad balneum etiam aquas adhibeas, pauca etiam de balneo ad Te scribam. Cum plura apud

pauca etiam de balneo ad Te scribam. Cum plura apud S. Cassianum balneorum genera sint, quorum nonnulla non modo calida, sed penè serventia sunt, ab his Tibi abstinendum omnino est, illudque unice seligendum, quod Ficuncellæ dicitur, quod quidem temperato calore præditum Tuæ magis naturæ, tuisque incommodis accomodatum est. Cætera cum & nimios sudores moveant, & sanguinem magis concretum, & acrem faciant, tum cæteris penè omnibus, tum Tibi præcipuè inimica sunt; Illudque velim Tibi persuadeas, præcipua sanitatis detri-Illudque velim Tibi persuadeas, præcipua sanitatis detrimenta, quæ balneorum usum consequuntur, ab ea concretionis, & acrimoniæ labe, quam per calorem balnea
sanguini inurunt, proficisci. Hinc illæ lacrimæ, illæ animi desectiones, illa cordis palpitatio, sitis, sebres, aliaque valetudinis incommoda, quibus sæpe homines a
balneis nimis calidis implicantur.

Sed quamdiù in balneo immorandum? a ratione quidem alienum est, quod aliqui essutiunt, tuto quemque
lavari posse usque dum sudor in frontem erumpat. Tu

autem

autem, qui ingenio præstas, recte intelligis, opportunum mansionis tempus ex facili corporis tolerantia esse

dignoscendum.

Neque præterire oportet, eam ipsam rationem, quam in potu nuper diximus, in balneo quoque diligenter esfe servandam; Facta quippe primum immersione per horæ dimidium, sensim deinde ad majus temporis spatium progrediendum, quoad scilicet facile sustineas. A balneo abstersa cute, protinus in lecto decumbendum in proximis ædibus extructo, quiescendumque donec ad naturalem sta-

tum corpus redigatur.

tum corpus redigatur.

Finita potatione, & balneo, ut remediis omnibus, quæ ibi suppetunt, affecto jecori medeàris, ultimo ad stillicidium devenies. Magna quidem hujus remedij virtus est, sed major profecto ea erit, si, humoribus jam per potum, & balneum solutis, adhibeatur. Tunc enim quidquid affectæ parti inhæserit, ab impetu ruentis aquæ facile dimovetur, & ab humoribus pone venientibus abreptum, sluentique sanguini immistum, per opportuna glandularum soramina tandem e corpore dispellitur.

Hoc quoque remedij genere utpote actuoso gradatim, & prudenter utendum est, ne Tibi molestiam, & detrimentum pariat. Aliquando magna vis irruentis aquæ effectas partes nimis premit, & contundit: aliquando ingens aquæ calor nimium viscera, & sanguinem exagitat, maximè in servente æstate, & delicata corporis constitutione, ut iterata observatione compertum est.

Scire autem operæ pretium est, in adhibendis potissimum aquis ut nihil perniciosius nimia sessimatione, sic nihil commodius, & salubrius esse, quam modo a potu, modo a balneo, & sillicidio, quandoque etiam ab his omnibus vacare; Quippe ut optime intelligis, Amplissime Vir, non solum optimo remediorum delectu, sed

certo

certo etiam in iis adhibendis ordine, & æquabili ægro-

tantium animo diuturni morbi curatio perficitur.

Interea equo vectus domum redire poteris, interque Amicorum colloquia tantum temporis traducere, donec cibi desiderium prandendi jam tempus esse Te commonefaciat. Cibo autem paulo largiore uti commodum erit, si nihil prohibet; Etenim longæ hujusmodi potationes ventriculum eluendo, & roborando esuriem facere solent. Post prandium somno moderate indulgendum; Tantum enim abest, quod veteres de Thermis Scriptores tradiderunt, ut somnus pomeridianus noxius, ac pestilens sit, ut potius, ratione, & experientia duce, concoctionem adjuvet, mentem excitet, & corporis vires confirmet.

Cœna autem vel nulla sit, vel exiguum aliquid; idque fine carne, & fine vino assumatur, fic enim matutinis

horis alacris, & vegetus ad Thermas properabis.

Cibus is esse debet, qui facile concoquatur, quique tuorum humorum vitiis adversetur. Potissimum carnes ex junioribus animalibus, & recentia olera seligenda sunt. Sed hæc ad Te nimis fortasse accurate conscribimus, qui cum optimis philosophiæ præceptis abundes, alienis non admodum eges consiliis, multoque minus his, quæ non Tui docendi studium, sed mei potius in Te amoris, & observantiæ impetus exprompsit. Vale, meque, ut sacis, singulari animi tui benevolentia complectere.



### OSSERVAZIONI

INTORNO ALLA DECLINAZIONE DELLA CALAMITA

Fatte In Roma dal M. R. P.

# GIUSEPPE ASCLEPI

## DELLA COMPAGNIA DI GESÚ

LETTORE DI MATEMATICA NEL COLLEGIO ROMANO



F

Vendo alcuni anni fa scoperto un nuovo Periodo diurno in un essetto naturale, di cui parlerò in altro tempo, per darne piu minuto conto, congetturai, che un simil Periodo esser potesse ancora nella declinazione della Calamita. Non potei allora farne l'osservazione per mancanza di Bus-

fola abastanza esatta per una materia, che prevedevo assai delicata: Ne trovai una, che mi parve a proposito nel Novembre del 1761, nel qual Mese, e ne
seguenti di Dicembre, e di Gennajo seci alcune osservazioni, che mi confermarono nella mia congettura:
Ma qualche disetto della Bussola non mi permetteva
il determinare con sufficiente esattezza i tempi della massima, e minima declinazione, e la disserenza tra esse.
Pensai pertanto a provvedermi di altra migliore per
farne l'osservazione intorno al seguente Sossizio, quando nell' Aprile del 1762. m' imbattei a leggere nella
Connoissance des Mouvemens Celestes pubblicata in Parigi
pel 1763. le seguenti parole alla pag. 208.; On a
observe une variation journaliere dans l'aiguille aimantèe,
qui se porte le matin de 6. a 8. minutes vers le Couchant,

et le soir vers l' Orient, e citansi le Transazioni Filosofiche del 1759. insieme col Giornale straniero del 1761. Questo è il tutto, che ho finora potuto sapere in tal materia, non eliendomi stato possibile il rinvenire ne l' uno, ne l' altro Libro; il che però mi ha recato il vantaggio di esser libero da ogni prevenzione.

Benche vedessi essersi gia osservato questo Periodo, non giudicai di desistere dal mio pensiere, si perche le cose piccole non si osservano mai a bastanza, potendo facilmente colla lor piccolezza imporre all' Osfervatore, si perche in luoghi diversi per cagioni particolari, che in essi regnano, posson le cose accadere diversamente. Cominciai pertanto le osservazioni a di 10. di Maggio del 1762., le quali principalmente son ora per da-re dopo aver esposta la maniera, che in esse ho tenuta.

II. L'ago calamitato è leggierissimo, e di un piede di Parigi di lunghezza: Questo è posto in una Bussola di legno ben lavorata, la quale collocai ad un angolo della mia camera, che è sopra volta, in un tavolino appoggiato ad un ben grosso muro. Oltre l'aver tenuta comunemente serrata la finestra, e la porta, e sempre almeno una di esse; il sito della Bussola era per se stesso bastantemente riparato da qualunque mo-to d'aria. Tolsi via ogni Calamita, e tutti i serri, che mi su possibile; quanto agli altri ho usata sempre tutta l'attenzione, che non fusser mossi da' loro posti.

Per assicurarmi di collocare l' occhio sempre all' istesso punto, e in tal maniera suggire gli effetti della parallassi, che ne sieguono dal rimirare l' ago da luoghi diversi, ho posto un segno immobile sopra il vetro, ed ho sempre collocato l' occhio in maniera, che la linea visuale condotta per detto segno andasse a battere ad un punto sisso nel piano della Bussola: il mio occhio poi è di una tale struttura, che
non puo distintamente vedere cose minute, se non
ad una determinata distanza, per le quali cose in ogni
osservazione sono stato costretto a porre l' occhio all'
istesso punto.

Per esplorare la mobilità dell'ago, l'ho mosso dal suo posto tre gradi per mezzo di un ferro, e ciò piu volte in diversi tempi, ne l'ho veduto fermare, che dopo quindici, o venti, ed anche piu oscillazioni: Quindi movendo l'ago seguitamente piu volte l'ho vedu-

to sempre tornare all' istesso luogo.

Ho regolata la divisione in maniera, che quantunque possa essere stato frequente l' errore di mezzo minuto nel determinare il posto dell'ago di un minuto intero però non può essere stato che assai raro, come con molte prove mi sono accertato, e da queste istesse osservazioni agevolmente potrà comprendersi: il che intendo del sito dell'ago rispetto ad un punto sisso della Bussola, nulla importando nella presente ricerca l'angolo, che sa l'ago colla muraglia, ma solamente le differenze di esso in diverse ore del giorno, le quali possono aversi con sufficiente esattezza, ancorche in questo sulle scorso errore notabile.

III. Preparate in tal maniera le cose ho determinata ad ogni ora la posizione dell' ago, movendolo alquanto con qualche serro prima di ogni osservazione, ed ho ciò satto da 10. Maggio sino a 3. Agosto dalle 9 alle 5. secondo l'Oriolo Italiano: Indi tolta dal suo posto la Bussola, e montatala di nuovo le ho ricominciate a di 3. Novembre seguitandole sino a 24. Febbrajo dalle 11. alle 8. in que' soli giorni però, che mi hanno lasciati liberi altre mie occupazioni. In tali tempi sono

stato sempre bene attento, che volino, ne la Bussola patissero alcun urto, a: paracipio al fine di ciascuna serie di osserva m'ntenelser le cose, quanto fusse possibile, nel mus . . Solamente tra i 22. Maggio, ed il primo Come a tra il primo, ed i quattro di detto Messe mutato il segno sopra il vetro per dargli un sito piu occodo all' occhio, e nel principio di Febbrajo su la Bussola casualmente mossa dal suo posto. Ad ogni offervazione poi mi sono assicurato, che questa non si fusse scostata dal muro, con premerla contro di esso, ne mai mi sono accorto, che se ne fusse punto allontanata: Similmente ho trovato sempre l'altro suo lato corrispondente all'orlo del tavolino.

IV. Nella seconda serie di osservazioni il Termometro è stato quasi costantemente all' istesso grado dal principio al fine di ciascun giorno; qualche maggior varietà ho veduta nella prima serie: ma, prendendo il mezzo fra tutte, trovo, che la massima disferenza tra il grado medio di ore diverse non giunge a tre quarti di un grado di Reaumur. Quanto all' umidità ostreche la mia camera è per se tessa asciuttissima, ho usara tutta la diligenza per custodirla dall' umido esterno, ne mi son mai avveduto di alcun segno sensibile di umidità, onde mi persuado, che ne il caldo, ne l' umido abbian potuto sensibilmente alterare la Bussola, benche di legno, molto meno sarciò con quel Periodo, che or ora vedremo.

V. In tutte queste osservazioni l'ago è stato lontano dalla Tramontana della Butsola verso Ponente piu di due gradi, i quali lasciati da parte darò nelle seguenti tavole solamente i minuti sopra i detti due gradi. Quando pertanto la declinazione cresce, l'ago va verso Po-

nente, quando scema, verso Levante.

Pri-



### PRIMA SERIE

```
C)re
```

```
11 12 13 14 15 16 17 18
M. M. M. M. M. M. M. M.
             IO
                 II
            M.
1762
       M.
Mag. 10 48, 0 48, 5 48, 0 47, 5 46, 5 48, 5 50, 5 52, 0 52, 5 53, 0
    12 46,5 46,0 45,0 44,5 45,0 46,0 47,5 49,0 50,0 51,0
    15 46,5 47, • 46,0 45,5 45,0 46,0 47,5 48,5 49,5 51,0
    22 51,0 51,5 50,0 46,5 46,5 48,5 50,5 52,0 52,5 53,5
Giu. 1 55,0 54,0 53,5 54,5 55,0 56,5 58,0 58,5 59,0 59,0
     4 58,5 58,0 57,0 57,0 57,5 58,5 59,5 60,0 61,5 62,5
     7 58,0 57,5 57,0 56,5 57,0 58,0 59,5 60,5 62,5 63,0
     9 59,0 60,0 59,0 58,0 58,0 58,5 60,0 61,5 63,0 63,5
    12 58,5 58,5 57,5 58,5 59,0 59,5 61,0 62,5 63,5 63,5
    14 57,0 57,0 56,5 56,5 56,5 59,0 61,5 63,0 63,5 64,0
    16 59,0 59,0 58,5 58,0 58,5 59,0 60,0 60,5 61,0 62,0
    19 59,0 58,0 57,0 58,0 58,5 59,5 61,0 62,5 63,0 63,5
    23 57,0 57,0 56,5 56,5 57,5 61,5 64,0 64,0 64,5 64,0
    26 59,5 59,5 59,5 58,5 58,5 59,5 61,5 63,0 63,5 64,0
    28 59,0 59,5 58,5 58,5 59,0 60,0 62,5 63,5 64,5 65,0
Lug. 2 61, 5 62, 0 61, 5 60, 5 60, 0 61, 0 61, 5 62, 5 63, 0 64, 0
     7 59,0 59,0 59,0 58,5 58,0 59,0 60,5 62,5 63,5 64,5
     9 56,5 56,5 56,0 56,5 58,5 59,0 62,0 63,5 64,0 65,0
    12 61,0 60,5 62,5 61,5 61,0 61,5 62,0 62,0 64,5 64.5
    14 57, 5 58, 0 57, 5 57, 5 58, 5 59, 0 59, 5 60, 0 60 5 60, 5
    16 58,5 58,5 57,5 56,5 58 0 58,5 59,5 61,0 62,0 62,5
    19 58,5 58,5 57,5 57,0 57,5 58,5 60,5 62,5 63,5 64,0
    23 57,5 57,5 57,5 57,0 58,5 59,5 61,5 63,0 62,5 65,0
    30 62, 5 61, 5 59, 0 59, 5 60, 0 60, 0 61, 0 63, 0 63, 5 64, 0
```

Ago. 3 59, 5 59, 5 58, 5 59, 0 59, 5 60, 0 61, 5 62, 0 62, 5 63, 5

### DI OSSERVAZIONI Ore

```
20 21 22 23 24 1 2 3
M. M. M. M. M. M. M. M.
19
                                               M.
                                                     M.
M. .
52,5 52,5 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 48,5 47,5 48,0 48,0
51,0 51,0 49,5 49,0 48,5 48,5 47,5 48,0 48,0 48,5 47,5
50,0 49,0 48,0 48,0 48,0 48,0 47,0 46,5 46,0 45,0 45,0
52,0 51,5 51,0 50,5 50,0 50,0 49,0 49,5 50,0 49,5 49,5
59,0 58,0 57,5 57,0 56,5 56,5 56,5 55,5 55,5 55,0 55,5
62,5 61,5 60,5 60,0 60,0 59,5 59,5 59,0 59,0 59,0 59,0
62,0 62,5 62,0 61,0 60,0 60,0 59,5 59,5 59,5 59,0 59,0
62,0 62,5 62,5 61,5 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 59,5 59,0
62,0 62,5 62,0 61,0 59,0 58,5 58,5 58,5 58,5 59,0 60,0
62, 5 62, 5 61, 5 60, 5 60, 0 60, 0 61, 5 60, 5 60, 0 59, 5 57, 5
61,5 61,0 60,5 59,5 60,0 59,5 59,5 59,5 60,0 59,5 60,0
62, 5 61, 5 60, 5 60, 5 60, 0 60, 0 60, 0 60, 5 59, 5 58, 5 58, 5
64.0 63,5 63,0 62,0 61,5 61,5 60,0 59,0 59,5 59,5 57,5
64,0 63,5 62,5 62,5 61,5 61,0 61,5 60,5 60,0 60,0 59,0
64, 5 63, 5 63, 0 63, 0 61, 5 61, 0 62, 0 61, 0 60, 5 60, 5 60, 5
62,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,0 61,0 61,0 61,0 60,5
64, 0 62, 0 62, 5 61, 5 60, 0 60, 0 60, 0 60, 0 59, 0 58, 5 54, 0
64' 0 62, 0 62, 5 61, 5 62, 5 60, 5 62, 5 62, 0 61, 0 62, 0 63, 0
64'0 62,5 61,5 61,0 61,0 60,0 59,0 59,0 59,0 59,5 59,5
61,0 60,5 60,0 59,5 59,5 59,5 58,5 59,5 59,5 59,0 59,0
62,0 61,5 61 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,5 61,0 60,5
62,0 61,5 60,5 60,0 59,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
64, 5 62, 0 61, 5 60, 5 60, 0 60, 0 60, 0 59, 5 59, 0 59, 5 61, 5
64,0 62,5 62,0 61,5 60,5 61,0 60,5 60,0 58,5 59,5 60,0
62, 5 62, 5 61, 5 61, 0 60, 0 60, 0 61, 0 61, 0 61, 5 62, 0 61, 5
```

### SECONDA SERIE

Ore

```
13
                      14
                                 16 17 18
           ₹ 2
                           15
                                                 19
                                                       20
                       M. M.
                                 M.
1762
       M.
            M.
                  M.
                                       M.
                                            M.
                                                 M.
                                                       M.
Nov. 2 66,5 67,5 66,0 66,5 66,5 66,5 69,0 70,5 72,0 72,5
     6 67, 5 68, 0 68, 0 69, 0 68, 5 68, 5 70 5 71, 0 72.0 71, 5
   9 69,0 69,0 68,5 69,0 69,0 67,5 69,0 71,0 73,0 73,5
    13 70,0 70,0 70,0 71,0 70,0 70,5 72,0 73,0 74,0 75.0
    17 70,5 70,0 69,0 69,5 70,0 68,5 70,5 73,0 74,0 74,5
    23 66, 5 68, 5 70, 5 73, 5 71, 5 71, 5 71, 0 72, 5 73, 0 74, 0
    25 69,5 69,5 69,0 70,0 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0 73,0
    30 68, 5 69, 0 68, 5 70, 5 70, 5 69, 5 70, 5 71, 5 72, 5
Dic. 4 67,5 68,5 68,5 68,5 69,0 69,0 69,5 71,0 71,5 71,5
     6 66,0 67,0 68,0 68,5 68,5 68,5 69,0 71.0 72,0 73,0
    11 68,0 68,0 68,0 68,5 68,5 68,5 68,5 71,0 71,5 72,0
    16 66,5 67,5 68,0 67,5 68,0 68,5 68,5 69,0 71,5 71,5
    18 67,0 67,0 67,0 68,0 71,5 70,0 70,0 70,5 71,0 70,0
    29 66, 5 66, 5 66, 5 66, 0 66, 5 67, 0 68, 0 69, 5 70, 0 70, 5
1763 7 65,5 65,5 65,0 66,0 65,5 68,0 69,0 71,5 72,0 71,5
Gen. 14 64, 0 65, 0 66, 0 68, 0 67, 5 68, 5 68, 5 69, 5 68, 5 67, 5
    28 66, 5 68, 0 68, 0 67, 0 67, 5 68, 0 68, 5 68, 5 69, 0 69, 5
Feb. 10 67,0 66,0 65,0 66,0 66,0 66,0 67,0 67,0 67,5 68,5
    15 66,0 66,0 66,0 66,0 67,0 68,0 68,0 68,5 68,5 68,5
    18 67,5 66,5 65,0 67,0 66,5 67,0 67,5 68,0 69,0 69,5
    24 64,5 65,0 68,0 69,5 68,5 68,0 67,5 68,5 69,5 69,0
```

### DI OSSERVAZIONI

- Addition

#### Ore

```
11
      13
           13
                           2
                               3
                                               6
                                                         8
                    M. M. M.
M.
      M.
           M.
                M.
                                   M. M. M.
                                                    M.
                                                         M.
72,5 71,0 69,0 67,5 67,5 66,5 67,0 66,0 65,0 66,0 66,0 66,0
71, 5 71, 0 70, 5 68, 5 68, 0 69, 0 68, 5 68, 0 68, 0 68, 0 69, 0 67, 5
73.0 73,0 72,0 71,0 69,5 69,5 69,0 68,0 68,5 68,0 68,5 60,0
74,5 73,5 73,0 73,0 71,5 69,5 69,5 70,0 69,0 68,0 69,0 70,0
74,0 72,0 73,5 72,5 71,0 70,0 71,0 68,5 70,5 70,0 71,0 68,5
74,0 74,5 67,5 72,5 71,5 68,5 69,0 68,5 68,5 68,0 68,0 66,5
72, 3 71, 0 73, 5 70, 5 68, 0 68, 5 68, 0 67, 5 68, 0 67, 5 67, 5 68, 0
71, 5 71,0 69,5 68,5 68,0 66,5 64,0 56,0 65,0 66,5 68,5 68,5
71,0 70,5 70,0 70,5 69,0 68,0 68,5 67.5 68,0 68,5 68.0 67.5
72,0 71,5 71,0 70,0 68,5 68,5 68,5 67,0 66,5 67,0 67,0 67,5
71,5 71,5 70,0 70,0 69,5 69,0 67,0 66,5 67,5 67,5 68,0 67,5
71,5 71,5 71,5 70,5 69,0 67,0 67,0 66,0 66,0 67,0 66,5 66,5
71,5 70,0 69,5 70,0 63,5 66,5 69,0 60,0 62,5 54,0 57,5 60,0
70,0 69,5 68,5 68,5 68,5 67,5 67,0 66,0 65,0 60,0 64,0 65,5
71,0 69,0 68, 5 67, 5 66, 5 67,0 66, 5 66, 5 66,0 66,5 67,0 67,0
66,5 66,5 68.0 67,0 66,5 67,0 67,0 65,5 66,0 63,5 66,0 67,0
69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 65,0 64,0 65,0 64,5
67, 5 67, 5 66, 5 66, 5 65, 0 65, 0 65, 0 65, 0 65, 0 66, 5 66, 0
67,5 66,0 66,0 67,0 66,0 65,5 65,5 64,5 63,5 64,5 65,0 65,3
69,0 67,5 68,0 66,5 65,5 64.0 62,0 63,5 65,0 64,5 65.0 66,0
67,0 66,0 65,0 63,0 63,0 64,0 64,0 63,0 64,0 64,5 6/,0 64,5
```

VI. Stimo, che una semplice occhiata a queste osservazioni sia bastante a persuadere, che vi è nella declinazione della Calamita un periodo diurno, di tanto in tanto però turbato da alcune irregolarità. Di queste, quali si vedono nelle precedenti tavole, tre possono essere le cagioni: la prima, qualche errore nell'osservazione; la seconda, qualche alterazione nella Bussola, da cui non posso accertare, che sia stata del tutto esente; la terza, qualche cagione, che suo di ordine ha realmente variata la declinazione. Che vi sia questa terza cagione, lo prova in primo luogo l'universale induzione, che ci dimostra non esservi alcun essetto, il quale da altri, che accidentalmente vi si framischiano, non sia or piu, or meno turbato: secondo, lo provano le osservazioni riferite da Pietro Mustchenbroek nella Disservazione de Magnete al Cor. 5. dell'esprimento 97. tra le quali una ve n'ha, in cui l'ago corse mezzo grado in 23. minuti d'ora: Terzo, la medesima cosa mi hanno insegnata alcune mie osservazioni. Adì 18. Dicembre 1762. l'ago si mosse come segue.

re	Italiane	Declinazione	Ore Ital.	Decl.
		M.		M.
I.	0	63, 5	5. 0	62, 5
I.	30	67, 0	5. 30	63,0
1.	45	69, 5	6. 0	54, 0
2.	0	66, 5	6. 20	54, 0
3.	0	69, 0	6. 40	61,0
4.	0	60, 0	7. 0	57, 5
4.	10	60, 0	7. 20	57, 5
4.	20	61, a	7. 40	59, 0
4.	30	62, 0	8. <u>o</u>	60, 0
4.	45	61,0		4

Questa è la massima irregolarità, che ne' predetti tempi mi sia caduta sotto dell' occhio, la quale certamente non può del tutto risondersi nelle due prime cagioni: non nella prima di este, perche oltre l'esattezza, di cui ho parlato al numero 2., ogni osfervazione l'ho ripetuta una, o due volte, il che ho fatto ancora, quando da un ora all'altra ho trovato un moto, che uscisse alquanto dall'ordinario: non nella seconda, perche restando la Bussola nella medesima direzione del muro, l'ago per indicarmi una declinazione tanto diversa dalla precedente avrebbe dovuto troppo notabilmente accostarsi, o allontanarsi dal piano della Bussola, del che mi sarei accorto dalla parallassi dell'ago guardato da punti diversi, la quale in simili occasioni non ho mancato di esattamente osservare.

Non voglio lasciar qui d'avvertire, che nella prima serie d'osservazioni non ho mai trovata irregolarità, la quale non possa comodamente attribuirsi alle due prime cagioni, benche piu volte il dì abbia osservato l'ago ancora in que' giorni, che sono tra mezzo ai descritti nella tavola: il che mi sa credere, che le variazioni reali della declinazione sieno maggiori ne' tempi freddi, che ne' caldi.

VII. Se tutto ciò ben si consideri, non sarà maraviglia il vedere talvolta cresciuta la declinazione in un ora, in cui secondo l'altre osservazioni dovrebbe scemare, o al contrario. Tali irregolarità pertanto non impediscono, che vi sia un Periodo, il quale si osserverebbe sempre l'istelso, se potessero tenersi lontane tutte le cagioni accidentali, che lo turbano.

VIII. Meglio si vedrà questo Periodo, e insieme la legge, con cui camina, se prendansi le somme di tutte le De-

cli-

clinazioni della medesima serie appartenenti all' istes, ora: così le cagioni accidentali, delle quali in un numero notabile di osservazioni sono altre ad altre contrarie, scambievolmente distruggendosi, almeno in gran parte, lasceranno le predette somme assai prossimamente, quali ce le darebbe un Periodo non soggetto ad alcun turbamento. Ecco descritte nella seguente tavola le somme delle Declinazioni nelle osservazioni della prima serie.

	Somma		Somma
Ore	delle Declinazioni,	Ore	delle Declinazioni
9	1423, 5	20	1508, 0
10	1422, 5	21	1489, 5
11	1406, 0	22	1474, 0
12	1398, 0	23	1462, 5
13	1407, 5	24	1457, 5
14	1434, 5	I	1455, 0
15	1476, 0	2	1448, 0
15	1504, 0	3	1442, 0
17	1524, 5	4	1443, 0
18	1540, 0	5.	1435, 0
19	1529, 5		

IX Scorrendo questa tavola s' incontra la minima declinazione alle ore 12, dalle quali cresce verso Ponente sino alle 18, indi torna in dietro sino alle 3, e può dirsi ancora sino alle 5, non essendosi da sar conto del piccolissimo salto, che s' incontra alle 4; imperoche, se tolgasi la sola osservazione de' 9. Luglio, la somma delle declinazioni alle ore 4 diventa minore della precedente di un minuto. Dalle 5. alle 9. sorse va sempre scemando, sorse dopo esser diminuita sino a un certo tempo di nuovo cresce sin circa alle 9; la sola fola osservazione ce ne può accertare: qualunque cosa però accada, le variazioni non possono essere che assai

piccole.

X. Per determinare con maggior precisione la minima, e massima declinazione, ed i loro tempi, le ho cercate per interpolazione, servendomi per la prima delle somme dalle ore 10. alle 14., e per la seconda dalle 16. alle 20. La minima somma cade precisamente alle 12., e però è di minuti 1398. la massima alle ore 18. e sei minuti, nè differisce sensibilmente da quel-

la delle ore 18., onde è di minuti 1540.

XI. Per ridurre le Ore Italiane alle Astronomiche, ho determinata l' ora Italiana dal mezzo dì in ciascun giorno, in cui ho satte le osservazioni, e prendendo il mezzo geometrico, cioè il quoziente della somma di tutte le Ore divisa pel numero de' giorni, trovo il tempo medio del mezzodì all' Ora Italiana 16. 6., da cui togliendo ore 12., tempo della minima declinazione, avremo questa alle ore 4. 6. avanti il mezgiorno, ovvero alle ore 7. 54. della mattina. Se poi dalle ore 18 6. tempo della massima declinazione tolgasi l' ora del mezzo-giorno, resterà questa alle ore due della Sera.

XII. La differenza tra le somme della massima, e minima declinazione è di minuti 142, la qual divisa per 25. numero de' giorni, ci da per disserenza media diur-

na minuti 5, 7.

XIII. Prima di fare l' istesse operazioni intorno alla seconda serie, si tolga via tutto il giorno 18. di Dicembre, in cui la declinazione su troppo notabilmente turbata: l' ho voluto nondimeno esporre in questa tavola, per non lasciare alcuno de' giorni, ne' quali ho fatte l' osservazioni, e affinche veggasi ciò, che può tal volta accadere. Per l' istessa ragione si correggano le declinazioni dell' ore 23. e dell' ore 6. a cagione dell' osservazioni de' 23. Novembre, e 29. Dicembre, che dall' altre prossime troppo discordano. Per sar ciò si sommino le declinazioni delle 22., e 23. ne' 19. giorni, che restano: la prima somma è 1328., la seconda 1319. e la differenza 9.; Onde sacendo come 19. a 20. così 9. a 9, 5. dovrà la seconda somma stabilirsi minor della prima di minuti 9, 5. All' istessa maniera trovasi la somma delle ore 6. minore di quella delle ore 5. di mezzo minuto. Ciò satto ne vengono le seguenti somme.

Somma Ore Somma Ore delle Declinazioni delle Declinazioni 1402, 5 11 1343, 5 22 1393, 0 1351, 0 12 23 1378, 5 13 1351, 5 24 1358, 0 1367, 5 14 Ľ 1347, 0 1365, 0 2 15 1367, 5 1339, 0 16 1383, 0 1327, 0 17 4 5 6 18 1406, 5 1330, 0 1329, 5 1423, 0 19 1342, 5 1430, 0 20 1338, 5 1416, 5 2 I

XIV. Da questa tavola apparisce chiaramente un Periodo assai regolato dalle 15. fino alle 4. non così tra queste , e le 15. ma se suppongasi in ciascuna somma un errore non maggiore di cinque in sei minuti introdottovi da cagioni accidentali, il quale non è improbabile, potranno esse rendersi piu regolari, per cagion d'esempio nella seguente maniera.

Ore

	Political	Ch -	
Ore	Delle De	eclin.	
4	1327	Il	moto
5	1330		parte d
6	1333		numero

Samma

1338

Il moto troppo lento in questa parte della giornata richiede un numero piu copioso di oslervazioni per averlo con maggior precisione.

8 1340 cisione . 1 1349 XV. La 1

11 1349 XV. La massima declinazione tro-12 1353 vata per interpolazione colle som-13 1357 me dalle ore 18. alle 22. è di 14 1362 minuti 1430, 5 all' ore 19. 50, 15 1365 dalle quali togliendo ore 18. 41,

tempo medio del mezzo-giorno resta 1.9 della sera per tempo della massima declinazione. Quanto alla minima, essendo inutile l'interpolazione per le irregolarità, che s'incontrano, puo stabilissi tra le 4, e le 5.

Italiane, cioè tra le 9, e le 10. della sera.

XVI. Prendendo per minima fomma quella delle ore 4, la differenza tra quella, e la massima è di minuti 103, 5, la qual divisa per 20. numero de giorni da per

differenza media diurna minuti 5, 2.

XVII. Confrontando i risultati da queste due serie, i tempi della massima declinazione disseriscon di poco, se
continsi le ore dal mezzo giorno, come ancora le loro
disserenze medie diurne dalle respettive declinazioni minime, non così l' ora della minima declinazione, se
qualche occulta cagione non mi ha ingannato in cosa s tenue: dalle 4 alle 11 le somme crescono solamente di
sedici minuti, e mezzo, il che da ragguagliatamente meno di
due minuti, e mezzo per era: ogni piccola cagione può notabilmente alterare un moto sì tardo, e farci comparire la
minima declinazione molto lontana dal suo vero tempo

VIII. Siccome nella declinazione della Calamita si os-

serva un Periodo diurno, così può dubitarsi, che ve ne sia un altro annuo. La direzione dell'ago calami-tato non solamente non è un effetto costante, come si è comunemente creduto per qualche secolo, ma varia continuamente descrivendo piccole oscillazioni così nella durazione, come nella grandezza disferenti. Or siccome in questa gran varietà vi è una cagion periodica, che muove l'ago per cinque in sei minuti in una parte della giornata verso Ponente, ed in altra verso Levante, così l'istessa, o altra cagione sorse produce un simile effetto nel corso di un Anno. Non avendo io comodo di farne l' osservazione, esporrò so-

lamente, come potrebbe esser fatta da altri.

XIX. Ciò, che moltissimo importa in questa ricerca, è, che la Bussola si mantenga nell'istesso stato. Può questo ottenersi con fermare gagliardamente una buona Bussola di ottone a qualche pietra, che sia in parte incastrata in una soda parete, in parte esca suori di essa: Nè sarebbe inutile il farlo in due diversi luoghi, per distinguere dall' andamento di aghi diversi ciò, che debba attribuirsi a reale variazione dell'ago, da ciò, che può introdurvi qualche alterazione fatta nella Bussola; non essendovi cosa sì stabile, che non possa col tempo soggiacere a sensibili moti. Tanta di-ligenza non è stata necessaria per determinare il Perio-do diurno, in cui non si tratta di paragonare giorno con giorno, ma solamente ora con ora. Le osservazioni potrebb r sarsi un ora, e mezzo dopo

il mezzo-giorno, circa il qual tempo accade la massi-ma declinazione: Se pure altrove le cose vanno, come quì in Roma, il che potrebbe ognuno esaminare ne'

propri luoghi.

Dovrebbero continuarsi queste osservazioni per più anni,

potendo facilmente le cagioni accidentali alterar molto le declinazioni di uno, o due anni: il numero di essi bastante a dedurne qualche cosa di certo dipende dall' essere il Periodo piu o meno sensibile, e piu o meno soggetto ad esser turbato.

Le somme delle declinazioni osservate negli stessi mesi, con prendere ne' piu brevi qualche giorno da' mesi vicini, per uguagliarli a' piu lunghi, farebbero facilmente vedere il corso di questo Periodo, quando vi sia.

XX. Stabilito il Periodo diurno della Calamita ho voluto determinare ancora la declinazione assoluta. A quest' essetto adì 27. Settembre del 1762. mi son portato alla Meridiana della Madonna degli Angeli nelle Terme Diocleziane coll' istessa Bussola, e in diversi luoghi tra le quattro, e le cinque dopo mezzo-giorno, ho trovata la declinazione, come segue, dopo aver ripetuta in ciascuno di essi l' osservazione una, o due, o anche tre volte.

Centelime	Declinazione		
del raggio	Occid.		
	G. M.		
40	16. 5 1	Non fidandomi a	fatto di me
60	15. 55	stesso pregai un	o de' Nostri,
80	16. 45	di molta abilit	à nell' osser-
100	16. 25	vare, a portarsi	alla Meri-
120	17. 15.	diana con altr	a Bussola di
140	18. o	grandezza poco	minor della
170	17. 45	mia, per esplora	re ne' mede-
200	16. 20	simi luoghi la	declinazione,
220	14. 30	significandogli s	olamente, che
in diversi	punti l' avevo	trovata notabilm	ente diversa.
Lo tece ad	lì 22. dell' O	ttobre seguente.	confrontate
le ollervazio	oni si trovaron	o a un dipresso	le medesime
disserenze.		Q 2	Nella


Nella Meridiana non si vede scompaginamento sensibile; onde non è da rifondersi questa varietà in alcun vizio contratto da essa col tempo, e però non può provenire, che da diverse forze attraenti sparse per la Chiesa, che sanno dove piu, dove meno deviare l'ago dal suo vero posto. Al punto 150 la Meridiana rade uno de' quattro angoli, che sostengono la volta di mezzo: indi camina tra due Cappelle chiuse con cancelli di ferro, sul principio piu vicino al-la deltra, sul fine alla sinistra. Presso ancora al predetto angolo un aquedotto, che traversa la linea, è co-perto con lastra di ferro in quella parte, che sog-giace a' marmi della Meridiana, co ne ho saputo da chi, in occasione di rinnovarsi il pavimento della Chiesa, ha avuto comodità di vedere a che sono appoggiati, e in qual maniera collegati i marmi, a cui è raccomandara la linea.

Stimo pertanto, che a tutte le osservazioni debban preserrisi le prime due, perche satte in luoghi i pu lontani dalle pareti della Chiesa, e da qualunque serro, per quanto almeno può collo occhio discernersi ed ho potuto sapere dalla medesima Persona pratica del luogo. Prendendo il mezzo tra esse la declinazione della Calamita sul fine di Settembre del 1762.

fu di gradi 15. verso Ponente. XXI. Nel 1670 il S.g. Auzout osservò in Roma la declinazione occidentale della Calamita tra i gradi due, e due e mezzo, cone riferisce il Maischenbroek dopo il corollario 6. dell' esperimento 97. Dunque in anni 92. si è mossa verso Ponente gradi 13. 45,, ovvero minuti 825, dal che viene il moto medio annuo di 9. minuti.

Nella tavola delle Declinazioni osservate in Parigi, che

che trovasi nel Dizionario Enciclopedico alla voce Asguille aimantee, ed in altri libri vedesi nel 1670. la Declinazione occidentale di gradi 1. 30., e nella Connoissance des Mouvemens Celestes pel 1763. alla pag. 208. dicesi osservata adì 8. Maggio 1760. di gradi 18. 30 dunque in anni 90. il moto è stato di gradi 17 verso Ponente, che danno ragguagliatamente minuti undici e un terzo per Anno. Non è cosa nuova, che nell' istesso tempo il moto in declinazione sia maggiore in uno, che in altro luogo: gli errori però, a' quali simili osservazioni sono soggette, possono aver notabilmente alterata la disservaza tra l' uno, e l' altro moto.



# RISPOSTA ALLA SESTA QUESTIONE,

CHE IL NEWTON PROPONE AI FILOSOFI NEL FINE DELLA SUA OTTICA

Del Sig. Dottore

# CANDIDOPISTOJ

Gnun sa, che qualunque corpo esposto ai raggi del Sole si riscalda in qualche grado, e i Filososi hanno osservato, che i corpi sono piu o meno sacili a riscaldarsi, concepiscono maggior o minor calore, e lo ritengo-

gior o minor calore, e lo ritengono per piu, o meno di tempo secondo la loro diversa natura, la loro diversa densità, ed il loro colore. Il Newton con molti altri Filosofi ha ofservato a questo proposito, che di due corpi della stessa natura, e della stessa densità quello, che abbia la
superficie nera, concepisce maggior calore di quello, che
abbia la superficie colorata: ma questo gran Filosofo non ha
avuto il tempo di scoprire, se di ciò la cagione sia,
perche i raggi Solari non si ristettano dal corpo nero,
ma vi entrino dentro, vi s' intralcino, e vi facciano
tante refrazioni, che finalmente vi si perdano, e dirò
così vi muojano; neppur si sa quanto calore precisamente un corpo nero della stessa natura concepisca piu
d' un corpo bianco. Questa scoperta con molte altre
la lascia il Newton in forma di domanda nel fine del
terzo Libro della sua Ottica ai Filosofi avvenire, perche chiamato (come egli dice) ad altri studi su costretto

stretto ad abbandonare le sue osservazioni sopra la luce. Di queste domande quella, cui io mi son proposto di rispondere, è la sesta, ed eccola colle sue proprie parole "An non corpora nigra calorem de lumine sa;, cilius, quam corpora colorata concipiunt ideo, quia luminis
,, id, quod in illa incidit non restestitur extra, sed ingre,, ditur in ipsa corpora, intraque ea restestitur, ac refringi,, tur sapius, atque iterum usque eo donec restinguatur penitus, & intercidat?, La maniera, di cui io mi son
servito per rispondere a questa domanda, mi ha somministrata la risposta per un altra della prima sorse
piu curiosa, che si può mettere in questi termini,
,, usque ad quem pracisè gradum corpora nigra concipiant ca,, lorem magis, quam corpora alba?
,,
Non importa, che io qui riserisca tutte quelle esperienze, che inutilmente ho satte avanti di pervenire a
quella, che serve di risposta, e alla domanda Newtoniana, e alla mia, onde passandole sotto silenzio dirò, come una sera per caso mi venne il pensiero di stretto ad abbandonare le sue osservazioni sopra la lu-

rò, come una sera per caso mi venne il pensiero di assurnicare al lume della lucerna la metà della palla, che tiene il mercurio in sondo del Termometro di Reaumur, come in fatti feci, e l'affumicai tanto, che pigliasse un nero vellutato perfettissimo. Il caso, che pigliasse un nero vellutato persettissimo. Il caso, che presiede per lo piu alle grandi scoperte, presiede ancora alle piccole, perciocchè esposto la mattina dopo, [che era il 21 di Luglio del 1761.] questo Termometro ai raggi Solari ve lo feci stare sino al mezzo giorno, quando il mercurio toccava il grado 35. della scala di Reaumur, e la palla riceveva nella sua metà assumicata tutta la forza dei raggi Solari. Segnato pertanto il punto, dove toccava il mercurio, che (come dissi) era il grado 35., girai su la tavola dall'alto del Termometro il tubo, e seci venire esposta ai raggi raggi Solari la metà della palla, che era rimasta bian? ca, quando in pochi momenti vidi scendere il mercurio dal grado 35. al grado 32. in circa, ove si fer-mò, e stette per lungo tempo; quindi colla solita industria fatta ricomparire la metà della palla affumicata, il mercurio presto se ne risalì al grado 35. come prima, il che fatto moltissime volte trovai sempre questo moto costante. La sera seguente accrebbi il fumo alla metà della palla gia affumicata, ed il giorno dopo mantenendosi il medesimo caldo nell' Atmosfera (che era di gradi 21., e che fu il massimo, che avessimo in quell' Anno ] trovai, che al senso la scesa, e la salita del mercurio secondo la parte, o nera, o bianca, che voltava al Sole, era la medesima, e che la differenza era costantemente di tre gradi. Pochi giorni dopo essendo scemato nell' Atmosfera il caldo, ed essendosi ridotto a 14. gradi, ripetei la medesima esperienza, e trovai, che la differenza fra il punto, ove toccava il mercurio, quando il Sole dava su la parte nera della palla, dal punto, che toccava, quando il Sole dava su la parte bianca, non era piu di tre gradi, ma di due, e repetutala nell' Ottobre, quando il caldo dell' Atmosfera era di 7. gradi, la differenza era di un grado solo, e nell' Inverno, quando l' Atmosfera aveva il gelo, la differenza non era sensibile. Tutti questi esperimenti per maggior cautela io li ho rifatti nel corso dell' Anno 1762. in un altro Termometro, ed ho trovato il medefimo per l'appunto; onde non pare, che possa esservi stato sbaglio di sorta alcuna.

Vediamo adesso, come il nostro esperimento risponde ad ambedue le proposte domande, e a tutte le loro parti. Nell' ipotesi che la luce non differisca dal fuoco, è chiaro in primo luogo, che i corpi neri concepiscono maggior calore de corpi colorati, perche la luce non fi riflette da essi, ma vi entra dentro, e li pene-tra.

Imperciocche come abbiamo veduto i raggi Solari quando percuotevano su la parte affumicata della nota palla, inducevano nell' interna sostanza del mercurio una maggior rarefazione di quando percuotevano sulla bianca, indizio certo, che allora i raggi penetravano in maggior quantità nella sostanza del mercurio, e attraversavano perciò in maggior copia la nera superficie della palla; ecco adunque assicurato quello, che il Newton, ed altri Filososi avevano congetturato.

Che poi la luce nell'attraversare la nera superficie d'un corpo sossira infinite refrazioni, è facile a dimostrarsi.

La luce [come abbiamo veduto] passa in maggior copia per la superficie nera, che per la bianca; adunque se si veli con il sumo da una parte una Lente Ustoria, e questa parte si rivolga al Sole per incendiare un corpo, parrebbe, che allora questa Lente dovesse incendiarlo con più facilità di quando non era affumicata, ma se sene faccia l'esperimento, si troverà tutto il contrario, e si vedrà, che mediante le irregolari refrazioni, che sosse la luce nell'attraversare la nera superficie della Lente, questa non può più dirigere a un sol punto li scompigliati raggi per sormare il suo suoco, e per tal ragione non può incendiare il corpo, che ad essa si era presentato.

Vorrebbe sapere ancora il Newton, se la luce, supposto che entri nei corpi neri, vi muoja dentro, e vi si perda; ma questa domanda vale non solo per i corpi neri, ma per tutti i corpi di qualunque colore eglino sieno, perciocche entrando in tutti la luce o piu o meno, di tutti si può domandare, se quella luce, che

K

vi entra dentro, riesce nell' agghiacciarsi del corpo, ovvero vi muore; oltre di che la risposta a questa domanda può dipender molto dal sistema, che uno ha della luce; ed io per me son di opinione, che ella riesca, e ritorni nella sua sfera; ma questo non è il luogo, che io adduca le ragioni di questa mia opinione. Si vuol far vedere adesso, come il mio esperimento, che ha risposto a tutte le parti della domanda Newtoniana, risponde ancora alla domanda, che posi in secondo luogo, e che ricerca quanto calore precisamente un corpo, che abbia la superficie nera, concepisca più di un altro, che abbia la superficie bianca, e che sia della stessa natura, e densità del primo. La palla del mio Termometro nel suddetto esperimento si può dire, che faceva le veci di due corpi, col vantaggio, che siccome in due staccati corpi sempre può restare qualche dubbio interna alla la manuali di la compi se di la compi se di la la compi se d dubbio intorno alla loro natura, e alla loro densità per-fettamente eguali, quì non vi poteva esser dubbio al-cuno, mentre o la palla mostrasse la bianca superficie, o la nera, il mercurio entro racchiuso era sempre il medesimo. In quanto al colore mi pare, che il nero che fa sul vetro il sumo di lucerna, possa prendersi per il più persetto, come ancora il bianco, che da il mercurio posto dietro al vetro può prendersi sicura-mente per un bianco perfetto; Sicche avendo veduta la differenza del calore, che concepiva il mercurio, quando la palla mostrava al Sole la superficie bianca da quando mostrava la nera in tre diversi tempi, essere nel primo di tre gradi, nel secondo di due, e nel terzo di uno, e che in questi tre tempi la differenza del calore nell' Atmosfera era al senso uguale, come abbiamo di sopra fatto vedere, potremo stabilire la differenza media di due gradi. Adunque non considerando

rando per niente il vetro, che chiude il mercurio, diremo che quelto corpo, che è quattordici volte più denso dell'acqua in un cielo temperato esposto ai raggi del Sole col suo natural colore, concepisce due gradi meno di calore di quello, che concepirebbe, se avesse la superficie nera.


La difficoltà di poter dare al vetro i colori senza lasciar dei dubbi negli esperimenti ha resi vani nella scorsa Estate del 1762 i miei tentativi sopra la misura del calore, che potesse concepire il mercurio, qualora avesse la superficie tinta dei sette diversi colori, perciocche era mia intenzione di scoprire, se i diversi raggi dando diversi gradi di calore al corpo, entro cui s' insinuano, seguissero in questa diversità di gradi la proporzione della loro refrangibilità, e confermassero le congetture dei Filosofi sopra la cagione di detta proprietà.



# PORTAARMONICA

# - De la Maria de la Compania de la C

# MONSIEUR MILLER



Passerò poi a descrivere le parti interne d' un altro modello a tre voci, alquanto differente dal primo, il cui meccanismo esigendo un Canone di Musica retto, e retrogrado, mi ha suggerito una composizione di nuovo metodo, che forse non sarà venuto ancora in pensiero ad alcun Professore sia di Matematica,

o sia di Contrappunto.

m 2 1 2 3

Avrei aggiunto alla descrizione de' due mentovati modelli anche quella d'un terzo, che suona più e diverse Arie di Musica; ma poiche ne riesce la struttura fin ora troppo composta, e complicata, e quindi priva di quella semplicità, che forma il massimo pregio di qualunque meccanismo, la considero per adesso fra l'opere mie impersette, e mi riserbo darla alla luce a suo tempo, insieme con altra macchina da me inventata in quest' anno, sulla quale si sabbricano gia da più mesi le rinnomate Cinte ritorte di Siena, con maggior persezione di prima, e con un dispendio assai minore di tempo, di fatica, e di Operanti.

# Articolo primo.

### PARTI ESTERNE DEL PRIMO MODELLO

L A veduta esteriore del primo Modello rappresenta agli occhi soltanto la figura d' un Uscio o Bussola ordinaria di una Camera, abbellita con intagli dorati, e di-

pinta, conforme apparisce nella Tavola prima.

Sullo specchio superiore di detta Bussola in mezzo all' intaglio dorato vedesi una Corona Imperiale. Questa, quando si serra l'uscio, viene sollevata per l'altezza di un braccio e mezzo in circa da due Aquile, che appoggiano i loro artigli sopra una sfera, e per mezzo di due cordoni, che vanno tirando co' rostri, spiegano una specie di panneggiamento, sopra il quale si legge scritta in lettere grandi la seguente Dedica.

Spose Augusti Reali, udite il suono?

Pindo per Voi festeggia: all' opre intento

Sta delle Muse il coro: Apollo io sono,

Che al rimbombar di cento Viva e cento,

Lieto ne scessi a tributarvi in dono

Questo, opra di mia man, nuovo Istrumento:

Sol', ch' ei gradito sia, può farmi altero,

Più che i sassi Ansione un di non sero.

Questo sopraporto, che è scritto e dipinto con colori d' erbe sopra un drappo di seta, si stende nel serrare: e si ripiega nell'aprir l' uscio a guisa di un ventaglio, cioè quando è chiusa la Bussola, la Corona si trova sollevata, conforme vedesi nella Tavola prima, e quando si apre, il drappo si ripiega dietro all' intaglio, le Aquile sprissono, e la Corona va a posarsi sopra allo specchio superiore, a cui allora sa ornamento.

La pittura dello specchio superiore rappresenta un Co-

lonnato

lonnato, nel cui mezzo scende in aria la Fama. Alle due colonne laterali stanno la Pace, e l'. Abbondanza, che sostengono una pelle di Leone: In mezzo a detta pelle vi è un' apertura ovale intagliata nel legno del coperchio con un cristallo d'avanti, dietro al quale si legge a una strofa per volta la seguente Canzone Epitalamica.

Qui dentro è raccolta
Un aura d' Amor':
Ti spiega, l'ascolta,
Del Fato il tenor':

Di stragi di sangue
Tiù tempo non è:
L' Europa che langue,
Respira per Te: O Spofa vezzofa Tu fanne tesor'. III.

Di Pace è seguace L' Amere, e la Fè.

Non mai più bel seme In Ciel s' accoppie; Non mai tanta speme Per noi s' apprestò: Nè giorno si adorno Al mondo spunto.

IV. Dell' Aquile Auguste Al rapido vol' Fian brevi ed anguste Le strade del Sol'; Gli auspicj felici Ne scendon dal Pol

Di Regi fecondo

Fia il molle tuo sen

Eletti del mondo

A reggere il fren:

Ab tanto tuo vanto Affrettaci almen .

Deponi il sospetto
Deponi il rossor';
Al pronubo letto
Presiede l' Onor';
Tu sei degli Dei La cura maggior'.

Queste sei strose sono scritte con altrettanti colori, è disegni diversi, e si vanno mutando una dopo l' altra dietro al cristallo nell' atto, che l'uscio è vicino a serrarsi. Mutata che siane l' una, le succede immediatamente un' altra nel luogo istesso, ov' era la precedente, cioè dietro all' ovale apertura. Al disopra di questa nell' esterior superficie è scritta l' Aria della Canzone, acciochè, da chi muove la Porta, sene possa legger comodamente, e cantare ogni strofa sul a medesima Musica.

Sotto alla suddetta apertura un Genio, o Puttino tiene in mano una cartella, sulla quale si leggono le Note per il Flauto traverso, e Viola d'amore, o Violino, affinche si possa con questi strumenti accompagnare la Musi-

ca dell' uscio.

Lo specchio inferiore rappresenta una specie d' Atrio con un monumento, ove dall' Architettura, sedente in atto di considerare il suo lavoro, si vede inciso l'appresso

SONETTO

arbitrio della Terra, e il sommo Impero
Ter decreto del Ciel' diviso in dui
Contrastar' colla destra, e col pensiero
Lungo tempo i Borboni agli Avi tui:

- E i invan' misero oggetto agli occhj altrui Piangeva Europa il suo destin severo; Finche in Voi volse Amor gli sguardi sui E i voti consolò d'un Mondo intero.
- A quello, onde ei Vi uni, laccio giocondo Il destino de' Regni ancor soggiacque, E respirò da tante stragi il Mondo;

Egli sottratto alsin', come al Ciel' piacque, Di lunghe emule gare al dubbio pondo; Offerse il collo all' aureo giogo, e tacque:

L' uscio tanto nell' aprirsi, che nel serrarsi suona da se la Musica o sia Aria della Canzone Epitalamica colle sue quattro parti di Soprano, Alto, Tenore, e Basso sopra 132. corde, tutte di budello, alla riserva de' contrabassi, i quali hanno cordoni di seta ricoperti con sil' d' argento: L' armonia, che rende, è quasi simile a quella d' un' Arpa angelica, e sorse più grata.

Le Note dell' Aria sono composte in modo retto, e retrogrado, e dicono lo stesso per ogni parte a somiglian-

za del noto seguente verso.

Roma tibi subito motibus ibit amor.

D' onde deriva, che aprendo l' uscio per metà, e riferrandolo si sente suonare l' Aria intiera, come se si susse aperto del tutto: Aprendolo per un terzo, e riserrandolo si sente la prima, e terza parte dell' Aria, che sanno una melodia completa: Aprendolo poi per due
terzi, e parimente riserrandolo, si sente tutta l' Aria
colla replica della seconda parte: In somma per quanto poco, o molto si apra, e si riserri l' uscio, si sente sempre una melodia persettamente finita.

Mentre suona la Porta Armonica presenta insieme la sua parte a ciascuno d'avanti agli occhi tanto a chi dee cantar la Canzone, quanto a quelli, che debbono

accompagnarla col Flauto, e Viola d'amore.

Per rendere la melodia più variata si può, nell'aprire la Bussola, suonare con li strumenti il Ritornello; nel serrarla poi si può acconpagnare la voce cantante con gli stessi Strumenti, consorme si vede nella Tavola terza

Fig I.

Chi ha pratica del Violino, può da se stesso, e senza l'ajuto di alcuno, suonare il Ritornello, e poscia accompagnar la sua voce coll'uscio, e Violino, appoggiando la spalla sinistra all'estremità del medesimo uscio, e movendolo o presto, o tardi, come pù gli piace; perochè tale attitudine niuno impedimento gli reca ne al suono del Violino, ne al canto.

Manifestato il suo ingresso dal suono; ma anche dalla mutazione della strosa, che vedesi dietro al cristallo: Anzi se più volte è stata aperta la Porta, senza che siasi potuto sentirne il suono, sarà facile nondimeno venirne in cognizione; imperciochè, quante volte essa si aprè e si serra, tante strose si mutano; Laonde ristettendos alla strosa, che vi si era lasciata, e osservandosi il numero delle strose mutare, può sicuramente affermarsi il numero delle volte, che la Porta Armonica è stata aperta.

Volendo poi, che l'uscio non suoni più; nè dia alcun tono, basta levare un piccolo nodo al cordon di seta, che allora tutte le parti staranno serme tanto nell'

aprirsi, che nel serrarsi.

La struttura di questa macchina, ancorchè si apra ; o si serri presto ed incautamente la Bussola, è poco sottoposta a guastarsi, avendo io procurato di attenermi ad una meccanica semplice, senza ruote, e senza denti, come si potrà rilevare dalla descrizione delle parti interne, che darò nel seguente Articolo.

# Articolo secondo.

#### PARTI INTERNE DEL PRIMO MODELLO:

Anno gli specchj delle Bussole per ordinario circa un braccio e mezzo d' altezza, e quasi altrettanto di larghezza: Ond' io per rendere il mio Modello adattabile alla maggior parte degli uscj, feci fare due telari, composti ciascuno di quattro regoli lunghi un braccio e mezzo, e grossi circa un soldo di braccio. Sopra questi telari feci incollare alcune tavole sottili d' abeto di Germania

Germania bene stagionato, indi li applicai talmente alla Bussola, che formassero con quella due corpi sonori, ai quali le tavole d'abeto servissero di sondo, e li specchi della Bussola di contrasondo. Perchè poi questi corpi sonori potessero facilmente trasserirsi da una Bussola all'altra, non li volli incollare, ma li sermai semplicemente colle otto viti - v. v v. - &c.

I quattro regoletti - e. f. - sono quattro ponticelli, divisi ogn' uno in settanta parti uguali, e armati di punte di serro, per sostenere le corde, le quali si accordano avvolgendole a piccoli perni non altrimenti che le

corde di un Cimbalo.

Dalla parte-a c.- nello specchio superiore, sono le trentatre corde del Soprano, e nell' inferiore quelle del Basso: Dalla parte - b d. - nel superiore sono le corde del Contralto, e nell' inferiore quelle del Tenore, e forma-

no fra tutte il numero di cento trentadue.

Le corde del Soprano, e Basso sono poste nelle divisioni o linee 1, 3, 5, 7, &c. e quelle del Contralto, e Tenore nelle divisioni 2, 4 6, 8, &c. affinchè le corde lunghe, che deono passare la larghezza della metà delli specchi, possano estendersi, quanto richiede il loro respettivo tono.

g. b. - Sono due regoli quadri collegati nel mezzo col-

le tre traverse i. n. - l. m. - m. i .-

o. o. o. o. Sono quattro piccoli legni, o come dicono gli Artefici, zoccoletti con stampe quadre, nelle quali salgono, e scendono perpendicolarmente i due regoli - g. h.-

- t. t. t. - Sono quattro viti di ferro, che pallano orizontalmente a traverso de' regoli - g b. - Ha ciascuna di esse due dadi con la vite semmina, o sia Madrevite, accioche messa al suo punto verso le corde, possa ser-marsi stabilmente ai regoli. Nelle estremità delle viti verso

le corde hò fatto fare degli spacchi con una lima a sega, entro ai quali sono incastrate; e legate con un silo di seta, quattro dinguette di suolo d' Irlanda ben' elastico, che a guisa di penne toccano le corde, e suonano tanto nel salire che nello scendere de' regoli-g. b.-p. -è uno zoccoletto, fermato alla Bussola, al quale è legata la carriolina - q. - mobile intorno al suo asse, in maniera che la carriolina possa voltarsi, e girare qualche parte della quale di

- p. - è uno zoccoletto, fermato alla Bullola, al quale è legata la carriolina - q. - mobile intorno al suo asse, in maniera che la carriolina possa voltarsi, e girare qualche poco orizontalmente verso quella parte, dalla quale di mano in mano viene tirato il cordone - s. r. q. x. - Detto cordone è fermato alle traverse de' regoli in - s. - passa so-pra la carriolina - q. - e si trova legato ad un gangetro di ferro nella muraglia contigua, verso la quale apresi l'uscio.

Da ciò si vede, che quando è chiusa la Porta Armo-

Da ciò si vede, che quando è chiusa la Porta Armonica, essendo allora la carriolina - q. nella sua massima distanza dal gangetto, ov' è fermato il cordone - s. r q x. - i regoli - g. b. - deono necessariamente starne sospesi nella loro maggiore altezza da terra; per lo contrario, allorchè la Porta si apre, e va accostandosi verso la muraglia contigua, poichè scorcia la dimensione del cordone, e conseguentemente la sua tensione, i suddetti regoli - g. b. - tratti dalla loro natural gravità, sono obbligati a discendere, e ad accostarsi al suolo, sinchè le due traverse di mezzo non vengono ad appoggiarsi in - l. m. - sopra gli zoccoletti - o. o. - oppure sopra il chiodo - y. - in - s. Questo chiodo - y. - dee fermarsi stabilmente nel legno della Bussola nel punto - s. - per avere un più sicuro riparo, in caso che per qualche disgrazia si staccasse, o si strappasse il cordone, mentre i regoli - g. b. - sono in alto.

Salendo, e scendendo nella maniera spiegata i regoli

Salendo, e scendendo nella maniera spiegata i regoli - g. b. - le quattro linguette - t. t. t. - vengono a toccare, e a suonare ogn' una le sue respettive corde di modo retto nel salire, e di retrogrado, o inverso nello scendere:

S 2 e questo

e questo è il motivo, per cui si è dovuto comporre la musica in sorma, che suonandola o da sinistra, a destra , o da destra a sinistra, sempre si senta l'istessa melodia. Vedasi la musica composta in tale maniera ; e
messa in note nella Tavola 3. signi dalla cui composizione si comprenderà, per qual ragione a ogni terza
parte sopra i ponticelli ese se nella Tavola 2 si si trova ul
na pausa; o vacuo di una cordamio il al composi
o Qui è d'uopo osservare, che, siccome l'ouscio nel

Qui è d'uopo osservare, che, siccome l'ouscio nel serrarsi dee sar qualche piccola sorza, per alzare i crego-li-g. b.-, si rende necessario tenere il cardine inseriore più lungo, e più in suori del superiore, ad effetto che l'uscio spinto dalla propria gravità etenda a riserrarsio per se medesimo, e con ciò saccia equilibrio al peso resistente de regoli, sonde la Porta riesca sacile a muoversi tanto nell'aprirla, che nel serrarsia con ciò saccia equilibrio al peso resistente de regoli, conde la Porta riesca sacile a muoversi tanto nell'aprirla, che nel serrarsia con ciò saccia della con ciò saccia della con ciò saccia della con con ciò saccia della ciò saccia della con ciò

Tutte le lunghezze delle corde descritte nella [ Tavi 3. Fig. 2. ] sono disegnate ne due corpi - a. b. c. di - [ Tav. 2.] All' estremità interiore di ciascuna corda, evvi un piccolo Ponticello, oltre il quale continua per verità ogni, corda fino alla fual piccola puntinandi ferro fillata nel piano) ov' è attaccata: Nondimeno per non rendere la figura troppo contusa hò in essa portato ogni corda, fino al suo Ponticello, ce niente spiù oltre grage be occasso non or O. Ild Ponticello del Tenore - e. f. I- che è dalla mano destra nello specchio inferiore - a. b. c. d. ed il ponticellini del mezzo, che gli corrispondono, sono più alti un mezzo foldo di Braccio, che quelli del Basso, e ciò al motivo che dovendo molte corde del Basso essere lungher, quanto è largo tutto lo specchio, queste, se il Ponticello del Tenore son susse più alto, verrebbero toccate per la seconda volta dalla linguetta del Tenore, il che produrrebbe una confusione nell' Armonia.

I due corpi dello Strumento - a. b. c. d. - sono rinchiu-

si con due coperchi di tavole sottili, sermati ai medesimi corpi con gangheri, e piccole bandelle dalla parte
-a. c. per potersi aprire, e serrare dalla parte -b. d. - ove
sono le due serrature ai chiave - Il coperchio superiore è
unito all' inferiore con una tavola intagliata, sermata con
quattro gangetti. Tutto lo Strumento così rinchiuso rende un tono assar più dolce, e grazioso, che quando si
sportelli, o coperchi sono apertili aborti la la seriali.

Per coprire con qualche ornamento i regoli g hi-che nel serrar l'uscio, vengono alzatridal cordone - s. r. q x - e per conseguenza spinti in fuori dal labbro superiore della Porta Armonica , chò immaginato il Panneggiamento, ovi è scritta la Dedica, colle due Aquile, che sostengono la Corona Imperiale à Resta poi in arbitrio di ogni uno coprire detti regoli con quell'ornamento, che pui gli piace: si assa il parti de superiore detti regoli con quell'ornamento, che

te, con-cui stringesi la lastra secondo il bisogno : 2 de de de de la un cerchio di cartone, ben levigato, e coperto di carta sine, sulla quale sono scritte le sei strose

bile. In cima di derro asse evvisun dado di ferro a vi-

della Canzone Epitalamica, tutte equidistanti l' una dall'altra. Il cartone è fermato stabilmente alla lastra d' ottone con sei vitine - e. e. e. e. e. e. onde quanto gira la lastra intorno all'asse - c. - altrettanto dee girare il cartone.

-f. g. i. - è una leva di legno, mobile intorno all'asse - f. - il quale è fermato dentro al coperchio: Questa leva è di due pezzi, ch'entrano l' uno nell'altro, e si fermano con una vite in - g.-nel modo istesso, che fermasi nel compasso la penna.

Verso l'estremità della seva-f. g. - evvi una seva più piccola - m. n. - mobile intorno al suo asse-ii - Questa, come si conosce dalla sua struttura, può alzarsi dalla parte - n. - ma non già abbassarsi, per la resistenza, che trova l'estremità - m. - quando questa viene ad essere in linea retta colla seva grande - f. g. -

( Tav. 2 ) che nel salire de' regoli alza la leva f. g. - ( Tav. 4. Fig. 1.) e nello scendere le dà la libertà d'abbassars.

Mentre si abbassa la leva, va sempre toccando colla estremità. n. - quella delle sei piccole lastre, che si trova in -x. b. - sulla quale sà un diverso effetto nel salire da quello, che vi fà nello scendere; imperciochè nello scendere, cede la leva piccola - m. n. - e tratta dalla leva grande - f. g. cade sotto alla lastra \_x. b. - senza farvi alcun contrasto, e senza imprimervi la minima forza. Calata che è la leva piccola - m. n. - sotto alla lastra - x. b. - l' estremità - n. - che prepondera, la rimette tosto in linea retta colla leva grande - f. g. - onde venendo questa di nuovo tirata in su dal cordoncino - o. o. - la carriolina - n. - torna a toccare per di sotto la lastra - x. b. - e non potendo la parte i. n. della piccola leva abbassarsi, dee perciò salire la lastra x. b. e insieme con essa girare la lastra grande col cartone . d. d. d. fino a che la piccola lastra - x. - b. non è arrivata in - t. b. - dove la carriolina - n. - cella di toccarla, e per conseguenza di far girare il cartone. AR-

#### Articolo terzo.

#### PARTI INTERNE DEL SECONDO MODELLO.

Prchè l'esterne parti più servono ad abbellire la Por-ta Armonica che a persezionarla, e perchè da quanto si è detto nell' Articolo primo, può ognuno idearle per se medesimo, nella descrizione di questo secondo Modello mi ristringerò a spiegare soltanto la struttura delle sue parti interne.

Sono queste rappresentate nella Tav. 5., dal cui disegno si conosce esserne l'essenzial meccanismo somi glievole a quello del primo Modello, alla riserva delle

seguenti piccole differenze .

In vece dei quattro ordini di corde, che sono nel primo Modello, se ne trovano quì soli due, un solo regolo - g. b. -, e due soli ponticelli - e. f. - e. f. -

Hanno questi due ordini 80. corde di ottone, delle quali 42. sono distese nello specchio superiore, e 38. nell

inferiore, tutte poste in distanze fra loro uguali.

Nello specchio superiore intanto hò messo quattro corde più, che nell' inferiore, in quanto nel primo vi sono due voci, e nel secondo una sola.

Le due Voci del primo sono prodotte dalle due linguette -i. t. - v. t. - La Voce del secondo dalla linguetta -t. -

Or perchè le due linguette . i. t. - v. t. - sono fra loro distanti l' intervallo di quattro corde, siegue necessariamente, che ciascuna di esse non tocca 42. ma sole 38. corde

Ciò potrà comprendersi facilmente solchè si osservi il disegno della Tav. 5.. Imperciochè, mentre sale il regolo - g. b. - la linguetta - i. t. - che principia a suonare dalla quinta corda, e le percorre tutte fino all' ultima di

fopra, verrà a toccarne foltanto 38 quante ne tocca la linguetta - v. t. che convincia dalla prima, e finisce alla quart' jultima, ovi è la stellina superiore mell' istessa maniera, ma con ordine inverso, mentre scende il regolo g. b., cominciando la linguetta - i. t. - a suonare dalla prima, la linguetta v. t. - a suonare dalla prima, la linguetta v. t. - a dalla quanta corda di sopra, e percorrendo questa tutte le corde sin all' ultima, e quella sermandosi alla quart' ultima, ovi è la stellina inferiore, si vede, che ambedue le linguette - i. t. - v. t. - vengono a toccare, tanto nel salire quanto nello scendere, l' istesso numero di corde, che vien toccato dalla linguetta - t. - nello specchio inferiore.

Le linee punteggiste, e contrassegnate - Sol. 2. Fa. 2. &c. denotano le respettive lunghezze delle corde, ed i pun-

ti, dove deono collocarsi i ponticellini.

Volendoss però far costruire una Porta Armonica di questo secondo Modello, sarà bene, per operare con più esattezza, paragonare ogni tono della Musica, notata nella Tav. 4. Fig. 4.; colla sua nota corrispondente nella Fig. 3., per dare a ciascuna corda quella precisa lunghezza; e grossezza; che ivi si vedrà distintamente spiegata.

Mon hò posto in questo Modello il contrasondo, ma mi sono contentato stender le corde sul semplice piano delli speechi, perchè hò osservato ottenersi anche senza il contrasondo una soavissima melodia. Ripeto ciò da tre ragio ni Primieramente dal moto continuo di tutta la Bussola, che aggiunto al moto particolare delle corde cresce notabilmente le loro vibrazioni : Secondariamente dalla moltiplicità delle corde analoghe, & unisone, che necestariamente esser deono in una composizione di Musica, come è la presente, di modo retto, e retrogrado, d'onde segue, che toccata una corda ne risuonano altre molte: In terzo luogo dalla qualità particolare delle corde

d' ottone, che sono dotate di una maggior elasticità, e conseguentemente compiscono in un medesimo tempo un

maggior numero di vibrazioni .

Per rendere ancor più grato il tono di questo Modello, hò procurato di uniformare la tangibilità delle linguette - t.-i.t.-v.t. - al polpastrello d' un dito umano: A tal' uopo hò vestito le sopramentovate linguette di suolo, con pelle sottilmente conciata, simile a quella, che usiamo per i guanti.

Dopo che con queste diligenze ebbi conseguito la bramata dolcezza dell' armonia, per renderla più variata, pensai a disporre talmente la macchina, che ora suonasse forte, ora piano, e che nel suonar piano, imitasse la

voce d' un Arciliuto .

Il meccanismo, che a tal' effetto ho ideato, benche congiunga il moto orizontale col verticale, tutta via è semplicissimo, e senza alcuna ruota dentata, conforme si conosce dal disegno fattone nella Tav. 5.

Per dimostrare la struttura di un tale meccanismo ; mi ristringerò a spiegar soltanto le parti, che trovansi nello specchio superiore, giacchè a queste intieramente

si rassomigliano quelle dello specchio inferiore.

-c. c. - è un regolo di legno, lavorato prima in forma quadrilatera, indi scantonato, e scannellato ad angolo retto dalla parte, che guarda le corde, verso il lato -c.c.-

-m.c.-m. c.- sono due piccole Bandelle di ferro sissate, e inchiodate sulla schiena superiore del regolo in-c.e mobili intorno ai loro cardini -m.m.- in modo che il regolo - c.c.- possa muoversi, a guisa d' un' imposta di Finestra, e conseguentemente alzarsi e abbassarsi sulle corde.

Sul lato inferiore - d. d. -; che tocca le corde, è incol-T lata una striscia di panno, ricoperto di cotone : 100 100 16

- o. q. - o q. - fono due pezzi di molla da Oriuolo, feramati al legno della Bussola in - o.o. -, che colle loro estremità - q. q - premono il regolo - c. c. - contro le corde, le quali toccate allora delicatamente dal cotone, perdono parte della loro vibrazione, e rendono un tono piano, simile a quello d' un Liuto: Per lo contrario, allorchè le corde non sono toccate dal cotone, mandano un tono forte, simile a quello d' un Cimbalo.

Adunque per ottenere ora il piano, ora il forte, facea di mestieri trovare un meccanismo, onde il regolo

-c.c.- ora si alzasse, ora si abbassasse.

A tale effetto sulla schiena del regolo -c.c.-all' estremità inferiore, hò collocato una piccola leva-b.a.x.-lun-

ga poco più di due foldi di Braccio.

Ha questa il suo asse in -a.-posto talmente, che la parte inferiore -a.b.- sia lunga poco più di un soldo, e mezzo, e la parte -a.x.- un mezzo soldo di Braccio. La parte -a.b.- è piegata, e ritorta in -b.- di modo, che l'estremità -b- sia più alta un mezzo soldo, che la schiena del regolo -c.c.- Su questa schiena è satto un piccolo incastro, in cui è posta una piccola molla, sermata all'estremità - n.- in maniera, che coll'altra sua estremità prema, e tenga abbassata la parte -a.x.- della leva, con una sorza tale però, che sia sacile a cedere quando viene abbassata la parte opposta -a b.-

-q. l.r. - è un braccialetto di ferro parallello alle corde, che porta in cima una piccolissima carriolina - r. - Questo Braccialetto è fatto a vite, e passa attraverso del regolo -g. b. - a cui è fermato per mezzo di due dadi colla madrevite in forma tale, che la carriolina - r. - arrivi appunto sotto alla leva - x. a b. - La piega - l. - serve a poter alzare, e abbassare la carriolina - r. - secondo il

bilogno.

z. - è un' apertura intagliata nel regolo -c.c. - l'arga

tanto, che vi possa passare la carriolina -r.-

Disposte cosi le accennate parti, segue necessariamente, che, quando per mezzo del cordone - u. - sulla piccola ruota - s. - vien' tratto in alto il regolo - g. h. - & assieme con esso il Braccialetto - p. l.-, la carriolina - r.- entrerà sotto alla leva ritorta - a.b. -; la forzerà a distaccarsi dalle corde insieme col regolo - c c - e passerà per entro la scannellatura del regolo - e c. - finchè giungerà all' apertura - 2. - ove cellando la carriolina - r. - di forzare il regolo - c. c. - e di tenerlo distante dalle corde, verrà questo dalle molle - o q. -o. g. - nuovamente abbassato: Quindi, mentre discende il regolo - g.h. - la carriolina - r. - tornerà ancor essa a discendere, non più però passando per la parte interiore del regolo - c.c. - ma radendone la schiena esteriore. Arrivata in -a.- premerà la parte - a b.- della leva, e la obbligherà ad abbassarsi verso le corde, finchè essa non avrà passato il punto -b. -

Passato il punto -b.-, libera essendo allora la leva, tornerà la parte -a.b.- nuovamente ad allontanarsi dalle corde, e là ove poc anzi la sua estremità -b.- era interiore rispetto alla carriolina -r.- tornerà ad esserle esteriore,
assinchè, quando risale il regolo -g.b.- possa dinuovo la
carriolina -r.- alzare il regolo -c.c. e così produrre alternativamente il tono piano nello scendere, e il forte nel

salire.

La Musica composta per questo secondo Modello, notata nella Tav. 4. Fig. 4. troverassi scritta in tono di C. sol. sa. ut. terza maggiore, accioche, volendo, possa suonarsi con tre Violini, ma secondo le dimensioni segnate nella Fig. 3., le corde sulla Porta Armonica deono accordarsi più basse di cinque toni, cioè in F. sa. ut. terza maggiore.

Ha

Ha questa Musica alcune particolarità, che stimo non doversi passare sotto silenzio. E primieramente è da notarsi, che se taluno voglia sentire il suono del solo specchio superiore, tali sono le relazioni delle sue corde, e tale l' effetto delle due linguette .i. t. - w.t. -, che sole per se medesime producono una persetta melodia. Secondariamente nel salire del regolo -g. h. - la linguetta - i.t. - suona la prima voce, la -v.t.- suona la seconda, e la linguetta -t. - la terza: nello scendere poi del medesimo regolo -g.h.-, la linguetta -v.t. che ha fatto la seconda voce nel salire, suona la prima, la linguetta -i.t.-. che ha fatto la prima, suona la seconda, -t.-la terza; e tutte tre assieme suonano così, per ogni verso, l' istessa Aria, il che difficilmente si comprende nel vedere la Macchina, se prima non si son' bene esaminate le relazioni, e proporzioni della composizione.

Mi era inoltre venuto in pensiero una Musica di diverso contrappunto, la quale susse ideata in modo tale, che
sopra due soli ordini di corde si potessero suonare quattro voci, collocando nello specchio inferiore due linguette coll'
istesso intervallo, con cui son' poste le due-i.t--v.t.nello specchio superiore: Ma confesso ingenuamente, che
per quanto io mi ci sia applicato, non mi è finora riuscito trovare un Aria di Musica sì satta, che m' appa-

ghi pienamente.

La dissicoltà grande, ch' io hò incontrata in questa nuova idea di composizione, mi sa credere, ch' ella possa essere un Problema degno di tutta l'attenzione, per coloro, che hanno studiato, per i suoi veri principi, le due no-

bili scienze della Musica, e della Martematica.

Ho bensi fatto più e diverse Arie di Musica a due, a tre, e a quattro Voci, concepite nell' idea di quella notata nella Tav. 3. Fig. 1. cioè composte semplicemente in modo retto,

& inverso, le quali potrebbero servire per disserenti Porte Armoniche: Ma non le ho unite alla presente descrizione, perchè son' persuaso, esser' facile a qualunque intendente di contrappunto, comporre simili Arie a suo talento, e in quel gusto, che stimerà opportuno, per incontrare il genio, e gradimento, di chi vorrà sar' mettere simili Macchine in esecuzione.

#### Articolo ultimo :

## PUNTO D' ATTACCATURA DEL CORDONE NELLA MURAGLIA.

A Llorchè ideai la Porta Armonica, il primo mio pensiero su quello, di ricercare, nel moto circolare, con cui si aprono, e si serrano le Bussole, la maniera di muovere perpendicolarmente i regoli - g.b. -[Tav. 2.] che dovevano colle linguette - t. t. t. t. - toccare, e sar' suonare le corde distese sopra li specchi - a. b. c. d.-

Parvemi ciò facile a prima vista, poichè, senza penfar più oltre, mi lusingavo d' ottenere il mio intento, con attaccare il cordone - s.r. q. x - alla muraglia contigua, verso la quale si apre l' uscio, e con porre la carriolina - q-- sulla Bussola, in tal distanza dal cardine, che venissero sollevati i regoli - g.b. - per tutta l' altezza - a.c. - delli specchi, mentre la carriolina - q. - nella sua progressione descriveva un arco di gradi 90.

In tale opinione feci costruire il mio Modello, colle

regole, e proporzioni spiegate nell' Art. 2.

Terminato, che su, per farne la prova, lo applicai sopra una Bussola, & attaccai l'estremità - x. - del cordone - s. r. q. x. - in quel punto della muraglia contigua, ove trovavasi la carriolina - q. - quando la Bussola era tutta aperta, cioè quando

quando il suo piano formava un angolo retto, col piano della muraglia opposta, in cui erano fissati i suoi cardini. Ma appena fattane la prova, sentii, che il tempo dell' Aria, che suonava la mia Porta, non era uguale in tutte le Battute, nè proporzionato alla progressione della Bussola.

Non mi fu difficile rinvenirne la causa, e ben tosto compresi, che un tale inconveniente procedeva dalla sproporzione, con cui crescono le subtense, o corde relativamente a' loro archi; Impercioche la parte - q x. - del cordone sempre veniva a essere la subtensa di quell' Arco, che di mano in mano andava descrivendo la carriolina - q.nella progressione della Bussola.

In effetto, avendo preso a calcolare le differenze delle corde, o subtense de' diversi archi del Quadrante, trovai appunto, che l'ineguaglianza del Tempo, o Battuta della mia Musica sulla Porta, corrispondeva esattamente

ineguaglianza delle respettive subtense.

Per rimediare adunque al disetto di questa ineguaglianza, mi posi a cercare un altro punto -x. - nella muraglia contigua, a cui, attaccando il cordone, la diseguaglianza nel moto de' regoli - g.b. - fusse minore; E per verità mi riescì trovare un tal punto nell' istessa linea, ma in qualche distanza da quello, in cui feci la prima prova. Onde mi diedi a credere, che forse non sarebbe stato impossibile, indagare mattematicamente un altro punto -x.- da cui tutte le linee, tirate all' eguali divisioni del Quadrante, crescessero in ragione degl' archi; o almeno, che il loro divario fusse così piccolo, che l' ineguaglianza del Tempo nella Musica, che ne nasce per la Porta Armonica, fusle poco, o niente sensibile all' orec-chio: mi ci applicai per qualche tempo, e comunicai ancora questo mio pensiero a parecchi bravi Professori, e MatMattematici di diverse Città, e Accademie, ma senza

ottener soluzione alcuna del mio Problema.

Diedessi in quel mentre la combinazione, ch' io credei dover far uso del mio Modello in una congiuntura molto rilevante, onde per correggerne l'imperfezione, e rettificare, senza ulterior indugio, il tempo della Musica, ideai il compenso meccanico, disegnato nella Tav. 4. Fig. 2. ove

-e.d. - è la Bandella superiore della Bussola, prolungata tanto dietro al cardine o ganghero -e. - che la lunghezza da -e. - in - d. - sia all'altezza delli Specchi della Bussola come 7, a 11. Nell'mio Modello, in cui li Specchi erano alti un Braccio, e mezzo, la lunghezza -e.d. - della Bandella dovea essere di soldi 19. di Braccio.

La Bandella da e in d. è concava per sostener meglio il cordone, e ritorta in e. ov' è armata di una carriolina, fista talmente nel concavo della Bandella, che il suo asse formi un angolo di gradi 45. coll' orizonte.

- f m.n - è un arco di Quadrante, fatto di legno, e disteso orizontalmente nel muro, dietro al ganghero, in forma tale, che possa girarvi d'intorno l'estremità ritorta - d. e radendone sempre l'esterior superficie.

-r. è un gangetto, fissato nel muro, vicino all'estre.

mità interiore dell' arco di legno - f. m. n.

Da ciò si vede, che, se si attacca il cordone al gangetto - r. - passandolo sull'arco - s.m. n. indi sulla carriolina - c. - poscia sulla piccola ruota - p. - e sermandolo sinalmente in - s - ai regoli - g.h. - quando questi sono in alto, l'estremità - d. - della Bandella, mentre si muove la Bussola, anderà or allentando, or tendendo il cordone, sull'esterior superficie dell'arco - s.m. - onde si abbasseranno, e si alzeranno respettivamente i regoli - g.b. - con un moto sempre proporzionale ai spazi percorsi dalla Bussola, e sarà per conseguenza il tempo della Musica sulla Porta Ar-

monica

monica, in ogni sua battuta; persettamente eguale.

Abbenchè con questo compenso io avessi ottenuto non solo una persettissima eguaglianza nel tempo della Musica, ma ancora una maggior vaghezza nella veduta esteriore della Porta, poichè, nascondendosi entro alla muraglia la causa motrice de regoli, la macchina recava maggior maraviglia ai spettatori, nulla dimeno non me ne appagai, a motivo, che dovea guastarsi la muraglia dietro al cardine, onde riescendo la Porta Armonica di più dissicile esecuzione, e meno adattabile alla maggior parte degli uso, veniva essa a perdere la sua semplicità, e il suo pregio

maggiore.

Ripresi perciò il primo mio pensiero, e desideroso di ritrovare matematicamente il punto . x. nella muraglia contigua, a cui attaccando il cordone, io potessi ottenere l'eguaglianza del tempo nella Musica della Porta, ne proposi il Problema, non solo all'Accademia delle Scienze in Siena, ma inoltre privatamente a parecchi Valentuomini ben'esperti nelle Matematiche, e fra altri al Signore Ferdinando Accarigi. Questo erudito Cavaliere, essendosi preso a cuore la soluzione del mio Problema, lesse ne'passati giorni all'Accademia de'Fisiocritici una dottissima Dissertazione, che fra poco egli darà alla luce, e alla quale intieramente mi rimetto, ristringendomi a soggiungere qui soltanto il Problema da me proposto, acciochè se ne sappia la questione.

#### Problema:

Sla-a.b. (Tav. 6. Fig. 1.) il labbro superiore d' una Bussola, che abbia il suo cardine in .b. -, e nell'aprissi descriva colla sua estremità - a. - l'arco del Quadrante - a. d. c -

Sia fissa nel punto - a - la carriolina - 2 - sulla qua-

le passi il cordone - a. x. f. e. g. -Sia fermato detto cordone alla Bussola nel punto -a-, e figu-

ogn' un ben vede, che, quando il punto - a. - sarà giunto in - c.-, il cordone sarà teso nella linea - a. m. c.,e il piombo - g. - sarà salito in - f. -, cioè avrà percorso lo spazio - g. f. - eguale alla linea - a. m. c. - subtensa di tutto l'arco del Quadrante. Nell'istessa maniera, quando il punto - a - sara arrivato a gradi 10. 20. 30. &c. il peso - g. - si troverà sempre salito, & aver percorso

spazi eguali alle respettive subtense di tali archi.

Or, siccome le subtense non crescono in proporzione de loro archi, ne deriva, che il peso - g. - sale assai inegualmente nello spazio - g. f. -, mentre l'estremità - a -

percorre archi eguali.

Serva di ciò per esempio, l'arco di gradi 45., il quale è bensì la metà dell'arco intiero del Quadrante, ma la subtensa del primo non è già la metà della subtensa del secondo, il che facil-

mente si dimostra:

Tirisi la subtensa del Quadrante - a. m. r. c. (Fig. 2.) Dal centro - b. - conducasi la - b. m. d. - perpendicolare alla - a. m. r. c. -. Questa dividerà in parti eguali la retta - a. m. r. c. - e l' arco - a. d. c. - (per 3. l. 3. Eucl.) Saranno parimente eguali le due rette - a. n. d. - d. o. c. [per 27. l. 3.] Ma prese assieme sono più lunghe della linea a. m. r. c. (per 20. l. 1.) Onde la subtensa - a. n. d - è più lunga della retta - a. m. - metà della subtensa del Quadrante - a. m. r. c. - La retta - a. n. d. - eccede la retta -a.m. - quanto è lo spazio intercetto da -m. - ad -r. - (per. 2.l.1.) Onde, quando il punto - a - della Bussola sarà giunto alla metà dell' arco in - d. -, il peso - g. -, in vece di essere salito alla metà dello spazio - g. f. - in - e -, si troverà avere

percorso lo spazio - g.s. - eguale alla subtensa - a. d. - o alla retta - a.r. -

E così trovandosi l'estremità - a - in qualunque al-tro punto dell'arco - a. d. c. -, il piombo - g. - sarà sempre saltro pregnatione dell'arco - g. - sarà fempre salito inegualmente nello spazio - g. f.

Chiedevo adunque Se collocando la carriolina in un diverso punto -x -[o più alto, o più bosso, o più in fuori, o più in dentro] si può ottenere, che il peso - g. - salga coll'istessa proporzione nello Spazio - g. f. - con cui l' e stremità - a - della Busola percorre l' arco del Quadrante a. d. c

E ciò non potendos, chiedevo

Ove dee collocarsi la carriolina - x.- per ottenere, che l' ineguaglianza del moto nel peso - g. - relativamente al moto dell'estremità - a - nella bussola, sia la minore possibile, e la meno percettibile a nostri sensi.

and set up firm the principality of grades on the sear following the second of the second second second



The state of the s -in the contest in tolling into - n - to any is in it of the

The same market make a mining the best and the TEN-

#### TENTATIVO FISICO-MECCANICO

SULLA RESISTENZA DE' MURI

CONTRO LA SPINTA DE' TERRENI

#### ANTONIOLORGNA

PROFESSORE DI MATEMATICA
NEL PUBBLICO COLLEGIO MILITARE DI VERONA

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

#### Cap. I.

6 1J (1) J. 611 0

Onsieur Belidor è l' Uomo solo, ch' io sappia, che vedendo valersi la pratica nella costruzione de' Muri a scarpa destinati a sostenere la spinta d' una massa di terra applicata loro a ridosso di tavole per le grossezze, non appoggiate ad esperimenti, o dedotte da solidi raziocini,

ma fatte canoniche solamente dall' uso, e dall' autorità d'alcuni celebri Architetti Militari, si pensò d'intraprenderne la risorma per una via regolare, e sicura. Coll' osservazione satta sull'indole, e sull' andamento de' terreni non sossenuti da ritegni laterali, e col benefizio d'alcune ipotesi gettò i sondamenti di sua Teoria, e l'applicò in seguito a determinare nuove grossezze da darsi a' Muri proporzionali a date pressioni di terreno, mostrando di quanto, secondo i pro-

pri ritrovati, preponderasse la resistenza d' un Muro costrutto secondo gli ordinari Canoni alla pressione d' una massa di terra addossatagli della sua medesima altezza, e quanto materiale in conseguenza venisse infruttuosamente impiegato. (Belidor Science des Ingenieurs a Paris 1709.]

Dopo tutto cio parrebbe fuor di proposito, che taluno insistendo sul piano d' un tanto Uomo volesse ripigliar in esame la stessa materia, e sar soggetto di nuova ricerca un articolo apparentemente abbastanza

discusso; ma riflettendo

I. che non è delle cose Fisiche, o delle Fisico-Geometriche, come delle Geometriche pure, le quali [ parlo delle prime ] sono suscettibili d' infinite variazioni, ed aspetti, secondo i quali variabili pure all' infinito possono essere i risultati in uno stesso soggetto;

II. Che dove si tratta di mera probabilità, come cresce il numero delle circostanze avute in considerazione, così decresce l'incertezza d'un ipotesi per sino a farsi infinitesima, e quegli più accostarsi al vero in sì fatte materie, che più minutamente va spiando gli andamenti, e le operazioni della natura, e sa servire la Geometria, e le ipotesi istesse alle osservazioni, ed agli esperimenti, ristettendo, dico, a tutto ciò, non dovrebbe parere così strano, che tenendo noi altra via assai men ipotetica, presentassimo al Pubblico dintorno alla resistenza de Muri delle formule molto diverse da quelle di Mr. Belidor

Concepisce per esempio quest' Autore un Muro, come se sosse una massa appoggiata semplicemente sulla terra, e non mette in calcolo l'attaccamento della base del Muro [ove sa nascere la ruotazione al caso di rovesciarsi) al sondamento, che diventa un sostegno

ım-

immobile, giacchè supponendo anche un rovesciamento di Muro, è da credersi senza esitanza, che il fondamento non sia per soggiacervi, essendo più naturale che nasca una separazione in qualche sezione del Muro, e segnatamente quando sia uniformemente diffusa l' energia della calce per tutte le sezioni ] nella sezion comune del Muro, e del fondamento, ch' è il ritegno immobile, a cui sta annesso, e legato il Muro. Egli assume per, supposizione solamente l' immobilità de' fondamenti, e l'indissolubilità delle parti componenti il muro; ma posto ciò anche in via di pura supposizione, non lascerà d'esser vero, non doversi trascurare l' attaccamento della base, imperciocchè posto immobile il fondamento, qualunque egli sia, indissolubili le parti del muro, ne segue manifestamente, che il Muro dovrà abbandonare il fondamento nell' atto di rovesciarsi, e precisamente colla sezione più contigua al fondamento medesimo; ma quella sezione è legata, ed agglutinata al fondamento: Dunque sia quanta esser si voglia la sua adesione, converrà superarla, e scogliere gl'infiniti attaccamenti delle particole superiori con quelle del piano inferiore, ed aggiungere la resittenza, che risulta per questo conto, a quella, ch' esercita il Muro col suo peso contro la forza premente. Siccome credo, che tali circostanze, ed altre dintorno a' terreni, ed alla loro espansione, che ho considerate, come si vedrà, possano servire d' indirizzo più sicuro, onde passare in seguito da un puro tentativo a qualche cosa di concreto, cosí non tengo di derogare al merito d' un così illustre Matematico nell' atto, ch' io procuro un qualche raffinamento ad una materia fisico-Matematica, da esso maneggiata, che n' è suscettibile abbastanza, come tutte l'altre di somigliante natura. In

In luogo di assegnar tavole generali per le grossezze de' Muri, come ha fatto Mr. Belidor, mi sono concenrato di dar delle formule; nelle quali, istituiti preventivamente i necessarj esperimenti, può ognuno al caso sostituire i rispettivi valori ritrovati alle analitiche espressioni, e determinare le convenienti dimensioni da darsi a' Muri corrispondenti alle circostanze, alla natura, densità, e coerenza de' differenti Muri, e all' indole de' terreni, che anno a sostenere: cose tutte variabili secondole differenze loro specifiche, e secondo la diversità delle combinazioni, che possono farsi in pratica, e per conseguenza non assoggettabili per esperimenti singolari a canoni generali. 

# DELLA RESISTENZA DE MURI

II. I A resistenza d' un Muro verticale eretto sopra un qualsivoglia piano immobile ad essere sconnesso, e rovesciato da qualunque potenza, dipende manisestamente dal suo peso, e dalla tenacità della calce, che tiene unite, e legate insieme le sue parti. Quanto maggiore è la densità de' materiali componenti, tutto il resto pari, e pari il tempo scorso dalla sua costruzione, tanto più validamente resiste alla disunione delle sue parti.

Tali considero essere precisamente gli elementi pro-pri, e generali della resistenza assoluta d'un Muro. Conseguentemente la variabilità in genere di consistenza non può derivare, che dalla diversa indole di questi elementi, e dalle diverse combinazioni, che se ne possono fare nella pratica. Questa variabilità potreb-

be estendersi all' infinito, quando si volesse stare sulle pure possibilità, senza discendere al concreto, e a cose di fatto; Quindi è, che pigliando l' affare così estesamente è facilissimo, che sembri a prima vista non dar egli luogo a teorie costanti, ne a canoni di sorte alcuna sopra le resistenze de' Muri: Pure, se si risletterà, che non di tutte le sorti di pietre si suole far uso in pratica, ma di alcune specie solamente, e di alcune di queste ancora il più d' ordinario; che comunemente le combinazioni, che se ne fanno in un Muro, in cui le pietre siano tutte d' una data specie, come di mattoni, le parti non sono così tra di loro eterogenee, che non possano senza errore considerarsi tutte, almeno sisicamente, e per la pratica, d'egual specifica gravità; che le differenze di energia nel glutine, per rispetto alla diversa natura delle calci, e delle sabbie, non sono così enormi, quando i Muri siano d' egual tempo, e siasi osservata uniformità nelle dosi, e temperatura, che non si possa in qualche modo dipendentemente da buoni esperimenti, avventurare un qualche calcolo sulla loro tenacità, credo certamente, che comincerà apparire assai più accessibile, e non disperato totalmente un tentativo sulla determinazione delle resistenze de' Muri. Se l' analogia non fosse un de' principali fondamenti delle no-. stre cognizioni, e non avesse luogo tra gli Uomini la filica sperimentale, che versa sopra corpi singo-lari, e le nostre osservazioni istesse, ci averebbero sinora persuasi di troppo piccol numero di cose, e non averemmo giammai potuto stabilire alcuna cosa di sistematico, ed universale su i tenomeni più ordinarj, é sugli usi più comuni della vita. Prima dunque d'entrar in materia, converrà porre alcune ipotesi.

col benefizio delle quali procedere nelle nostre ricer-

che, cioè

I. Che tutte le sezioni d' un Muro, che consista d' una sola specie di pietre, siano a un dipresso d' egual specifica gravità

II. Che la tenacità della calce sia uguale per tutte le sezioni d'un dato Muro, e ugualmente diffusa per

tutta l' area di qualunque sezione.

III. Che la sezione frangibile del Muro sia quella, ch' è più prossima al piano immobile, cioè al fondamento, su cui egli insiste

IV. Che la rottura, e separazione delle due sezioni si faccia in un istante senza distensione, e senza com-

pressione di fibre.

Da' dottissimi Signori Mariotte (du Monvem. des eaux), Leibnitz (Atti di Lips.) Varignon, (Mem. dell' Acc. de Par.], e Giacopo Bernoulli (ibid.) sono stati messi in conto alcuni stiramenti di sibre, che pongono succedere nell'atto, che si separa una sezione dall'altra, maggiori in quelle, che più distanno dal centro del moto, e minori nelle più vicine. L'ultimo pensò, che prima di staccarsi, le più vicine all'appoggio si comprimessero, e le più sontane si distendessero, sicchè vi sosse un punto di mezzo, in cui, e stiramenti, e compressioni sosse o, e da esso cominciassero dall'una, e dall'altra parte a crescere le compressioni verso l'appoggio dell'inferiori, e le distensioni delle superiori.

Ho creduto meglio in un puro tentativo teoretico di procedere colla maggiore semplicità, attenendomi alla dottrina di Galileo, di Viviani, di Grandi, ed altri, giacchè mi par sano conchiudere dalla diversità medesima delle opinioni loro, essere cosa difficile da-

re nella vera, e naturale ipotesi circa la forza di coessone dipendente da tessiture, disposizioni, e maggiori, o minori sessibilità delle particole de solidi, o de

glutini interposti.

III. Posto ciò: Sia ABCD (Fig. 3. Tav. 6.) la sezione d'un Muro verticalmente eretto; EF il piano immobile, o il fondamento, su cui insiste; CD la sezione del Muro attaccata immediate al piano EF; P una sorza applicata in A, che tenta con una direzione perpendicolare ad AD di rovesciare il Muro. Si ricerca la total resistenza di questo Muro, e il caso dell'equilibrio tra l'una, e l'altra, tale cioè, che sopravenendo alla sorza in A il minimo assegnabile incremento d'energia, il Muro si distacchi in CD (Ipet. 3.), e si rovesci.

Ritrovato il centro di gravità O [ Wolfio Elem. Meccan. prob. 27. ] nella sezione ABCD, e condotta la linea di direzione OR, il punto R alla metà di CD sossiene tutto il peso della sezione ABCD concentrato in O (Grandi Istiuz Meccan. prop. 11., e Corol. 6. della medesima]; e poiche il punto R è anche il centro di gravità della sezione CD, e nella sezione CD seguir deve la rottura (Ipot.), cadrà parimente in R l'energia totale del glutine dispersa per la sezione CD (Grandi cap. 10. supp. 1. Ibid.)

Ora non dovendo succedere la rottura del Muro ABCD longitudinalmente, ma con una ruotazione dintorno al punto D, il peso, e la coerenza, che costituiscono la sua fermezza [2.), non solamente resisteranno al rovesciamento colla loro intensità, ma in proporzione ancora delle distanze de' loro centri di attività del centro del moto D; Dunque la sua resistenza sarà manisestamente in composta ragione del momento del suo proprio peso, e del momento della coerenza; ma il momento del peso è in composta ragione di vo-

lume, di gravità specifica, e della suddetta distanza (per le cose Fisico-Meccaniche), e il momento della coerenza è in ragion composta della tenacità, con cui sta attaccata al piano immobile la sezione frangibile, e della distanza del centro di gravità della sezione istessa dall' asse di rivoluzione, secondo la dottrina di Galileo; conseguentemente sarà la resistenza del Muro ABCD in ragion composta del volume qualsivoglia ABCD, di sua gravità specifica, dell' iniziale velocità RD [Grandi prop 11. Ibid. e cor. 6. della medesima) dell' energia del glutine dispersa per CD, e ristretta in R [Grandi supp. del cap. 10.

e prop. 11. Ibid.), e della distanza RD

IV. Pongansi per tanto fatti i necessari esperimenti sulla coerenza respettiva d' una data sezione attaccata per un dato tempo ad un altra immobile mescolata colla sabbia secondo una data legge, e siccome, considerando equilibrato il momento della coerenza con quello del peso sollecitatore, staranno tra di loro la coerenza, e il peso in reciproca ragione de' vetti, fu quali agiscono l' un contro l' altra, se si farà il vette della coerenza = U, quello del peso = u, e il peso istesso = m, sarà mu: U l' espressione della coerenza assoluta; e posche ella nasce dall' attaccamento delle parti superiori colle inferiori, e la sua quantità è uguale alla somma de' prodotti d' ogni particola per la forza, con cui sta annessa alla particola sottoposta, concessa la forza per tutte le parti eguale [ Ipot. II. ], la somma di questi prodotti sarà semplicemente, come il numero delle particole connesse, o come la sezione istessa, cui questo numero è proporzionale; Conseguentemente le coerenze saranno, come le sezioni coerenti, e però detta Q la sezione, su cui

cui fosse satto l'esperimento, mu: U la sua coerenza; S'qualunque altra sezione, sarà mSu: QU l'espression generale della coerenza d'ogn' altra sezione attaccata

colle stesse leggi dell' esperimento.

V. Ciò premesso, sia l'altezza del Muro rettangolo ABCD [Fig. 3.] = p; la base CD = r; d sia l'espression generale delle densità: sostituendo in luogo di S nella formula mSu: QU [4.] la quantità r, sarà per le co-se dette (3.4.) la sua resistenza al rovesciamento =

pr. d. mur: UQ. r<sup>2</sup>: 4 = dmpr<sup>4</sup>u: 4UQ; e poichè il momento della forza, secondo il quale manisestamente agisce il peso P, è parimente in composta ragione di sua intensità, e della sua iniziale velocità, satta l' intensità della forza in A = P, sarà il suo momento = Pp, e però dovrà essere per l'equilibrio

dmpr<sup>4</sup>u: 4QU = Pp; Il che si domand. La grossezza dunque conveniente da darsi al Muro

per tale effetto sarà r = 1/4 PpQU: dmpu
VI. Se ADC fosse un Muro triangolare [Fig. 4.] rettangolo in D, tirata alla metà di AD in F dal vertice dell' angolo ACD la retta CF, e presa CM = - 2/3 CF, sarà nel punto M il centro di gravità (Grandi Coroll. 4. prop. 9. Ibid.) della sezione ADC. Condotta la linea di direzione MB sarà

CM: CF = CB: CD = 2:3, e però lasciando le analitiche denominazioni del num. preced. alle rispettive grandezze, sarà la resistenza della sezione ADC = dmpr4u: 6QU, e per l'equilibrio dmpr4u: 6QU

 $\equiv P_{\rm P}$ .

VII. Sarà dunque la resistenza al rovesciamento d' un Muro rettangolo a quella d' un triangolare sulla stessa base, e colla medesima altezza, come

 $\frac{\text{dmpr}^4 u: \text{dmpr}^4 u}{60U} = 6QU: 4QU = 6:4$ 

Conseguentemente volendo, che sotto una medesima altezza pi le resistenze loro siano eguali; non si avrà, che porre y in luogo di r nell' espressione della resistenza del Muro triangolare, e mettendo le due espressioni in equilibrio, e dividendo i membri per dmpu, sarà y4=

3r4, e però dovrà essere la base del triangolare

y= 4y3r4; Quindi si vede, che ottenendo una medesima resistenza al rovesciamento, si risparmia con un Muro a scarpa una buona parte di materiali, che dovrebbero impiegarsi in un Muro ret-

tangolo equalmente resistente.

VIII. Considerate le resistenze partitamente delle sezioni triangolari, e delle sezioni rettangolari, con egual facilità si potrà estendere il calcolo anche sulle sezioni miste, che cadono il più d'ordinario in uso nell' Architettura, qualor si tratta di sostenere delle masse di terra, e comunemente diconsi Muri a scarpa, i quali, come ognun sa, sono composti d'un Muro rettangolo, e d'un triangolare, insieme connessi, colla base del triangolare in qualche ragione dell'altezza comune di tutti due.

IX. Sia perciò ABDEC [Figura 5:] una sezione mista qualunque, di cui si cerca la resistenza, e l'equilibrio colla potenza in B; fatta generalmente la ragione di DE ad EB, oppure la base ED = p:q, si lascino agli altri elementi, come abbiamo satto di sopra, le stesse

analitiche espressioni ciascuna a ciascuno, e condotte dal centro di gravità O [ Wolf. Elem. Mech. Troblem. 27.) della sezione ABCE, e dal centro di gravità F ( Grandi Coroll. 4. prop. 9. Ibid.) della sezione BED, le linee di direzione OQ, FS, e la retta OF, sarà

CD= r†p:q; QS=; r†p:3q, e poiche nella retta QS dec ritrovarsi il punto R gravato dal comun centro di gravità de' centri O, F [Grandi prop. 11., e il Coroll. 6. della medesima Ibid.), Se s' instituirà la seguente analogia, come la somma delle sezioni [ poste eguali le densità] BED†ACEB: ACEB=QS: RS, si avrà sostituendo i respettivi valori analitici

RS= 3pq<sup>2</sup> r <sup>2</sup>† 2p<sup>2</sup> qr : 3p<sup>2</sup>q † 6pq<sup>2</sup>r ( Meccanica ) ; e però RD= all' iniziale velocità del punto R, o della somma delle sezioni BED, ACEB ristrette in R ( Gran-

di Ibidem) = 3pq<sup>2</sup>r<sup>2</sup> † 2p<sup>2</sup>qr: 3p<sup>2</sup>q†6pq<sup>2</sup>r † p:q =B; e sostituendo nell'espressione delle coerenze mSu: QU alla quantità S, la grandezza r†p:q= CD, sarà la resistenza della sezione mista ABDEC

= dpr †dp² muq²r² † 2mupqr †mup³ = Pp per 1; 2q ·B. 2q;QU equilibrio (M).

DELL' ESPANSIONE, E DELLA SPINTA DE TERRENI.

### Cap. III.

X. IN una massa di terra sensibilmente omogenea; escavata di fresco, e messa in cumulo di qual si vo-

voglia figura su d' un piano Orizzontale, immobile, e lasciata libera a se stessa senza alcun ritegno latera-

le, si osserva

I. Che i primi strati esteriori, quanto è maggiore l' angolo d'inclinazione, che fanno coll' Orizzonte, tanto più velocemente scorrono al piano, che sostenta la massa, e di mano in mano men velocemente gli strati susseguenti a misura, che decresce l' angolo d'inclinazione; per ciò manifestamente, che quanto più crescono le inclinazioni, una maggior porzione della forza assoluta di gravità vien corrispondentemente sostenuta da' piani inclinati, sopra de' quali vanno insistendo successivamente gli strati di terra, e per conseguenza crescendo gli attriti nel discendere, posta anche, se si vuole, uniforme, e costante in qualsivoglia inclinazione la tenacità loro, i conati de' residui di forza per scorrere lungo il piano si fanno sempre più languidi.

II. Che finalmente una buona parte della massa resta tuttavia in cumulo, ma quieta, e composta per ogni parte in piani inclinati, o in iscarpa, tale, che metta chiaramente in stato d'equilibrio la gravità per

il piano inclinato colle suddette resistenze.

XI. Un osservazione così ovvia, e comune sull' andamento delle terre in cumulo non sostenute da ritegni, ci fa strada da per se sola a concepire agevolmente l' indole, e l'energia di queste terre medesime, quando fossero sostenute. Imperciochè se una di queste masse di terra lasciata libera alla sua propria forza di gravità, lontana dal mantenersi nel primo cumulo, con una parte si rovescia sul piano Orizzontale, che la sostenta, componendosi coll' altra, che resta, in un nuovo cumulo secondo certa legge, ognún vede, che se si concepisse ritenuta in qualsivoglia maniera questa massa in tutt' altro cumulo da quello, in cui essa affetta naturalmente di comporsi, e ch' è il solo, che metta in stato di quiete le sue parti, tutta quella quantità, che dovrebbe cedere alla gravità, farà forza premendo i ritegni, e ad ogni istante ripeterà le sue pressioni, onde torsi dinanzi l'ostacolo, che impedisce la sua caduta. Se si potesse dunque determinare la quantità di terra, che discende portata dalla forza di gravità, e in conseguenza la qualità dell'inclinazione, che affetta quella parte, che resta cumulata, secondo le varie altezze de' cumuli, e le diversità delle terre, non sarebbe difficile conoscere la quantità della pressione, ch' essa eserciterebbe contro un ostacolo, che ritenesse la sua discesa.

Siccome non ho veduto altra via, onde arrivare ad una tale cognizione, che quella dell' esperienza, così ho cercato di far saggio per questo fine sopra diverse qualità di terre, limitandomi per altro a cumuli d'una sigura regolare, e perchè analoghi a quelli, che vengono sostenuti dai Muri negli argini, e nelle controscarpe di sortificazione, è perchè più addattati a sarvi sopra minutamente le necessare osservazioni.

I. esperimento. Ho satta costruire una cassetta di legno cubica ADCg [Fig. 6] di 2 piedi Veneti di lato interiore aperta in ACBD, e col lato ge bd sottilissimo, e mobile dintorno all' asse ge col mezzo di
due pernetti, o,m lisci, e così facili al moto, che
ad ogni minimo impulso rendessero versatile il piano
medesimo gebd. Messa sopra d' un piano immobile col lato FEeg parallelo all' Orizzonte, e colla sezione ge coincidente coll' orlo d' una tavola alta dal
pavimento, perchè le terre non s' impedissero scam-

bie-

bievolmente nel rovesciarsi, l' ho riempiuta sino all' altezza B a vicenda,

I. di diverse qualità di terre fresche, tratte dai campi in

qualche profondità, ma prima stritolate,

II. di simili terre seccate al Sole.

III. di terre sabbionose,

IV. di sabbie schiette, minerali, sluviatili, e marine, tenendo prima chiuso il lato geBD con un filo di seta, quindi recidendo ad un tratto il filo lasciavo cadere il piano gebd, ed ho osservato, che le prime terre cadevano con diverse velocità tra di loro, ma tutte finalmente, con insensibili disserenze l' una dall' altra, si componevano colla porzione, che rimaneva nella cassetta in piani inclinati tali, che se AFgB rappresentasse una sezione della massa, presa AQ= ad un pollice, e tirata Qg, QgB era la quantità, che cadeva, e QgFA la porzione, che restava nella cassetta, disposta nel piano inclinato Qg.

Colla seconda qualità di terre cominciò esser minore la quantità AQ d' un pollice, e continuò sempre più colla terza; finalmente colle sabbie, coincidendo sensibilmente il punto Q col punto A al vertice dell' angolo retto BAF, svanì la grandezza AQ, e la scarpa Ag del terreno saceva un angolo semiretto coll' Orizzonte: colle minerali per altro non cosi esatta-

mente, come colle fluviatili, e colle marine.

XII. Siccome le sabbie erano prontissime a discendere, e mettersi all' angolo d'inclinazione AgF, mi passò per l' animo, che se non avessero avuto l' ostacolo del lato immobile ACEF, sarebbe forse caduta una maggior quantità di terra, e l' angolo d'inclinazione sarebbe stato minore d' un semiretto. Volendomene accertare pensai, che bastava diminuire l'altezza del ter-

reno

reno nella stessa cassetta; perchè così se la terra, che dovea rimanere, avesse affettata una maggiore inclinazione di quel, che sosse un angolo semiretto, per mettersi in quiete; avrebbe avuto campo di farlo.

II. Esperimento: Posto dunque il terreno all' altezza HN

[ Fig. 7. ] =  $\frac{2}{3}$  MN, nella sezione MNOP simile, ed eguale alla sezione AFgB [ Fig. 6. ], e abbassato con simil legge il lato gode nella cassetta, perchè nel cadere trovasse la terra minor resistenza, per la I., e II. qualità di terre non vi fu sensibile differenza dal primo esperimento fatto col terreno all' altezza MN = AF; ma per la III., e IV. qualità di terre, tirata Al parallela ad NP, e presa IG alcune linee maggiore di IP, e IR quasi un pollice maggiore della stessa IP, e condotte GP, RP, la terza qualità, dopo caduta la quantità GPI, col rimanente GPNH, si compose nel piano inclinato GP, e le sabbie, qual più, qual meno si disposero nella scarpa RP, caduta la quantità RPI. Posto il terreno all' altezza  $SN = \frac{1}{2} MN$ , e finalmente all' altezza XN = - MN, ritrovai a un dipresso, seguire i terreni nella discesa la stessa legge osservata coll' altezza HN. XIII. Da questi esperimenti possiamo ricavare, che alcuni terrent si compongono, qualunque sia la loro altezza ad un angolo d' inclinazione maggiore d' un semiretto, altri ad un angolo minore d' un semiretto, ma l'eccesso dell'angolo d'inclinazione de' primi sopra il semiretto essere maggiore dell' stesso semiretto sopra l'angolo d'inclinazione de's secondi. Tali eccessi per altro averebbero probabilmente assai men differito tra di loro, se la resistenza prodotta dall' atattrito delle particole più prossime alle pareti della cassetta colle pareti medesime, non avesse in gran parte contribuito a sospendere, e per gli uni, e per gli altri terreni la caduta di qualche altro strato, non abbassanza atto colla sua gravità a superarla. Quindi è che volendo prendere una media inclinazione, da attribuirsi ad un terreno medio tra tutti i terreni, su quali sono caduti gli esperimenti oltrescritti non ho dissicoltà d'assumere un angolo semiretto per l'angolo d'inclinazione medio fra gli angoli satti collorizzonte dalle diverse riferite qualità di terre, e conseguentemente per medio piano inclinato il piano Ag [Fig. 6.]

XIV. Or giacche sapiamo la quantità di terra, che cade da una massa messa in cumulo senza sostegni laterali, e la qualità dell' inclinazione coll' orizzonte, che assetta quella porzione di terra, che resta cumulata, possiamo farci agevolmente a determinare la quantità dell' impulsione, ch' essa esercitarebbe, quando sosse sostenza, contro gli ostacoli, che impedis-

sero la sua caduta.

XV. Sia pertanto ABCD (Fig. 8.) la sezione d'una massa di terra coll'altezza BD= AC perpendicolare all'orizzonte, sostenuta da qualsivoglia obice BDEF in BD, e non sostenuta in AC; E' manisesto per le cose dette [13.], che presa AG= AC, e tirata GC, la porzione AGC cadrà tutta, e il rimanente si comporrà nel piano inclinato GC. Così presa dall'altra parte BH= BD, e tirata HD, succederebbe lo stesso della quantità HBD, se non sosse sostenuta egualmente per tutta l'altezza BD; e poichè la quantità DHGC è quieta, e indisferente tanto per una parte, che per l'altra, resta a calcolarsi contro

contro il sostegno BD lo sforzo solo, che sa la grandezza HDB da esso sostenta. Ma siccome tanto è per la sezione HDB, che la quantità DHGC sia della sua stessa natura, quanto di qualsivoglia altra materia, la retta DH diventa manisestamente un piano inclinato immobile, che sostenta una parte dell'azione di gravità esercitata da HDB. Dunque non tutta l'assoluta pressione di questa quantità s' impiega contro il sostegno EFDB. Per determinare la precisa grandezza, si ritrovi il centro di gravità m nella sezione HDB [Fig. 9.], e si tiri mn perpendicolare all'orizzonte CF; ella sarà la linea di direzione

del centro di gravità ritrovato.

Presa mo per la forza assoluta, e tirata mp perpendicolare ad HD, la forza mo sarà risolta nelle due laterali pm, po, una delle quali pm sarà diretta ad agire contro il piano inclinato HD, e l' altra po contro il sossegno BDFE. Si compisca il parallelogrammo pmeo dintorno alla diagonale mo, e sui lati pm, me = po, si descrivano su i diametri pm, me i semicerchi pam, mce. Si tiri bq perpendicolare in m alla diagonale mo; Ella taglierà ne' punti qualunque a, c, le semiperiserie pam, mce; Dai punti p, ed e, si conducano ai punti d'intersezione a, c le rette pa, ec, che saranno normali ad ac, e tra di loro parallele; Si considerino in stato assoluto le due sorze laterali pm, me, elleno saranno risolte ciascuna in due altre laterali pa am, mc ce; ma mp: po = HB: BD(costruz.), e HB= BD (13.): dunque mp= me = po. Si congiungano i punti p, e colla retta pe, sarà l'angolo mep= mpe= ad un semiretto, e poichè l'angolo pec= ape è retto, sarà parimente semiretto l'angolo mec= mpa; conseguente-

mente am mc, ap ce. Le due forze dunque laterali am, mc sono contrarie, ed eguali, e perciò impiegate totalmente a controagirsi scambievolmente, e tenersi in equilibrio tra di loro; Per conseguenza la forza ap, ch' è una delle due cospiranti ap, ce agirà contro il piano inclina o HD, e l'altra ce contro il sostegno BDFE; ma ap ce, e ap te mi tio mo alla forza assoluta del terreno HDB; Dunque la pression laterale contro il sostegno BDFE per quanto riguarda la sua grandezza, non è più della metà della pressione assoluta di di tutta la massa.

Or giacche il centro di gravità della sezione HDB essercita metà della propria assoluta azione contro il piano inclinato HD, e metà contro l'ostacolo, che impedisce la sua caduta, come la retta mp perpendicolare al piano HD (Fig. 9.) esprime la direzione, secondo la quale egli agisce contro di questo piano, così la direzione sua contro il sostegno BDFE sarà secondo la retta

mq normale a BD.

Posto ciò non sarà difficile determinare il momento di questa azion parziale del centro di gravità contro lo stesso sossemple delle contro lo stesso sossemple delle sorze prementi dalla grandezza della perpendicolare dall'appoggio alla direzione, per cui premono, ed essendo le pressioni assolute, come le sorze prementi assolute, o come i pesi assoluti prementi, sarà questo momento a mezzo il peso assoluto della sezione HDB moltiplicato per qD= 2BD [ Grandi Coroll.

IV. prop. IX. Ibid. ]

XVI. Conviene avvertire, che, come si è veduto, non ho ripetuto la spinta de terreni, che dalla pura forza di gravità, ed ho satta astrazione da qualunque accesso di energia, che sopravenir soro potesse, per qualche straniera cagione; e di satto questa è la causa

naturale, e costante della loro espansione, come l'elasticità, ed il peso insieme lo sono della dilatabilità dell'aria.

L' espansione per altro, che affettano i terreni, allorchè sono imbevuti d'acqua, con tutto che dipenda da cause avventizie, e accidentali, non credo, che sia assolutamente da trascurarsi, e da farsene senza errore sensibile l'astrazione, che si fa di tanti altri minuti accidenti. Essendo le parti dell' acqua sottilissime, e insinuandosi per conseguenza facilmento no pori delle particole di terra, accresce il loro peso, rimove le minime particelle una dall' altra, e con for-2a enorme gonfiandole, fa, che si dilatino, e rispingano ciò, che si oppone alle loro dilatazioni . Non abbiamo elperimenti, col fondamento de'quali poter determinare i limiti di questa forza, e la legge, con cui agisce, diversa sempre, secondo la diversa quantità d'acqua, la qualità diversa de' terreni, e cent' altre circostanze. Un altra: L' acqua certamente accresce il terreno di peso, e la dilata, ma facendosi strada tra i contatti delle particole, le rende anche più tenaci, facendo le veci di glutine interposto, e ciò in senso contrario alla gravità. Chi sa quanto debba detrarsi per conto di questa tenacità? La cola certo non ammette geometriche determinazioni, e finchè la fisica sperimentale non ci fornisca di materiali, non potrà mai sperarsi su questo punto alcuna cosa di concreto; e starà sempre al giudizio del pratico di dar qualche aumento alla resistenza per questo conto, secondo che crederà meglio addattarsi al caso, e alla qualità delle terre.

XVII. Pervenuti a stabilire nel capitolo precedente la

quantità delle resissenze de' Muri a scarpa, e nel capitolo presente il momento della spinta de' terreni, resta che in luogo d' una potenza in genere, sollecitante i Muri, ci facciamo a sostituire una massa di terra cumulata, e appoggiata loro a ridosfo secondo tutta la loro altezza, e viceversa in luogo d'un sostegno in genere per la spinta de terreni surrogare un Muro, cercando il caso dell' equilibrio tra di loro, e il modo in seguito di dar le convenienti dimensioni alle basi de' Muri rettangolari, ne' Muri misti destinati a sostener terreni, che non eccedono la loro altezza.

Sia dunque ACFG (Fig. 10) una massa di terra applicata al Muro a scarpa ACEDB, che la dee sostenere. Presa AH AC, si conduca HC; si faccia la gravità specifica del terreno = g, e giacche AC è altezza eomune del terreno, e del Muro, ella sarà = p [ 5. ]; conseguentemente il peso assoluto di HCA = p2g: 2, e il momento dell' azione esercitata dalla metà di p 2g: 2 contro il Muro ACDB = p3g:6(14.] Richiamando perciò l' equazione M (9.), e sostituendo nel secondo membro a Pp la quantità p3g:6, manifestamente il Muro ACDB sarà atto a sostenere la spinta del terreno HCA, allorchè la sua resistenza

 $= \frac{dpr + dp^2}{2q} \cdot B \cdot \frac{muq_2r^2 + 2mupqr + mup^2}{2q^2QU} = p^3g : 6$ 

XVIII. Determinata ad arbitrio, o secondo le circostanze la misura ED della scarpa BD, per esempio 1 3 1 8c. dell' altezza AC per ritrovare la base CE, o per dir meglio la grossezza, che dee darsi, secondo l'atiunta scarpa, al Muro ACEB, non si ha, che maneggiando la formula colle debite maniere, e sostituzioni cercar il valore della quantità r considerata incognita, il quale assegnato alla grossezza del Muro rettangolo, si verrà con tutta la quantità ACEDB, così definita ad equilibrarsi colla spinta del terreno HCA.

XIX. Siccome ordinariamente vengono gettate le terre a ridosso de' Muri di mano in mano, che si va alzando il lavoro al caso di far gli esperimenti sulla coerenza della calce [Cap. II. 4.), converrà instituirli sopra un Muro costruito di fresco, quindi cercare la sua resistenza, la quale potendo crescere per parte della tenacità, in qualchè ragione del tempo scorso dalla sua costruzione (3.), se vi sosse differenza di tempi, doverebbe aver luogo un nuovo elemento nella sua espressione per questo conto (4.) e conseguentemente nelle formule delle resistenze totali, giacche potrebbe divenirne enorme il valore, quando si facesse l'esperienza sopra un antico Muro.



#### ISTORIA MEDICA

CONCERNENTE LA DESCRIZIONE

DI UNA MALATTIA TERMINATA NELLA MORTE

COLLA SEZIONE DEL CADAVERE

## DEL SIG. FERDINANDO MANNOTTI

DOTTORE IN MEDICINA



Ndrea Arrighi uno dei Membri di noftra Accademia nacque in Siena il dì 8. Luglio dell' anno 1692, e forti dalla Natura una grande, e ben proporzionata struttura di corpo, una delicata costituzione di sibra molto sensibile, ed ellastica, e troppo facile ad irritarsi, un temperamen-

to sanguigno tendente al colerico, ed una vivacità di spirito così penetrante, che sin dal primo siore della età sua, gustate appena le umane Lettere, si applicò subito ai Filosofici Studi, e a quelle discipline spezialmente, che condurre lo potevano alla Medicina, Facoltà di tutte le altre a lui più gradita, la quale avveduta-

mente pensò di scegliere per sua professione.

Furono infatti sì grandi, e sì fortunati i progressi, ch' egli vi sece, che giunse in breve tempo a conciliarsi la stima non solamente di tutti i suoi Cittadini, ma di molti stranieri Personaggi ancora e per nascita, e per dottrina ragguardevoli, ed occupò nella sua Patria fra quanti allora vi erano accreditati Medici il primo possibi di riputazione accordatogli dall' ammirazione uni-

versale, e dall' unanime consenso di tutti.

Fu inoltre destinato a professare publicamente l' Anatomia nella nostra Università, e quetto impiego su da Lui eseguito con tale studio, e diligenza, che unito alle tante satiche derivanti dall' assluenza degl' Insermi, che alla cura di Lui si assidavano, lo sece spesse volte cadere in quelle malattie, che sono samigliari per l' ordinario agli studiosi.

Fu Egli soggetto ancora a fieri attacchi di atrocissima gotta, a frequenti dolori nesritici prodotti da renelle, e da calcoli, e a un dolore di testa quasi continuo accompagnato da un certo molesto senso di freddo, per cui era Egli solito coprirsi il capo con dei berretti a

più doppi.

Nulladimeno esercitò Egli sempre la sua prosessione sino al cinquantesimo anno della sua vita, nel qual tempo su attaccato in tutti i muscoli destinati ai moti, che diconsi volontari, da convulsioni così crudeli, e così ostinate, che lo costrinsero ad abbandonare quasi assiotto le sue incumbenze, e darsi tutto alla cura della propria infermità, di cui tentò, ma sempre invano, la guarigione non solamente con quanto mai potevagli suggerire la medicina, ma con tutti quei falsi rimedi ancora, che ò per segreti si spacciano dagl' impostori, ò sono accreditati dalla voce comune del volgo: Tanto è vero, che l'amor della vita, e della sanità alle Persone ancor le più illuminate rende pregevoli quelle cose medesime, che surono per lo innanzi l'oggetto della lor derisione.

In questa guisa da un rimedio passando all' altro si medicò Egli per due anni continui, dopo il qual tempo non solo vide deluse affatto le speranze di sua

guarigione, ma fu ancora dalle solite convulsioni mal-trattato talmente, che dovette ritirarsi in sua casa per passarvi il resto de' giorni suoi nello stato infelicissimo di una totale inazione, sempre agitato, e commosso in tutte quelle parti del Corpo, il moto delle quali dall' arbitrio dipende della volontà, e perciò incapace a ser-virsi e di mani, e di piedi, inabile a leggere, a masticare, a parlare, tormentato da gagliardissimi scuotimenti, e da dolori atrocissimi.

Nè con tuttociò su Egli giammai esente dai so-praccennati incomodi del dolore di testa, de' calcoli, della gotta, e delle renelle, ai quali si accrebbero ancora di tanto in tanto delle febbri inflammatorie, e suppuratorie, delle marce apparse talora nelle orine, e certi slemmoni nella faccia, che ogni due, o tre mesi periodicamente apparivano, e terminavano per l' ordinario in una crosta tartarosa, e giallastra, di cui l'

Infermo a poco a poco spogliavasi.

Dalle descritte malattie, che misero piu volte in dubbio la di Lui vita, si liberò Egli col mezzo delle opportune missioni di sangue, delle bevande refrigeranti, e subacide, e coll' uso frequente della China Chi-

na.

Del rimanente poiche non godeva Egli il vantag-gio della masticazione, si nutriva soltanto di abbondanti zuppe, di erbaggi cotti, di paste fine, e leggie-re, del grasso delle carni degli animali, di battuti, di cervelli, e di somiglianti altre cose.

La bevanda poi consisteva in vino puro ben generoso, di cui Egli volentieri saceva uso senza risparmio, che che ne sentissero in contrario alcuni Medici, i quali persuasi, che l'uso soverchio del vino pregiu-

dicasse

dicasse di troppo a' di Lui nervi, come in alcuni alle volte suole accadere, con assidue istanze tutto di lo stancavano, acciò ne usasse più moderatamente; ma Egli animato sempre piu dalla propria natura, che con un soave ristoro ce lo invitava, e assicurato dalla ragione, che il vino potesse sovra d' ogni altro rimedio sossenere il di Lui corpo soverchiamente illanguidito, e per la sua tendenza alla putredine quasi vicino a disfarsi, non solo non lo abbandonò, ma derise anzi sempre tutti quelli, che gl' inculcavano l' astenersene.

Quantunque io non prenda adesso l' impegno di sostenere la opinione di Lui sù tale articolo, posso pertanto convinto dalla esperienza affermare, ch' Egli dall' uso abbondante del vino, oltre di che non soffriva nè peggiori, nè piu contumaci le convulsioni, traeva per l'ordinario il vantaggio di addormentarsi, e diminuire 2 se stesso l'ore nojose de suoi tormenti.

Gli esercizi di Lui non consistevano in altro, che nel farsi portare spesso di peso dal letto in una seg-giola da riposo, e dalla seggiola alcune ore dopo nel letto, passando a vicenda da questo a quella piu volte

il giorno.

In così strana guisa essendo Egli arrivato sino all' Ottobre dell' Anno 1760, su in questo tempo sorpre-so da non leggiere sebbri, dalle quali però senza l'ajuto di alcun rimedio in pochi giorni fu libero, ma verso la metà del Novembre dello stesso Anno comparvegli una piccola piaga nelle parti, che posano sull' osso sacro, la quale dopo essere stata coll' uso dell' Impiastro di vino per qualche tempo trattenuta, divenne poi di un indole piu maligna, e più contumace, nè pun-to cedendo ai piu efficaci rimedi cominciò a dilatarsi

all' intorno di tal maniera, che se da principio aveva appena di diametro un solo dito trasverso, giunse

ad averne quasi intiere sei dita.

Dalla fin qui descritta Piaga divoratrice, e dalle gagliardissime febbri suppuratorie, che nel Gennajo del seguente anno 1761. gli sopragiunsero, su costretto a fermarsi nel letto senza la speranza di più risorgerne; e allora fu, che io, a cui era stato da Lui medesimo commesso l'incarico di assisterlo in questa sua malattia, persuaso essendo della estrema importanza, in cui erasi, di frenare sollecitamente il vigore di quelle febbri accompagnate da fierissime convulsioni, da rigori di freddo molto sensibili, e da fetentissime marce, che in gran copia apparivano nelle orine, tornai a prescrivere all' Infermo l' uso più frequente, e più abbondante della China China da me piu volte, come di sopra abbiamo detto, adoperata con ottimo successo; Onde feci sì, che Egli prendesle in ciascun giorno una mezza libbra di decozione di China China coll' aggiunta di una dramma di Magistero della stessa corteccia.

Fu tale il vantaggio, che Egli ne trasse, che ottenne con sì fatto metodo di far argine almeno per allora all' impeto di quelle febbri, le quali però ripreso avendo dopo alcune sertimane la forza primiera, condussero l' Infermo ad una morte irreparabile, la quale accadde il dì 27 di Marzo dello stesso Anno in giorno di Venerdí alle ore tre della sera, dopo aver dati molti evidentissimi segni, fra i quali il piu notabile su uno scioglimento di corpo sopragiuntoli alcuni giorni avanti la morte, e da Lui stesso prognosticato sulle osservazioni, che avea fatte in coloro, che crano stati attaccati

da somigliante infermità.

Un male così stravagante, ed ostinato mosse nei Domestici del Desunto una giusta curiosità d'informarsi della cagione di esso per mezzo del taglio del Cadavere: quindi alle ore cinque della sera del dì 28. Marzo ne su satta dal Sig. Angelo Mancini Professore di Chirurgia la sezione, alla quale io sui presente insieme col Sig. Dottore Angelo Lodoli, e con molti altri.

Si videro pertanto nel basso ventre, che su il primo ad aprirsi, i visceri, che vi sono contenuti, in uno stato quasi simile al naturale, e subricati da una copiosa quantità di pinguedine (1)

Nella vessica urmaria si osservarono internamente delle Ulceri, da cui gemeva una materia marciosa non differente da quella, che piu volte si era nelle orine

osservata.

Nel destro dei Reni del sinistro alquanto maggiore, il di cui uretere videsi notabilmente dilatato, si ritrovarono alquanti calcoli di diversa grandezza, simili nella sigura, nel colore, e nella levigatezza ad una ghianda gia maturata; erano questi non gia friabili, come per lo piu sogliono essere, ma bensì di una straordinaria durezza.

La Vessica del fiele nera al difuori conteneva una materia sluida simile appunto all' inchiostro.

In

(1) Si ritrovò in molta copia la detta pinguedine nell' Omento, in tutto il tratto del Mesenterio, e del Mesocolon, nelle Appendici Epiploiche, e nella Cellulare dei Reni; nella cellulare poi dei Tegumenti, benchè così coà piosa non sosse la stessa pinguedine, tanta nondimeno ne ritrovammo, che non era invero proporzionata all'apparente magrezza esteriore di quel Cadavere. In questo ventre altro non restò da notare fuori che un certo incurvamento della spina al didentro nel-

le vertebre spezialmente dei Lombi.

Passammo quindi al Torace: Separati i Tegumenti, elevato lo sterno, ed incisi i muscoli intercostali, su da notarsi nel rompere delle Coste la loro eccessiva fragilità, indi ci ponemmo ad esaminare attentamente il Cuore: Era questo ricoperto in gran parte nella sua basse dalla solita lubricante sostanza adiposa, che di sopra abbiamo detto essersi in copia ritrovata nel basso ventre; la figura, la grandezza, e la situazione del Cuore erano nello stato loro naturale; La sola destra orecchietta era senza fallo il doppio del suo volume naturale ingrandita, la quale aperta di niun' altra cosa, suori che di ssuido, e nero sangue si vide ripiena.

Nel Polmone non su difficile il ritrovare la prossima cagione della morte; impercioche ambidue i Lobi di esso erano nella parte posteriore, che riguarda il dorso, attaccati alla Pleura, lividi, e cancrenati.

Ma giunti essendo alla Testa, qui su, dove incontrammo qualche cosa di raro, la quale meritò per mio avviso di essere notata con diligenza: segato il Cranio all' intorno nei luoghi consueti, tentammo di alzarlo con lo scalpello, ma quello non obbedì subito ai nostri tentativi, poiche era alla dura madre tenacemente attaccato (2). Prendemmo adunque il partito d' incide-

rc

(2) La dura Madre molti fra gli Anatomici hanno giudicato essere allora nello stato suo naturale, quando ritrovasi appesa alla Volta in-

terna del Cranio foltanto nelle future, e in ogni altra parte di esso libera, e pendente: molti altri hanno creduto il contrario, assermando,

che

re dalla parte davanti, e dalle parti laterali ancora colla maggior diligenza possibile la dura madre, ed ottenemmo allora l' intento di alzare il Cranio insieme con quella porzione di dura madre, che vi era attaccata: allora il Sig Chirurgo introducendo tra la dura madre, e il Cervello una mano verso l' Occipite col disegno

che questa membrana sta naturalmente attaccata a tutta la Volta suddetta, benchè nelle suture piu tenacemente, che altrove.

Tra i Fautori della prima. opinione avvi Fabricio Hildano, il quale [a] dopo aver descritto la dura madre attaccata alle suture del cranio. e in ogni altro luogo libera, e pendente, stabilisce essere questa la condizione naturale della medefima per alcune ragioni più confacenti al suo sittema, che vere, e poi riporta la storia di due dissezioni Anatomiche, nelle quali confeila di avere osservato la dura madre talmente atraccata a tutto il Cranio, che non fu possibile il separatla; onde io non so intendere come un Medico così dotto, ed illuttre, qual era Fabricio Hildano, in vece di acquietarsi

alla prima nel suo sistema, non dubitasse piutosto sul sondamento sicuro delle sue proprie osservazioni, se sosse, o non sosse naturale la coesione suddetta.

Pare, che Ambrogio Pareo convenga coll' Hildano, allorche parlando della dura madre dice, [6] che l' uso di questa membrana è di fasciare tutto il cervello, e difenderlo ne' suoi movimenti dai danni, a cui soggiacerebbe urtando nella Volta interna del Cranio.

Merita inoltre di effer letta l' Anatomia Chirurgica d'
J. Palfin [c], dove l' Autore
conferma l' aderenza fuddetta, dimostra quanti e fra gli
antichi, e fra i moderni l'
hanno creduta, e la credono,
e riporta fra gli altri le offervazioni di Roonhuyse celebre Chirurgo Olandese, il
quale

<sup>[</sup>a] Observat. Chirurg. Cent. I. Observat. VII. pag. 18.
[b] De Corp. Hum. Anatome Lib. IV. Cap. V. pag 94.
[c] Tom II. Part. VI. Cap. III p. 344. e seg.

disegno di cavare il Cervello fuori della testa, sentì in uno de' suoi diti un dolor pungitivo prodotto da un corpo duro, ed acuto, che la sua mano incontrò nell' inoltrarsi; avendo Egli subito ritirata la mano, ci avvertì di quanto gli era avvenuto, e procurò intanto di estrarre

quale nella operazione del Trapano appunto pretende, che non debba usarsi il Menyngophylax per deprimere la dura madre, poiche in questa maniera altro non si fa, che distaccarla dal Cranio, al quale ella è naturalmente attaccata.

Leggafi ancora intorno a questo Articolo la nota di Alberto Haller alla parola Vibratio nelle Prelezioni accad. di Herm: Boerah. [d] dove Egli dopo avere esposto le molte. diverse opinioni di coloro, che male a proposito attribuiscono alla dura madre un qualche moto, e la suppongono in confeguenza disgiunta, e separata dagli ossi del Cranio, le prende a confutare e dichiarandosi fautore della seconda opinione sostiene, esfere naturale l'aderenza della dura madre a tutta l' interna volta del Cranio.

E il celebre Wislow parlando della dura madre [e] non solo conferma l'aderenza di essa a tutta la superficie interna del Cranio, ma afserisce ancora, che questa aderenza è assai piu forte nella gioventù, che nelle persone avanzate in età; ma questa asserzione di Lui non sempre verificasi, come in fatti non si verifica nel caso nostro, dove osservammo una strettissima, e fortissimà aderenza della dura madre a tutta la cavità del Cranio in un vecchio di già settuagenario, qual era il Dottore Andrea Arrighi, allorche giunse al termine della vita.

Una simile osservazione sur fatta nel Cadavere dell' Eminentissimo Cardinale Alamanno Salviati morto in età di anni sessanti esta di anni sessanti pubtore Pietro Tabarrani pubblico Professore di Anatomia

in

<sup>[</sup>d] Vol. I. §. 235 p. 529. [e] Exposit. Anatom. de la Struct. du Corp. Hum. Trait. De la Tete Tom. IV. §. 9. & 10. pag. 132 a Amiterdam. 1732.

estrarre in altra guisa il cervello, dai ventricoli anteriori del quale si vide uscire una gran quantità di limpidissima acqua; del rimanente era il Cervello nella sostanza, nel colore, nella mole, quale appunto suol' essere nello stato suo naturale.

Mossi finalmente da quanto era pocanzi accaduto al Sig. Chirurgo, tornammo ad offervate con maggior diligenza l' interna cavità del Cranio coll' annessa Me-ninge, e vedemmo due ossi durissimi, [3] di diversa gran-

Aa dezza

in questa Università [f], e il dottissimo Sig. Gio: Battista Morgagni in più luoghi della sua ultima Opera Medica [g] racconta di avere osservato la dura madre tenacissimamente attaccata al Cranio di Persone gia settuagenarie.

[3] Questi induramenti Ofsei delle parti molli del Corpo Umano accadono molto frequentemente, come apparisce dalle osservazioni di questo genere riportate nelle memorie di Medicina degli Atti Edimburgensi, e in quelle della Reale Accademia delle Scienze di Parigi, ove non dirado si leggono le Istorie di Tendini, di Membrane, di Tuniche Arteriose, e di Car-

tilagini ossificate. Nella Istoria della stessa Reale Accademia dell' Anno 1726. [b] avvi la descrizione di un' osso preternaturale ritrovato nel Cuore di un P. Gesuita morto in età di Anni settantadue, il qual' osso cingendo all' intorno i ventricoli del Cuore gli divideva da quella tela musculare, la quale dalla punta del cuore incomincia ad innalzarsi, per andare a ricoprire gli stessi ventricoli: Questa osservazione dimostra, che le parti musculari ancora sono alle volte foggette a così fatto cangiamento.

Non posso in tale occasione dispensarmi dal riferire quello, che nel Settembre dell' Anno 1762. mi venne fatto

di

[h] S. I. p. 34. Edir. di Olanda,

<sup>[</sup>f] Observat. Anatom. Hift. X. p. 31. [g] De sedib. & Caus. Morb. per anatom. indag. Lib. I. Epist. III. Art. 21. Lib. II. Epis. XXVII. Art. 2. Lib. III. Epis. XXXVII. Art. 30. Lib. V. Epis. LXVII.

dezza, che si erano impiantati nel largo della Falce Messoria, con direzione parallela ai seni longitudinali della istessa Falce, piu dappresso però al minor seno longitudinale inseriore, che al maggior superiore, ed erano per-

CIO

di offervare nel Cadavere di una Donna tormentata fin dall' Anno 1758., ch' era il fessagesimo dell' età sua, nella regione dei Reni da fieri, ed acerbi dolori, i quali si propagavano sino a quella dello stomaco, ed erano accompagnati da frequentissimi vomiti, da improvise mancanze, e da una così gran debolezza, che non permetteva alla Inferma l'alzarsi nè pure per breve tempo dal letto.

A tutti questi incomodi aggiunfero nell' Ottobre dell' Anno 1761. alcune febbri allai gagliarde accompagnate da gran freddo nel parosismo, e da molta copia di orine cariche di un sedimento, che fu giudicato non folo da me, ma ancora dal Sig. Dottore Giuseppe Baldassarri allora foprachiamato una vera marcia in tutti i suoi caratteri, per cui credemmo ambidue, che il male dell' Inferma altro non fosse, che una piaga ulcerofa in uno dei Reni; Onde prescritto aveudo concordemente alla medesima alcuni rimedi semplici . ed innocenti piu atti a confolarla, che a guarirla, ne lasciammo tutta l' opera alla natura. Dopo alcuni giorni vedemmo a poco a poco calmare le febbri, e con esse i dolori, e diminuire nelle orine le marce, le quali essendo poi insieme colle febbri cessate affatto, lasciarono l' Inferma in qualche quiete, benche per pochi giorni, mentre riap. parvero all' improviso piu gagliardi, e più atroci i dolori col feguito dei fintomi fopra descritti divenuti anch' essi piu frequenti, e piu forti.

In questa guisa continuò Ella a vivere per lo spazio di dieci mesi senza poter mai ottenere alcun sollievo da quei rimedj, che l' arte Medica le avea potuto proporre. Giunta all' Anno sessagesimo quarto dell' età sua, dopo aver sosseria, alle ore quattro della mattina del di due del Settembre suddetto terminò colla vita i suoi tormenti.

Fui pregato ad assistere al-

la

cio situati in quella parte della lunghezza della medesima Falce, che corrisponde alla unione della sutura sagittale colla trasversale della Fronte, distanti dalla estremità anteriore della Falce il maggiore tre pollici, e nove Aa 2 lince

la sezione del Cadavere fatta dal Sig. Andrea Gioja Professore di Chirurgia in questa Città per commissione dei Domestici della Desunta premurosi di discoprire la cagione degli strani accidenti avvenuti in una così dolorosa malattia.

Aperto il Torace, apparvero i Polmoni del suo color
naturale nella parte anteriore, che riguarda lo sterno,
ma nella posteriore, che corrisponde al dorso, erano questi attaccati alla Pleura, e di
un colore violetto fosco indicante la infiammazione dei
medesimi. Il Cuore era ricoperto da moltissimo grasso, ed
era nello stato suo naturale;
L' Arteria Aorta era assai dilatara, avendo un diametro
maggiore di due pollici.

Nel Ventre nulla si ritrovò, che meritasse essere notato, suoriche il sinistro dei Reni. Era questo involto in moltissima quantità di sostanza adiposa, separata la quale, non comparve esso della sua figura consueta, e del suo colore ordinario, poiche videsi un gruppo carnoso, di figura quasi rotonda, e di colore carnicino, e biancastro. Dopo molto stento, e dopo gran resistenza ortenne il Sig. Chirurgo di aprirne la interna cavità, e quivi allora vedemmo non senza maraviglia tutta la sostanza interna del Rene cangiata in un' altra affatto diversa, composta di fibre tendinose, e durissime, bizzarramente intrecciate fra di loro, in mezzo alle quali di tanto in tanto sporgevano suori certe Laminette acutissime a foggia di tante punte di spada attaccate alle fibre fuddette colla loro base alquanto piana, ed estesa, e molto simili tanto nel colore, quanto nella durezza alla sostanza ossea del Corpo Umano, talmente che meritar potevano la denominazione di ossi, se forse non vogliamo aderire alla opinione del Dottore Buddeus, il quale è di parere, [i] che tutte le ossificazioni preternaturali

linee, il minore pollici quattro, tre linee, e mezza; e separati affatto per ognintorno dalle ossa del Cranio, e da se medesimi ancora nella distanza di tre in quattro linee di pollice.

Aveva

ternaturali, le quali si formano in diverse parti del corpo umano, non meritino questo nome, perche così fatte sostanze non hanno dei veri ossi altri caratteri, che la bianchezza, e la durezza.

Questa opinione del Buddeus mi fece alquanto dubitare, se fossero, à nò di sosanza ossea composte quelle laminette ritrovate in un Rene, dove così spesso ritrovansi delle concrezioni calcolose, tanto piu, che l' Eruditissimo Sig. Gio: Battista Morgagni agitando la questione, se così fatte concrezioni siano, ò non siano veri ossi, ci avverte Egli pure, [k] che non dobbiamo colla riprova foltanto della durezza esfere troppo solleciti nel dichiarare ossee certe concrezioni, che chiamar si debbono piutosto petrose, tofacee, calcolose, &c. fecondo che più si accostano alla natura delle Pietre, dei Tofi, dei Calcoli &c., i quali

il piu delle volte avviene, che s' incontrino nella Vessica urinaria, e nei Reni: Onde mi posi allora ad esaminarle con maggiore attenzione, e conosciuto avendo, che oltre ad essere bianchissime, e durissime, non erano in verun conto friabili, ma erano bensì trasparenti, ed ellastiche, e nel romperle si scheggiavano guisa appunto degli ossi, quando si rompono, mi determinai a crederle composte di una sostanza ossea, incoraggito dall' iltesso Sig. Morgagni, il quale non dubita di dare il nome di ossi a quelle concrezioni, nelle quali ha osservato i suddetti caratteri, come in più luoghi apparisce della Epistola sopracitata.[/]

Sembrami inoltre, se aver si voglia riguardo a quanto avvenne alla Inferma un anno in circa avanti la morte, che questa mia osservazione non molto differisca da quelle, che in più luoghi della

gia

(1) Art. 17. 18. & 20. p. 291. & seg.

<sup>(6)</sup> Oper. Med. sopracit. Lib. II. Epis. XXVII. art. 20.

Aveva il maggiore di questi un pollice, e undici linee di lunghezza, due acutissime punte nelle estremità, e il corpo ineguale, e scabroso a guisa di scoglio. alto cinque linee, e largo quattro, come dalla Figura 3. della Tav. VII. apparisce: Era il minore situato un po-CO

gia riferita Opera Medica [m] descrive il sopralodatoSig.Morgagni per confermare la nuova opinione del Crellio circa la cagione di simili concrezioni, che il Crellio stesso crede Non offeas, fed tophaceas ex pure concretiones, eujus senujore parte dillipata, restitans crassor inderesur; (n) sebbene però il medefimo Sig. Morgagni non fi accorda col Crellio intorno alla qualità invariabile di concrezioni tofacee, allorche dice [0] di avere in molti cadaveri osfervato il piu delle volte simili concrezioni non gia tofacee, ma bensì offee in tutti i loro caratteri; la quale offervazione non repugna punto al nuovo sitema del Crellio, il quale determina una delle cagioni delle concrezioni preternaturali, che talora s' incontrano nel Corpo Umano; poiche altro è il di-

re, che dopo le infiammazio ni, e le suppurazioni nascano cosi fatte concrezioni ò tofacee, d Ossee che siano, altro è il dire, che le medesime concrezioni siano sempre tofacee, e non mai ossee; che anzi Egli afferma, [p] che tutte queste Concrezioni d' uo. po è, che nascano da un sugo morbolo atto a produrle simili d alle pietre, d ai tofi, ò al gesso, ò agli ossi, quando è ripieno di particelle tali, che unite insieme servono alla formazione di qualcuna delle divisate sostanze.

Finalmente tutte queste ofsificazioni prodotte ex pure post inflammationes, & suppurationes sono state dal Sig. Morgagni, e da altri osservate nelle Arterie; Non dee percio recar maraviglia, se dopo una manifesta suppurazione della sostanza interna di un Rene si

fono

<sup>(</sup>m) Epis. VII. Art. 9. Epis. XXIV. Art. 11. & 16. Epis. XXVI. Art. 17. Epis. XXVII. Art. 2. & 30. &c.
(u) Obs. De Arter. Cord. Coron. instar. ossis indurate.

<sup>(</sup>o) Epit. XXVII. Art. 23. p. 294. (p) Epis. XXVII. Att. 27. p. 296.

co sotto al precedente nella distanza di quattro linee, lungo appena nove linee, e tre e due terzi largo, appuntato anch' esso da una parte, e quasi rotondo dall'altra, e rilevato nel mezzo a foggia di un piccolo bottone da camicia della grossezza di quasi tre linee ( wedi

la Fig. 3. della Tav. VII.)

Questi due Ossi s' internavano insieme colla Falce in quel solco, che separa dal sinistro il destro Emissero del Cervello, dove però non potemmo coll'occhio discoprire veruna sensibile impressone dei medesimi s Nulladimeno quindi forse potrebbesi congetturare, [4] che sia derivata la cagione del sopradescritto Dolor di Testa, e delle ostinatissime Convulsioni, che hanno tormentato pel corso di quasi venti anni lo sventurato Dottore Arrighi.

fono in essa ritrovate le sopradescritte ossificazioni, mentre questa abonda talmente di vasi arteriosi, che il Ruischio pretende, (q) che quei corpicciuoli, che il Malpighi prese (r) per vere glandole, e che ad esso pure erano da prima sembrati tali, altro non siano, che mere estremità arteriose attortigliate, comunicanti immediatamente co'i Tubi Urinarij detti Belliniani.

[4] Che dagli ossi suddetti abbiano avuta la loro origine le malattie di gia descritte è cosa, parea me, alquanto ve-

risimile, ma non così certa da non potersi mettere in dubbio; Impercioche la esperienza, ch' è il più sicuro fonte, donde attinger si può la verità di così fatte questioni, ci presenta davanti agli occhi una serie di fatti dello stesso genere, ma così discordanti nei loro effetti, che demolisce l' uno, quanto fabbrica l' altro, come chiaro apparisce dalle osservazioni di questo genere riportate nella Istoria dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi,(s) nelle memorie di medicina degli Atti di Edim-

<sup>(9)</sup> Tesor. III. n. 41. Not. 1. e Tesor. X. n. 85. 88. 149. (7) Exercitat. De Renib., & De Strust. Gland. Conglob. (1) An. 1711. p. 34. e seg. e An. 1713. p. 28. Ediz. Oland.

Edimburgo, [1] e in piu luoghi dell'opera sopracitata del Sig. Gio: Battista Morgagni, dove il dottissimo Autore riporta le istorie di ossi ritrovati da Lui nelle Falci messorie di Persone, alcune delle quali non foffrirono [u] mai, altre non apparisce, che abbiano sofferto (x) veruna malattia di testa, alcune altre poi furono attaccate da convulsioni (y) da vertigini [z] da dolor ditesta [aa] da stupidezza (bb) e da apoplessie [cc].

Da così fatte osservazioni diametralmente opposte nei loro effetti deduce Egli, che se gli ossi preternaturali, che nascono talora nella Falce, ò presso la Falce, non sono situati talmente, che offendano la dura, ò pia madre, non solamente non sogliono cagionare alcuna grave malattia, ma non si manifestano neppure con alcuno benche leggieriffimo indizio (dd). Due sono per Esso le maniere, onde possono gli ossi suddetti recare

offesa alle Meningi, e produrre in conseguenza qualche malattia della Tetta, ò la Puntura, cioè, ò il Peso [ee], al quale io piutosto mi appiglie. rei, perche con esso parmi, che in qualche modo rendasi conto di quella disparità di effetti, che abbiamo pocanzi nei fatti osfervata; Impercioche il peso degli ossi distraendo, e deprimendo la Falce rende piu angusti i seni della medesima, e toglie percio al sangue la libertà di circolare per gli vasi della Testa; ma da questa sola cagione non puo essere il moto del sangue immediatamente impedito di tal maniera, che ne debba nascere una. malattia irrimediabile, se non quando vi concorrono altre cagioni atte a produrre lo stello effetto, come il medesimo Sig. Morgagni mente dimostra [ff].

Posto adunque tutto questo, facilmente s' intende, come fra quelli, nelle Falci dei quali si sono ritrovati degli ossi,

alcuni . .

<sup>(</sup>t) Tom II. Art. XXI. p. 388. (u) Epif. III. Art. 23. p. 24.

<sup>(</sup>x) Epif. XXI. Art. 35. p. 217'

<sup>(</sup>y) Epif. XXV. Art. 6. p. 267.

<sup>(</sup>z) Ibidem. (aa) Ibidem .

<sup>(45)</sup> Epis. I. Art. 10 & 11. p. 8.

<sup>(</sup>cc) Epil. III. Art. 20. 21. e 22. p. 22. e feg. (dd) Epil. III. Art. 21. p. 23. Epil. XXV. Art. 8. p. 269. (ee) Ibidem .

<sup>(</sup>ff) Epis. III. Art. 22. e 23. p. 24.

alcuni fiano stati soggetti a fierissime malattie irreparabili , altri poi non abbiano giammai sosserto nè pure un leg-

giero dolore di testa.

Lo stesso non pare, che possa dirsi della puntura, la quale recando sempre una offesa immediata a qualche parte, deve quivi senza il soccorso di altre cagioni produrre immediatamente un' effetto proporzionato alla lesione, e percio preternaturale, e morboso; Onde tutti quelli, nelle falci dei quali sono stati ritrovati degli offi nella stessa guisa situati, e armati delle medesime punte, dovrebbero essere stati sottoposti se non alla medesima, almeno a qualcuna delle malattie della Testa, lo che repugna alla osservazione, come abbiamo veduto di sopra. [gg]

Oltre a ciò se gli ossi esistenti nella Falce pungono, come deve credersi, le Meningi, quali essetti secondo la Insensirività, ed Irritabilità Halleriana ne dovranno mai derivare? La dura Madre, e la pia Madre fono prive affatto di senfo [bb]; come puo dunque procedere dalla puntura di esse il
dolore di Testa? Sono ancora
queste due membrane non irritabili; [ii] come possono adunque dalla puntura delle medesime propagarsi alle altre parti del corpo le convulsioni?

Le sin qui esposte difficoltà non mi permettono, che io avanzi con sicurezza al Pubblico il mio fentimento intorno alla cagione delle malattie descritte gia nella Istoria; Lascerò a chi legge la libertà di deciderne e folamente aggiugnerò per compimento della Ittoria medesima una notizia, a mio credere, assai necessaria, che il Padre, cioè, del Dottore Andrea Arrighi morì dopo une lunghissima malattia di molti anni assai consimile a quella del Figlio, e che i Fratelli di Lui ancor viventi non poco inclinano a questa stessa quasi domestica, ed ereditaria Infermità.

Di-

<sup>(</sup>gg) Ved. le not. [s] [u] [x]
(bb) Opus. di vari autori sulla Insens. e Irritab. Haller. 2. 20. e p. 255. e seg. In
Bologna 2757.
(ii) Negli stess Opuse. p. 67.

# Dichiarazione della Tavola VII.

# FIGURA PRIMA

Rappresentante la Parte Sinistra della Falce. Messoria:

AAAA.	Il seno Longitudinale supe-
BBB.	riore
ÉC.	riore. Il quarto Seno della Dura
	IVIadre.  La Estremità anteriore del-  la Falce, che nasce dall'
EE.	Apossise detta Crista Gal- li.  Due piccoli Ossi situati nel-
	la Falce, i quali da que- fla sinistra parte della me-
,	desima Falce apparivano in tutta la loro estenzio- ne nudi, e scoperti. Di
	questi il Superiore era- piu grande dell' Inferiore

## FIGURA SECONDA

Rappresentante-la-parte Destra della Falce Messoria.

AAAA	Seno Longitudinale Su-
	periore. Seno Longitudinale Infe-
	PIOTA
	l quarto Seno della dura Madre a Estremità anteriore del-
All de Rich Weis' He <sup>d</sup> a D'ura Îdadie.	della balce, the naite dall
es a contract coest 1 to	Apossise detta Crista Gal-
in destination on A significant	due Ossi sopraccennati nel- la Figura Prima, dei qua-
-len bruit II C. Treste half .	li il maggiore si vedeva a metà nudo, e scoper-
ett primiter i de til Est militari	to, e a metà velato dal- la destra membrana del-
ស្រាប់ស្រាញព្រះ ១៩៤៤ ការ៉ាម៉ានេះ ភសិលាបានសមានការបានប្រជាព	la Falce; Il minore poi vedevasi tutto velato dall'
S. Sister of the Contraction of	istessa membrana.

## FIGURA TERZA

Rappresentante il Profilo della Großezza dei due Ossi suddetti.

#### MORSREPENTINA

EX DISRUPTA SPLENICA ARTERIA

OBSERVATIO

## JOSEPHI NENCI

PUBL. MEDIC. PRACT. PROFESS.



Obilis Vir octo & quadraginta annos natus, tenui corporis habitu, fervidaque constitutione præditus, vel ab ineunte ætate hypochondriaco morbo laboravit, nec obscura scorbuticæ labis, ut mihi postremis ejus vitæ diebus relatum est, indicia præsetulit. Adultus verò & vita deside, & longa, inquie-

taque cogitandi consuetudine plurimum sui corporis robur enervavit.

Vere anni 1755 cum Liburni moraretur, acri ad lumbos dolore correptus est, cui, ut mihi ipse sæpius narravit, accessit insignis, & assidua ad hypochondrium sinistrum pulsatio, quæ cum vomitu interdum, interdum cum alvi astrictione, interdum cum vigiliis, sæpè cum slatibus conjuncta grandem ipsi molestiam asserebat. Variis remediis adhibitis, morbus remisit sic, ut sper autumnum, & hyemis initia subsequentis anni, quo tempore Senas venit, suis, & alienis negotiis operam dare potuerit.

Redeunte autem vere sensim morbus adauctus est: Præ lumborum dolore nullus somnus; Vehemens ad hypochondrium sinistrum pulsatio; tumor etiam ad sundum stomachi, & quidem non modicus; dissicilis item a levissimo etiam corporis motu respiratio; Præterea & crura intumuerant, & vix, aut ne vix quidem in sini-

stro carpo micabat arteria.

His serio consideratis, de dilatatione in cæliaca, ejusve ramis dubitatum est; quare sanguinem statim detraximus, lac asininum præcepimus, & quæ ex rebus, ut vocant, non naturalibus adhibenda, quæ sugienda forent in periculoso, de quo jam dubitabamus, affectu & ægro, & ejus necessariis exposuimus.

Et sane his probe servatis, pulsatio, & lumborum dolor non nihil conquieverunt, & per mensem unum,

& alterum placidiori somno æger usus est.

Increscente vero æstatis calore ita morbus invaluit, ut in grave animi deliquium pridie calendas Septembris inopinato incideret, e quo per sanguinis missionem recreatus, cum refectis jam viribus alvus lenissime duceretur, in animi deliquium relabitur, & quidem adeo vehemens, ut frigido sudore persusus, & sine pulsu morti proximus videretur; Opportune tamen adjutus, iterum ad se rediit summa cum omnium admiratione: Verum paulo post febri corripitur; ac tertio demum die, cum in sinistrum latus se convolveret, repente interiit; & re compertum est, quod Hippocrates literis prodidit, qui sæpe, & vehementer animo desiciunt sine causa manifesta, repente moriuntur.,

Ut hujus repentinæ mortis causam oculis ipsis intueremur, abdomen consecuimus, quo vix dissecto tanta sanguinis copia profluxit, ut decem libras excedere videretur: Sanguine verò absterso, disruptam vidimus splenicam arteriam, atque adeo dilatatam, ut pugnum commode admitteret; Neque vero sola splenica dilatata erat, sed & renalis sinistra, & Cæliaca, & proxima

descen-

descendentis Aortæ portio, quæ ultimam dorsi, & primam lumborum vertebram nonnihil detriverat. Cæterum stomachus, atque intestina secundum naturam; Jecur paulo grandius, quam esse naturaliter debet; Lien omnino contractus; Cor autem, & pulmones illæsi,

atque integri.

Hypochondriaca, & scorbutica corpora cum & insigni humorum acrimonia & nimia sæpe sibrarum laxitate laborent, variis morborum generibus in abdomine præsertim obnoxia esle longa observatione perspectum est: Quare mirandum non est, si idema & ægro nostro evenerit, in quo & vita deses, & inquietæ, diuturnæque cogitationes ad malorum cumulum accesserant. Ab his enim retardato in imi ventris visceribus sanguinis motu, sieri quidem iis in arteriis, quarum supra mentionem secimus, aneurismata potuerunt; quæ partim premendo, partim distendendo, interdum æquabilem sanguinis distributionem perturbando, & gravem spiritum, & dolores, & animi desectiones, ac reliqua in historia relata symptomata produxerunt. Hæc autem aptis, blandisque medicamentis, & præsertim recta victus ratione leniri quidem potuere; at aneurisma ipsum splenicæ arteriæ impediri nullo modo poterat, quin potissimum in majori humorum agitatione, hoc est, sebre superveniente, rumperetur, essusous interimeret.

#### STORIA

DEL SIGNORE

## ANGELO MANCINI

PROFESSORE DI CHIRURGIA NEL CESAREO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA,

CONCERNENTE UNA GRAVE FERITA DI TESTA CON OFFESA DELLE PARTI INTERNE.



Itrovandosi a lavorare nelle vicinanze di Sassofortino un certo Matteo Batisti di Stia, per non sò qual motivo su contro di lui scaricato un colpo di accetta nella testa il di 17. Marzo 1760. Cadde egli subito in terra, ove restò senza parlare per lo

spazio di più di due ore. Versò del sangue dalle narici, e dalla serita sino alla dose di due in tre libbre.
Fu medicato da un Chirurgo, nè sossiri altri sintomi se
non che la sebbre sopraggiuntagli nel terzo giorno. Sicchè avendolo ritrovato il Chirurgo ne' due susseguenti
giorni, cioè nel quarto, e nel quinto, in istato ragionevole, lo sece trasportare in questo Spedale di S. Maria della Scala, ove giunse il dì 23. dello stesso mese,
nel qual giorno io lo visitai, e mi narrò assennatamente tutto il sin quì esposto; Mi soggiunse di piu, che
quando ricevette il colpo era in piedi con il cappello,
ed un doppio berretto di lana in testa, e che a riserva della prima sebbre si era sempre sentito bene.

Era egli di temperamento pletorico, un poco scolorito, e non aveva ancora compiti i 40. Anni. La

ferita

ferita era nel sincipite sinistro, distante quasi due dita dalla sutura sagittale, e un dito e mezzo dalla coronale. La lunghezza della medesima era di sei dita trasverse, e la larghezza quasi di un mezzo dito. Oltre la totale divisione de' tegumenti, e del cranio erano ancora divise le membrane nella parte inferiore, che riguardava l' occipite, per la qual divisione rimaneva scoperta una porzione di cervello. Le marce, che fluivano dalla ferita, in particolare dalla parte interna tralle membrane, e il cranio, e che comparivano in maggior copia, quando venivano forzate dal loro moto, erano di un cattivo colore, e odore corrispondente alla qualità della carne.

Ricuoprii la ferita colle sole sila asciutte, e procurai di lasciare nella parte inseriore libero lo scolo, obbligando il Malato a giacere supino con la testa bassa. Dopo qualche tempo comparve nel sondo della ferita una squamma d'osso della larghezza di un quattrino, di sigura irregolare, staccatasi dalla interna tavola del cranio, la quale estrassi con dissicoltà. Di poi squammaronsi ancora diversi pezzi di ossi di varie sigure, e grandezze, i quali arrivarono al numero di quindici: Dopo la separazione di questi frammenti comparvero le marce di miglior qualità, e la carne ripigliò il color naturale. Trattenne un poco la guarigione l'ultimo pezzo d'osso separatosi nel dì 3. del seguente Giugno, ma restò sinalmente la ferita cicatrizzata nello spazio di dieci giorni, e partì Matteo Batisti dallo Spedale il dì 14. dello stesso mese.

E' da notarsi, che, siccome per estrarre la maggior parte de' suddetti ossi sui piu volte in necessità e per l' angustia della ferita, e per la loro diversa sigura, e per l' uso degli stromenti, co' quali dovea estraerli, di irritare in qualche maniera ambedue le membrane, interrogai sempre l' Infermo, se sentiva dolore: ed egli costantemente rispose non aver mai sofferto alcuno incomodo; ha sempre avuto appetito, nè mai si è trovata una minima alterazione ne' di lui polzi.

## RIFLESSIONI DEL SIGNORE

# GIACOMO BORSELLI

DOTTORE IN MEDICINA
SOPRA LA RIFERITA STORIA CHIRURGICA

Infermo fortunato, per così dire, nella sua disgrazia non ebbe altro, che una sola febbre nel terzo giorno del male, una notabil perdita di sangue dalla ferita, ed una semplice gravezza, e ottusità di testa. Non si vide mai segno alcuno di convulsione, ma si osservò il Malato sempre sano di mente, nè si udì mai lagnarsi di alcun dolore, che lo assignesse ; Lo che sembra, che dovesse indispensabilmente accadere in una ferita di tal sorte, se le membrane del cervello sossero dotate di quel senso santo squisito, che dalla maggior parte dei Moderni, e degli Antichi quasi tutti, per quanto io sappia, è stato alle medesime attribuito.

Quello, che dà maggior forza, si è, che il Malato asserì sempre costantemente di non aver mai sosserto alcuna sensazione molesta ogni qual volta necessariamente, ed anche per istudiosa curiosità surono a mia insinuazione irritate dal Sig. Mancini le sopradette mem-

brane

brane in occasione di dovere estrarre molti pezzi, e frantumi della interna vitrea sostanza del cranio, che so-

pra di esse erano caduti.

Queste osservazioni da me fatte in presenza del Sig. Mancini, e di alcuni altri ancora concorsi a vedere la cura della ferita, vengono a confermare quanto riguardo alla insensibilità delle Menigni su osservato dal celebre Sig. Zinn in una Inferma, in cui una carie fopravenutale per morbo venereo aveale interamente con-sumata una porzione dell' Osso frontale alla larghezza di due trasversali dita, ed aveva perciò scoperto la dura madre di tal maniera, che potevasi toccare senza pena alcuna con uno stromento. Onde sembra doversi per necellaria conseguenza arguire, essere affatto insussi-stente il sistema del Pacchioni, adottato poi dal Baglivi (il quale con tutta ragione può dirsi gloria, e splen-dore della nostra Accademia) essendo essi di opinione, che i dolori di telta, le veglie morbose, la Melancolia, la Mania, le Convulsioni, la Epilessia, le Paralisie con mille altri malori abbiano la loro origine da qualche vizio della predetta Membrana la piu sensibile secondo essi di tutte le Membrane del corpo Umano, ed alla sensibilità della medesima, allorchè rimane offesa, attribuiscono tutti quei perniciosi effetti, che sopravengono alle serite de' nervi, perche rivestiti dalla dura madre .

Nessuno de' più accurati Anatomici de' tempi nostri ha fatto mai parola di alcun nervo esistente nelle Meningi, e il celebre Winslow dice di non aver trovato nella dura madre se non alcuni piccoli, e pochi filamenti nervosi, nascenti per la maggior parte dal quinto pajo all' ingresso del seno cavernoso, e nella pia madre poi non ne nomina alcuno; e il dottissimo Scho-

Cc

binger nella sua Dissert. De tele cellulose in sabrica corpovis bumani dignitate asserisce in conferma di quanto si è detto sin qui di avere osservato, che la dura madre con una breve macerazione si cangia in una sostanza sioccosa, e cellulosa, i quali due caratteri non convengono, come ognun sa, alle parti del corpo destinate alle sensazioni.

Parmi finalmente di dovere avvertire per modo di corollario legittimamente dedotto dalle fin qui esposse osservazioni, che Galeno, e il Cardano con qualche ragione erano soliti di prescrivere per le malattie della dura madre i rimedi piu violenti, e che non meritano in verun conto di esser biasimati i Chirurghi Francesi, i quali con ragione hanno avuto, ed hanno il coraggio di toglier via la detta membrana qualunque volta ella impedisca l'espulsione del sangue travasato, o della marcia.



## STORIA

#### DEL SIGNORE

## ANTON FILIPPO LANDI

INFERMIERE DEL CESAREO SPEDALE DI S MARIA DELLA SCALA.

CONCERNENTE L'INGRESSO DI UN PEZZO DI, PALO NEL VENTRE.

> Omparve a questo Spedale di S. Maria della Scala portato in un Cataletto il dì 19. Febbrajo 1758. Andrea Viviani della Parrocchia di S. Felice nel Chianti, in età di anni 39. dotato dalla natura di un ottimo temperamento, e di una robulta, e sana

cossituzione. Cadendo egli da un' Ulivo, in cui era salito per adempiere le sue rusticali incumbenze, si incontrò l' infelice in un palo vicino perpendicolare al terreno, ov' era sitto, il quale urtando la sua punta alquanto acuta nella sutura dello Scroto del disgraziato Villano ruppe i tegumenti, e introducendosi per la parte sinistra tra il cuojo, e i muscoli del basso ventre giunse a dirittura sino all' ombelico, e sarebbesi certamente inoltrato piu avanti, conservando sempre la medesima direzione, se non si sosse solle allora troncato per la sua propria fragilità, che tolse al palo stesso l' azione di resistere piu lungamente all' impeto di una mole così pesante, qual', era il corpo del suddetto Viviani.

A tal vista per tanto essendo stato coricato l' Infermo al Num. 77., appena ne su a me commessa la

cura cura

cura, che subito incominciai a fare sul ventre una leggiera espussione per isbarazzare il palo dal nido, e approdarlo all' apertura. Questo però non su allora possibile di ottenere per la resistenza, che sacevano al palo certi grumi di sangue, e specialmente un tessuto di false sibre, ch' eransi formate sull' apertura della ferita, e all' intorno ancora della medesima in tutto il tempo di un intiero giorno, nel quale su differito il trasporto dell' Infermo, perche munito sosse prima di partire di tutti i Santissimi Sagramenti, e sosse usate ancora molte diligenze dirette senza alcun prositto alla estrazione del palo; ma subito che surono da me tolti gli ostacoli sopraccennati, tentai di nuovo colla mia mano la consueta espussione, per mezzo della quale ottenni tosto con due dita di trar suori selicemente il palo, che avea di gia livellato il soro della serita.

Erano secondo il costume intorno a me; quando mi accinsi a questa operazione, tutti quei Giovani, i quali essendoti applicati allo studio della Chirurgia si ritrovavano allora in qualità di Astanti in questo Spedale: Onde io posi il pezzo del palo di già estratto sotto gli occhi di tutti loro, i quali, dopo averlo con esattezza osservato, convennero meco essere il medesimo lungo mezzo braccio, scabro da i lati, e di tanto in tanto alquanto fesso, e scheggiato, simile di diametro a quello dell' osso omero, e di figura fin lemente quali semicircolare, la cui parte convessa riguardava i tegumenti, e la concava i muscoli. Nè su allora dissicil cosa il concepire, come si sosse il palo così agevolmente introdotto nel luogo sopraccennato, poiche videsi l'estremità del medesimo fatta a soggia di ungia, o dir vogliamo di Figura mitrale, quale

quale appunto sogliono usare per ordinario i diligenti Agricoltori nei pali rotondi, acciocche i geli, le nevi, e le acque non guastino sì tosto l' interna loro struttura.


Appena che fu estratto il palo feci subito porre sopra la ferita una saldella intrisa d' Emolliente; indi procurai di togliere, per quanto su allora possibile, con una ben alta compressa tutto quel voto, che sece il palo tra i tegumenti, e di cui vedevasi molto bene al di suori la lunga traccia dal luogo della ferita sino all' Ombelico. In oltre ordinai all' Infermo un Clistere, reso il quale dopo mezz' ora gli seci cavare dal braccio destro una moderata quantità di Sangue, e dopo aver con replicate Spogne inzuppate in una decozione amara somentato spesse volte tutto il dilui ventre, lo cinsi finalmente con una fascia circolare, e così lo lasciai, permettendo all' Infermo quel riposo, che egli tanto desiderava, e che in somiglianti circostanze eragli in fatti pur troppo necesesario.

Apparve il giorno dopo su la parte offesa una considerabile insiammagione rappresentante tanti raggi solari, che partendo da i lati della lunga traccia sopradescritta andavano a scherzare mirabilmente per tutta quanta l'estensione del basso ventre: onde io seci subito-ricavar Sangue all'Infermo, e gli prescrissi per uso della sete una bevanda refrigerante. Fu nondimeno quella accensione inflammatoria accompagnata sino al quarto giorno dalla Febbre, la quale pur troppo indicava nella serita la prossima suppurazione; ed in fatti incominciarono nel quinto giorno a grondare dal voto della medesima copiose marce, leggiere però, lattiginose, e senza alcun segno di setore, le qua-

li mi fecero subito determinare alla pratica delle fo-

menta dolci per facilitare lo sgorgo.

Ottenui in questa guisa così felicemente l' intento, che dopo qualche tempo senza mettere in uso nè taste. ne filacci, che rendono a mio giudizio spesse volte perenni le marce, apparvero queste assai di rado, e pochissime in tutto il rimanente della cura, la quale io terminai coll' uso soltanto della compressa, e della fascia circolare, e di un piastrello di Cerusa applicato al foro della ferita. Onde l' Infermo ebbe la sorte di ristabilirsi nella primiera salute dentro il breve spazio di tempo di 15. giorni, gli ultimi de quali furono necessarj non già per la guarigione della ferita, ma solamente perche l' Infermo pur troppo indebolito per l' emissioni di Sangue, per alcuni di quei purganti, che diconsi minorativi, e specialmente per la dieta rigorosissima, che su costretto ad osservare, potesse riacquistare forze sufficienti per il suo ritorno nel Chianti alla paterna Casa di San Felice .



1 11 5t , . . O. 1 1 2 C ( 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

## ALTRA STORIA

## DEL MEDESIMO SIGNOR LANDI

CONCERNENTE LA FRATTURA SGUAINATA DEI DUE FUCILI DELLA GAMBA SINISTRA COL TOTALE SLOGAMENTO DE' MALLEOLI



N Uomo Sanese di Anni 46. di temperamento pletorico, e di sana, e robusta costituzione, ritrovandosi per la cattiva condotta de propri affari in una estrema miseria, finalmente divenne pazzo a tal segno, che il primo di Maggio 1761. essendo sa-

lito in una piccola Loggetta di sua abitazione si precipitò suriosamente dall' altezza della medesima. Fu il disgraziato condotto subito a questo Spedale, ove io essendomi incontrato il primo a visitarlo lo feci coricare in un letto posto al num. 120, indi avendo con diligenza esaminato tutte le parti del malacconcio suo corpo riscontrai nella gamba sinistra la frattura dei due sucili poco sotto al ginocchio col distaccamento de' malleoli, e una distorsion' eccessiva del piede, il quale era tutto rivolto con i suoi diti rannicchiati verso la parte interiore; Vedevasi inoltre la gamba stessa alla misura di un palmo più corta dell' altra: Ne ciò rechera punto maraviglia a chi non ignora, che le ossa fratturate, allora quando uscite sono dalla propria guaina, perdono necessariamente la loro naturale direzione, e perciò non possono tener distessi

quei muscoli, che sono ad esse con mirabile arti-fizio attaccati; onde i muscoli stessi senza il con-sueto appoggio delle ossa, obbedendo alla propria attività di contraersi, immantinente si accorciano, e rendono così più corte ancora quelle parti, nelle quali avviene talora la frattura delle ossa.

A tal vista per tanto procurai di dare subito la giusta, e naturale direzione alla gamba, incominciando a ricondurre nel loro incastro gli sconnessi malleoli: lo che appena fatto, ma con non poca fatica, vidi i due sucili persettamente uguagliati: di poi si posero in prasica le consuete sasce, e le compresse, il canale, il cuscinetto, e la piantaletta, e le tirelle per mantenere stabili, e serme nel loro sito naturale le scompaginate parti della gamba; contutto ciò apparve in breve tempo nell' estremità del piede, ed apparve in breve tempo nell' estremità del piede, ed in quel piccolo spazio, che rimaneva spogliato dalle fasce, una gran quantità di quelle vessiche, che sogliono in simili casi precedere la imminente cancrena. Furono però bastevolmente valevoli a resistere a questa minaccia la replicata emissione di Sangue, qualche purgante subacido della classe de' minorativi, l'uso continuo delle Posche sulla parte offesa, e le pezzette inzuppate nello Spirito di Vino. Terminato poi tutto l'intiero corso delle sasciature comparve per il lungo decubito di 100 e più giorni una consistenti por tutto l' intiero corlo delle fasciature comparve per il lungo decubito di 40 e piu giorni una consi-derabile corruzione all'estremità del giro del cal-cagno, la quale a poco a poco diminuendosi ces-sò finalmente in tal maniera, che permise all' In-fermo l'alzarsi dal letto perfettamente libero e sano'. Dalle due sin qui riferite Storie parmi di potere giu-stamente dedurre quello stesso appunto, che tante volte ho arguito dalle replicate osservazioni, le quali, esercitando la mia prosessione, ho potuto sare nel corso di molti anni, che la mano, la quale da al Prosessore il nome di Chirurgo, e la buona, e lodevole costituzione del Malato sono i soli, e sicuri mezzi, per cui vedonsi sollecitamente arrivare alla guarigione tutte quelle malattie, che alla Chirurgia appartengono. Il più essicace medicamento sta nascosto nella sorgente perenne del nostro Sangue medesimo. Questo allorche è sano, e ben temperato abbonda di un balsamo a noi ignoto, che nelle esserne malattie di continuo portandosi alle ossese parti ottimamente le risalda.



#### DESCRIZIONE DI UNO STRAVAGANTE DELIRIO

IN UN' UOMO, IN CUI SI RITROVO' DOPO LA DI LUI MORTE UN TUMORE IMPIANTATO NEL CERVELLO

### DEL SIGNORE VINCENZO GALLI

PROFESSORE DI CHIRURGIA, E SETTORE PUBBLICO DELLA UNIVERSITA' DI SIENA



Rancesco di Giacomo Sestigiani Sanese, di Anni quaranta, di buon temperamento, molto dedito al Vino, Segatore di Legname, nel Mese di Giugno dell' Anno 1760, fu attaccato da un grave dolore di Testa accompagnato dalla sebbre, la quale lo costrinse a portarsi allo Spedale di San-

strinse a portarsi allo Spedale di Santa Maria della Scala, d' onde uscì subito che per mezzo di più missioni di Sangue, e di altre mediche diligenze ne restò libero. Non riacquistò egli però la primiera salute, perche oltre al non avere l'ordinaria sua forza continuava ad essere quasi sempre inquietato dal medesimo dolore di Testa di tal maniera, che producevagli della nausea, e della balordaggine.

A tutti questi incommodi si aggiunsero di più nel Mese di Novembre dello stesso Anno delle Vertigini,
le quali tolsero all' Infermo il sentimento e le forze talmente, che il di ventotto del detto mese giunse a perdere per qualche tempo l'uso della savella,
e l'attitudine all' inghiottire qualunque sorta di ci-

bo, e allora fu, che essendo portato di nuovo allo Spedale suddetto su consegnato alla cura del Sig.
Dottor Angiolo Lodoli pubblico Professore di Chirurgia Teorica, il quale avendo trovato nell' Infermo
privo per allora di senso, e di favella una non leggiera infiammazione, e turgidezza di occhi, sece al
medesimo varie convenienti ordinazioni, da cui però
non trasse l' Infermo profitto alcuno, mentre videsi di
giorno in giorno sempre più peggiorare di tal maniera, che giunse a sorprendere i Circostanti colla stravaganza del suo surioso delirio.

Nella fine del quinto giorno gli sopravvenne la febbre, gli mancarono le forze, ed accresciutaglisi la infiammazione alla faccia, ed agli occhi la tumesazione, perdette egli del tutto i sentimenti: Seguitò nulla di meno a vivere in questo miseraoile stato fino al giorno nono, nel quale dopo una ben lunga Ago-

nia terminò infelicemente la vita.

Si fece il giorno dopo nella solita stanza Anatomica l' apertura del Cadavere, alla quale su presente il Sig. Dottor Pietro Tabarrani, pubblico Professore di A-

natomia in questa Università.

Segato il Cranio si ritrovarono le Meningi insiammate; e ripiene ne' suoi vasi di sangue molto alterato nel colore; Era nei ventricoli una copia di siero maggiore del naturale, ed i vasi, che formano il ples-

so coroideo, erano anch' essi molto turgidi.

Si trovò poi nel Ventricolo destro anteriore sulla midolla allungata un tumore occupante il talamo destro del nervo Ottico, che si estendeva nel corpo striato, e nella sostanza midollare eziandio del Cervello, di una mole non minore a quella dei più grossi Ovi di Gallina; Aveva inoltre una superficie D d 2 ineguale ineguale, e scabrosa, ed era talmente duro, che resistette non poco al Coltello allorche lo tagliammo per vederne la interna sostanza, la quale ci comparve di un colore cinericio, e molto densa, e compatta.

Nelle altre due Cavità nulla si ritrovò, che meritasse di essere da noi notato, suoriche il cuore nella Me-

dia molto accresciuto di mole.



#### ISTORIA CHIRURGICA

DI UN' ERNIA INTESTINALE

COMPLETA INCARCERATA, PERFETTAMENTE GUARITA

COLL' OPERAZIONE DEL TAGLIO DEL MEDESIMO SIGNOR GALLI



Ietro Giacomelli in età di Anni ventifette, di temperamento pletorico, di una costituzione di sibra alquanto rigida, e forte, ammogliato, e fornaciajo di professione, essendo sin da tre giorni tormentato da un' Ernia intestinale nello scroto incarcerata dal-

la parte destra si portò il dì quattro di Marzo dell' Anno 1763. allo Spedale di Santa Maria della Scala, dove essendo stato a me consegnato subito lo visitai, e dopo averlo minutamente interrogato sopra lo stato della sua malattia riseppi da lui, che per l'addietro benche sosse stato di già allentato non aveva però sossero mai un simil male, il quale credeva egli stesso prodotto da uno ssorzo, che satto aveva tre giorni avanti in tempo appunto, che non trovavasi l'allacciatura, la quale era stato sempre solito di portare

Aveva egli in oltre non poca febbre, moltissima smania, ed inquietudine, soppressione degli escrementi, sudore freddo, e vomito. Il tumore erniarjo era piuttosto grande, duro, teso, ed insiammato al segno

da far temere dell' alterazione dell' intestino; con tuttociò siccome la maggior parte di queste Ernie riesce talora di rimettere coll' uso di convenienti somente, e coll' ajuto discreto delle sole mani senza ricorrere all'operazione del Taglio, volli prima premettere ogni diligenza per risparmiare la medesima operazione, ma tutto su senza frutto: Onde considerato avendo, che il disserire la operazione era lo stesso, che procurare all' Infermo una morte cerra, e tormentosissima, determinai, quando egli sosse stato contento, di fargli la operazione col taglio per riporre nel basso ventre l' intestino incarcerato. Fu contento il Giacomelli di sottoporvisi, perche già si credeva vicino a finir di vivere.

Avendo preparato tutto il necessario feci legare il Malato sopra adattato instrumento, indi ritentai, se colle mani poteva riporre l'intestino scome altra volta in un caso simile a questo in tal punto mi riusci di riporlo) ma avendo trovata la stessa difficoltà, alla presenza del Signor Anton Filippo Landi Insermiere dello Spedale suddetto, e Maestro di Chirurgia, e di più studenti Medicina, e Chirurgia incominciai la operazione.

Feci un lungo taglio degli integumenti con direzione longitudinale al tumore erniario, oltrepassando superiormente due dita trasverse l' Anulo, e dopo colla punta delle Forbici procurai di tagliare il peritoneo, il quale essendo molto stirato, e resistente mi su duopo l'aprire col taglio del Bisturi: Appena tagliato il peritoneo ne usci suori una copiosa quantità di siero assai colorito, e si presentò una gran porzione d'intestino Ileo, il quale per lo spazio di un buon dito trasverso era livido, ed alterato; onde

colla maggior prestezza procurai di riporlo nel basso ventre, come in fatti mi riuscì dopo che ebbi tagliato l' Anulo.

Giunta a tal segno l'operazione, feci nella ferita la cucitura da Pellicciari, prendendo coll' ago curvo prima il peritoneo, e poi tutta l'altezza degl' integumenti comuni, sopra alla quale posi un pezzo di velo con quattro chiarate per ritenere al contatto, e di-fese dall' aria le parti sottoposte, e dopo aver satta una conveniente fasciatura seci coricare in un letto già preparato l' Infermo, che aveva intrepidamente sofferta la operazione, appena terminata la quale, cessarono in vero alcuni dei sintomi della malattia. Nondimeno però benchè l' Infermo si ritrovasse in buono stato, dubitavo assai, che quella porzione d' intestino alterato, come da tutti gli circostanti fu veduto, non passasse alla cancrena. Ritornai il giorno a rivedere il malato, e lo trovai di buono aspetto, ma colla febbre, colla solita soppressione degli escrementi, colla tenzione, e con il dolore al basso ventre, per le quali cose gli seci cavare una copiosa quantità di Sangue ( giacche circa sole due once nella operazione ne aveva perduto), e fomentare di continovo il basso ventre. Ritrovai sulla sera, che il malato aveva avuto il benefizio del corpo, che gli era cessata la tensione, e il dolore al basso ventre, e quasi del tutto la febbre. Stasciai la ferita fine del secondo giorno, e la ritrovai senza tumefazione, e quasi riunita, e nell' undecimo giorno separatisi i punti, su capace il Giacomelli di passeggiare per lo Spedale, da cui quattro giorni dopo se ne parti perfettamente guarito, conforme io lo vidi alcuni mesi dopo sano e forte, e quello, che è piu

piu raro, senza alcun segno di allentatura.

La macchia livida ritrovata nell' Intestino, e la brevità della cura sembrarono a me due circostanze, per le quali meritasse di essere descritto il sopradetto caso Chirurgico.



### JANI PLANCI ARIMINENSIS

DE DUPLICI TETHYI GENERE, ET DE MANU MARINA

### AD PIUM JANNELLIUM SENENSEM

ACADEMICUM PHYSIOCRITICUM.

Uum superioribus diebus per litteras tuas humanissimas me certiorem seceris, Jannelli Amicissime, Academicos istos Physiocriticos modo in eo esse, ut Tomum secundum Actorum istius Academiae ederent, in eoque non una tantum de re agi vellent, ut sa-

ctum est superiori anno, sed rebus variis eum exornare cuperent, ut mos est in ejusmodi libris ceterarum
Scientiarum Societatum, quae per Europam sunt institutae, & quum me rogaveris, ut aliquid ad Te mitterem, quod in Acta ista referri posset, morem Tibi
gerendum statim duxi. Quid enim negem Tibi, quocum per viginti & amplius annos inter nos sincera, &
incorrupta amicitia intercessit? praesertim justa petenti? Selegi itaque ex Adversariis meis unam aut alteram
rem ad Historiam naturae spectantem, quæ licet novæ
omnino non sint, eas tamen melius & dictis, & siguris illustrabo, ut novae quodammodo siant, & videantur. Sermo igitur meus erit primum de duplici
Tethyorum genere, quod licet ab altis suerit tractatum,
tamen, ut videbis, explicationes, adnotationesque meae
rem plane novam reddent; His addam & Manum marinam dictam, quae quoque ex me novitatem quamdam capiet.

E e

I. Primum

I. Primum igitur corpus, quod heie describo; & pingi curavi, est illud, de quo memini in meo Tractatu de Conchis minus notis pagina quadragesima quarta, & ad Aleyonia tunc, seu ad Mala Citria Marina dicta, retuli, & de quo iterum in codem Libro nuper Romae recuso mentionem seci in Appendice secunda Capite XXVIII. Articulo III. in quo non probavi omnino explicationes, quas de co dedit Vir Claussimus Vitalianus Donatus Professor Taurinensis, qui modo longissimum iter per varia Orientis loca suscepit. Igitur Corpus issud a me modo sic describitur: Tethyum plerumque sphaericum malum aurantium Lustanicum sorma, seclore referens, quod horizontaliter dissectum sibras radiatim osseas ostendit. Hoc igitur Corpus, quod integrum cernitur in tabula VIII. sub Figura I. & Littera A. vocatur a me Tethyum cum Aristotele, & Theophrasto, quòd semper Tethyum cum Aristotele, & Theophrasto, quòd semper sit adherens ad Petrobrya B.B ut pictum est a me excernatur solutum, ut supponit Vitalianus Donatus esse, dum est in juventute; omnia enim, que vidi, vidi enim quamplurima, semper arcte adhaerentia rebus illis vidi, vel si erant soluta, lacera erant in ea parte basi, qua rebus illis adhaerebant. Si enim natura soluta suissent in juventute, ut ait Cl. Auctor ille, non Tethya, sed Holothuria cum Aristotele, Theophrasto, & Rondeletio vocari debuissent. Ipse igitur ea corpora vidit, ut opinor, tantum obsoleta, & non e mari recenter educta, quae si ita vidisset, ut vidi ego saepenumero, non reticuisset pulchrum Aurantii colorem, quo intus & in cute sunt infecta, & quem aliquantulum servant, si in spiritu vini condantur. Propterea quod ea semi-exsiccata viderit, sibras illas radiatas in ejus secunda sigura B. contortas pinxit. Exsiccatione enim quodammodo

modo contorquentur. Ad marginem etiam varios cincinnos, & flosculos adjungit, quos potius secundum imaginationem Pictoris esse deformatos dixi, quam secundum rei naturam, ut accidit sere in omnibus siguris Libri illius. Praeterea naturale non videtur, quod ipse asserit sub numero II. Corpora ista in juventute soluta esse, ut vera Holothuria tunc sint, deinde in senectute ad saxa adhaerere, ut Tethya siant. Corpora enim adhaerentia, ut videmus in dentibus, & aliis, in structibus praesertim universis senectuta a rebus adhaerentia. fructibus præsertim universis, senectute a rebus adhaerentibus solvuntur, & non magis implantantur.

Tethyi hujus odor, dum Zoophytum adhuc recens est, pisculentus est, at non ingratus, sed, si exsiccetur in umbra, putrescit, & soetet, ut caro putrida; ad solem vero exsiccatum soetorem minus ingratum habet. Hoc Tethyi genus, ut dixi in mea secunda appendice modo laudata, originem præbuit, ut satis verosimiliter conjicit Elias Bertrandus Bernensis, Phosphoro Bononiensis qui totus ex sibris radiatim rectis. niensi, qui totus ex fibris radiatim rectis, & numquam contortis constat, ut & alia Tethya, seu Holothuria oblonga originem praebuerunt Belemnitibus, quae itidem ex fibris radiatim rectis, & numquam contortis constant. Sed haec satis de primo Tethyi genere dicta funto. Veniamus ad alterum.

II. Tethyum igitur alterum, de quo modo ago; non durum, & osseum est in ventre, ut praecedens, sed molle, & cavum, ut ad Zoophyta ossibus carentia, & cartilaginea, seu coriacea amandari queat; Ad Tethya tamen referendum, quòd semper Petrobryis, vel Conchis, aliisve rebus duris haereat. Hoc notum suit vel Rondeletio ipsi, qui libro de Insectis, & Zoophytis capite xx 111 sub nomine Mentulae marinae alterius speciei descripsit, & pinxit, licet ruditer utrumque. De-

Eе

feriotum

scriptum fuit quoque a Joanne Baptista Bohadschio Pra-gae Historiae Naturalis Professore in libro Dresdae edigae Historiae Naturalis Profesiore in libro Dresdae edi-to anno millesimo septingentesimo sexagesimo primo, cui titulum secit: De quibusdam animalibus marinis, quae Animalia, seu Zoophyta ipse in Littore Neapolitano sex abheinc annis observarat, & Tethyum Coriaceum ca-pite vii. non inepte appellat, sed ejus corium punctis quibusdam nigris totum est notatum, ut quasi ex ope-re tessellato constare videatur, quod in nostro non apparet, neque in illo Rondeletii, neque in aliis Tethyis ejusdem generis, quae in Tabula X. Libri sui apponit Bohadschius ipte. A piscatoribus nostris Tamarognolo vocitatur, & penem virilem refert cum scroto, prae-fertim, si gosspio repletum ad solem exsiccetur; colo-re & consistentia valde simile est Alcyonio digitato gelatinoso, seu cartilagineo, quod Tabula X. in secunda Appendice Libri mei de Conchis exprimi curavi, sed Alcyonium illud digitatum cavum non est. Tethyum istud Coriaceum ora, seu ottia duo habet, unum in parte superiori B. alterum in parte inferiori C. Fig. III. & recens digitis in corpore pressum per ostia illa duo B.C. velut per duos silanos aquam marinam rejicit, ut rejiciunt Mentulæ illæ informes Carnumia Rhedio dictae, quas ego in secunda Appendice cap. x1x. descrips, & Ta-bula VII. pingi curavi; quod & in sua figura Tethyi hujus ostendit Rondeletius. Corpus hoc dissectum exhibet membranaceum Ventriculum Fig. IV & V. expressum, qui instar fere est Ventriculi Mentulae illius informis, qui ventriculus refertus est aqua marina, quae pressione, ut dixi, prosilit ex silanis illis per duo ostia membranacea ostiis coriaceis respondentia. In sundo D. Fig. IV. istius ventriculi est pars quaedam carnea sulvi coloris, & punctis notata, ut est porphyreticus lapis. Mem-

brana Ventriculi constat ex fibris circularibus, & longitudinalibus, ut sunt fibrae Ventriculorum Hominis, & Brutorum. Vide figuram V. Tota membrana infecta est colore purpureo violaceo, sed sordido. Bohadschius tria alia genera hujus Zoophyti describit, & in eadem Tabula X. pingit, sed neque primi nostri, neque reliquorum ejus anatomen internam dat, contentus ea superficie tenus describere, & pingere. Injuria tamen vitio mihi vertit verbis fortasse multis, quòd corpusculum a me repertum inter quisquilias maris nostri, quod pin-gi curavi Tab. V. in priore mei libri editione, & quod valde simile est Tethyo suo, quod ipse ponit terrio loco, quod, inquam, id corpusculum Tethyum, seu Penem caninum vocitaverim, & paucis descripseram. Contendit enim multis Tethyum non esse, neque Penem Caninum appellari debuisse. Verum, si species est Tethyi sui primi, Tethyum recte a me dictum erit, ut recte ab ipso Tethya dicta suere corpora illa sua terrio, & quarto loco ab ipso picta, & meo Tethyo similia; praesertim quod meum, ut apparet ex figura a me allata, habeat in basi sibras laceras, quibus aliis rebus haerebat. Praeterea si hoc nostrum primae speciei Men-tula altera a Rondeletio dictum suit, dici poterat & a me secunda species, Penis caninus, si cum Canis Pene, ut apparet ex figura, similitudinem quamdam habeat. Quare melius sibi consuluisset Bohadschius, si hujusmodi tricas in me non invexisset, quas sortasse propterea invexit, quòd ego aperte ipsi dixeram Corpus illud suum, quod in alio Libello Pragae undecim abheinc annis edito pro veris Ovis Sepiarum venditarat, non ova Sepiarum esse, sed Loliginum, & vera ova Sepiarum ea esse, quae vulgo Uva marina cum Rondeletio pag. 504. vocitantur, ut modo ingenue confessus est Bohadschius

ipse palinodiam canens in calce Libri sui;
III. Tertio denique loco heic addere lubet Palmam, Manum marinam Botanicorum, quorum multi deu Manum marinam Botanicorum, quorum multi-eam memorant, sed nomine tenus, praeter Josephum Ginannium Ravennatem in Tomo ejus primo posthumo, qui est de Plantis marinis octo ab heine annis Venetiis edito, ubi eam inter Fungos marinos pagina quadrage-sima quinta refert, & pluribus eam describit, & Ta-bula quinquagesima figuram ejus dat, quam tamen heic repeto, quòd Ginannii figura rudis sit, & omnino ipse sileat ejus internam structuram. Si enim horizontaliter secetur, ut sactum est a me (Figura VII.) apparet to-ta tubulosa, & tubulis rectis, & perpendicularibus a basi per corpus universum Plantae assurgentibus, ut accidit in pedunculis variarum Plantarum palustrium, & praesertim Nymphaeae. Quum hodie Corallia, Madre-porae, & res quamplures aliae marinae, quae inter Plantas referebantur, modo e regno Florae ereptae sint, & ad Faunae regnum sint amandatae, seu inter nidos Vermium, aut inter Polypos referantur, diligenter perscru-tatus sum hujusmodi Tubulos, an Vermiculum aliquem continerent, at ne vestigium quidem ullum animantis cujusdam intra hos Tubulos reperi; Quare cos puros, & simplices Tubulos esse vidi, qui aquam marinam tantum continebant, ut in Pedunculis Foliorum Nymphacae aqua palustris tantum continetur. Praeterea in Apicibus, qui per digitos hujus manus dispersi sunt (Fig. VI. & VII. aaaaaa) Fructificationem, seu Florem quemdam inveni, qui lente vitrea auctus Fig. VIII. cernitur, cujus pedunculus in b. geniculatus est. Flosculus iste sex Staminibus rubicundis constat c. c. & singula apicem habent slavum. Flores isti a Ginannio pro totidem Papillis, quibus Planta alimentum sugere possit habentur.

Verum

Verum a basi per Tubulos alimentum sugere potest; ut reliquae plantae sugunt, & per stamina illa genus suum propagare, ut propagant Plantae omnes terrestres.

Haec sunt, Jannelli Amicissime, quae modo ad Te mitto, quae, si lubet, cum Academicis Physiocriticis communicare poteris, ut in corum Acta referant. Vale. Datis Arimino A. D. IX. Kal. Majas Anno a Christo nato CIO IO CCLXIII.



# Figurarum Explicatio?

Fig. I. A. Tethyum I. sphaericum Malum Aurantium Lusitanicum referens. B.B. Petrobrya, quibus arcte haeret.

Fig. II. A. Hemisphaerium Tethyi Horizontaliter disseeti, ut cetnantur sibrae olieae radiatim, & in directum

a centro ad circumferentiam protensae.

Fig III. A. Tethyum II. Cartilagineum cavum vulgo Tamarognolo. B. Os superius Tethyi. C. Os inferius ejuschem. D. Petrobrya quibus arcte haeret.

Fig. IV. A.A.A. Ventriculus Tethyi II. B. Os superius. C. Os inferius. D. D. Caro quaedam Tethyi, seu vi-

scea Fulvi coloris, & punctis notata.

Fig. V. A.A.A. Idem Ventriculus Tethyi II. carne exemtus, cujus membrana est coloris purpureo-violacei sordidi, & quae sibras quasdam transversales habet. B. Os superius. C. Os inferius.

Fig. VI. A.A. Manus marina integra apices innumeros

seu stamina gerens a.a.a.a.

Fig. VII. A.A. Manus marina dissecta in b b. ut foramina Tubulorum cernantur. a a. a. a. Flores, seu A-

pices.

Fig. VIII. A. Flos, seu Apex avulsus, & lente vitrea auctus sex stamina c.c. gerens rubicunda, quae in Apice A. sunt slava. b. pedunculus geniculatus.

#### OSSERVAZIONI

SULLA CADUTA DELLE PIOGGE

#### NELLA CITTA' DI SIENA

DALL' ANNO 17.55. AL 1763.



L Reverendo Padre Giuseppe Asclepi della Compgnia di Gesù, Socio della nostra Accademia, sin dall' anno 1755. intraprese a misurare l' annua quantità della pioggia, che cade in questa nostra Città, e continuò le sue Osservazioni per cinque interi

anni, dopo i quali essendo stato chiamato a Roma dai Superiori della sua Compagnia per adempire le veci del celebre Padre Boschovich raccomandò la continuazione di queste sue Osservazioni all' Accademia. Questa sull' esempio delle Accademie di Parigi, e di Londra ha commessa una tal continuazione a due de' suoi Membri, i Signori Canonico Ansano Luti, e Dottor Candido Pistoj, i quali hanno continuato le Osservazioni del Padre Asclepi per tre anni, e le proseguiranno per altri due assine di poter rilevare da questo decennio l'annua quantità media della pioggia, che cade in questa Città, e trarne in tal guisa il vantaggio di meglio conoscene l' indole del nostro Clima.

Il Padre Asclepi da i cinque anni delle sue Osfervazioni conchiuse, che la quantità media della pioggia per ogni anno era di pollici Parigini 33. l: 4. = e

F f confi-

considerando poi separatamente le piogge di ciascuna Stagione ritrovò, che la Media dell' Autunno era di linee 152., quella del verno di linnee 90.; quella della Primavera di linee 90. — e quella della State di linee 67. 2 Onde tralle Stagioni la piu abbondante di piogge è presso di noi l' Autunno: a questo succedono in egual misura il Verno, e la Primavera: e finalmente la State è la piu scarsa al contrario di quello, che avviene a Parigi, ove le piogge della State superano stabilmente, e talvolta ancor del doppio quelle di tutto il rimanente dell' anno. Tra i Mesi un' anno per l'altro il piu piovoso è stato il Settembre: prossimo a questo l' Ottobre, e in terzo luogo il Dicembre; il meno piovoso è stato l' Agosto, indi il Gennajo, e in terzo luogo il Febbrajo.

Quando sarà terminato il decennio di queste Osservazioni, l'Accademia potrà piu precisamente determinare l'annua quantità Media della piogga per ogni stagione: e in tanto espone qui la misura satta per otto anni continui, Mese per mese, Stagione per stagione, Anno per anno, principiando dal primo di

Marzo 1755. sino a tutto Febbrajo 1763.

### Piogga caduta dal i. Marzo 1755. a tutto Febbrajo 1756.

Meli (^ ·	Pollici	Lince
Marzo	4.	, <b>3.</b> _ 6
Aprile	-	Y. 2
Maggio	1 2.	3.
Giugno .	1.	5.
Luglio	€ 20	<u>t</u> . 1
Agosto	- Inner	10.
Sectembre	a?• <b>3•</b>	galantele - nn -
Ottobre	6.	11. 1 z
Novembre	` <b>5•</b>	7. =
Dicembre	4.	-
Gennajo	-	5.
Febbrajo	-	6. 1/2
		· ·
Primavera	6.	7. 1/2
State	4•	3. 2
Aucunno	15.	7.
Verno	4.	11. $\frac{1}{2}$
In tutto l' Anno	31.	5, <u>1</u>

#### Dal 1. Marzo 1956. a tutto Febbrajo 1758.

Pollici	Linee]
2e-	3-
-	19.
r.	\$. \frac{1}{2}
<del>5</del>	3. ~
. 2.	5
ī.	¥
4.	2. <u>1</u>
, 2.	10. 1
₹ <b>1</b> •	7. = 3
,2.	6.
4.	Iľ.
1,	I. 2
4.	9. 2
3•	8. $\frac{r}{2}$
8.	8. <u>t</u>
8.	8. $\frac{t}{2}$ 6. $\frac{t}{2}$
25.	
	2. I. 2. I. 2. 4. 2. 4. 3. 8. 8.

#### Dal 1. Marzo 1757. a tutto Febbrajo 1758.

<b>M</b> esi ,	Pollici	Lince
Marzo		7. 6.4. 1.5
<b>A</b> prile	3•	$7 \cdot \frac{3}{2}$
Maggio	4.	3• 👉 💢
Giugno	<b>3</b> •	8
Luglio	· I.	6
Agosto	I.	3•
Settembre	6.	en d'a de di
Ottobre	2.	112-1-10
Novembre	I.	5: -:,,,,
Dicembre	- 4•	9. 1
Gennajo -	I.	10.
Febbrajo	4.	6. <del>1</del>
Primavera	\$.	$5 \cdot \frac{r}{2}$
State	6.	5.
Autunno	10.	4.
Verno	ET.	z. 100 (A.
In tutto l' Anno	3б.	4. 3

Dal 1. Marzo 1758. a tutto Febbrajo 1759.

MeG	Pollici	Linee 1
Marzo	2.	5.
Aprile	4.	7.
Maggio	2.	<b>3•</b> '
Giugno ·	* 4.	I. "
Luglio	2.	6. £
Agosto		3. ± 1
Settembre	6.	1.
Ottobre	2.	11.
Novembre	<b>5°</b>	3. <u>F</u>
Dicembre.	2.	6.
Gennajo	-	g.
Gebbrajo	(Interession)	8. <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Primavera	9.	3.
State .	б.	11.
Autunno	15.	3. $\frac{3}{2}$
Verno	3.	7. <u>x</u>
In tutto l' Anno	35-	1.

1 1

#### Dal 1. Marzo 1759. 2 tutto Febbrajo 1760.

Meli	Pollici	Linee .
Marzo	£,	6. ½
Aprile	2.	11. 2
Maggio	3•	1. 1/2
Giugno	1.	4. 1
Luglio	3• ·	5
Agosto	1.	11.
Settembre	4.	6.
Ottobre	б.	3•
Novembre	2.	9•
Dicembre	6.	max
Gennajo	· = I.	5. ±
Febbrajo	ı.	10.
Primavera	<b>s.</b>	7 2
State	6.	9.
Autunno	13.	б.
Verno	9.	3. = 2
In tutto l' Anno	38.	2.

Dal 1. Marzo 1760. a tutto Febbrajo 1761.

Mesi	Pollici	Linee
Marzo	12.	6. 1
Aprile	2.	3.
Maggio	2.	8.
Giugne	ī.	10.
Luglio	2.	5• -
Agosto	1.	$7.\frac{3}{4}$
Settembre	4.	7. $\frac{3}{4}$ 8. $\frac{1}{3}$
Ottobre	5.	3.
Novembre	· 2.	$6.\frac{r}{3}$
Dicembre	· I.	10 1
Gennajo	Comm	4. 2
Febbrajo	همن	$10\frac{1}{3}$ $4 \cdot \frac{2}{3}$ $5 \cdot \frac{1}{11}$
Primavera	17.	S- 1
State	5•	5. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{3}{4}$ 5. $\frac{2}{3}$ 8. $\frac{1}{11}$
Autunno	120	5. 2
Verno	2,	3 <b>8.</b> <u>1</u>
In tutto l' Anno	38.	6. $\frac{1}{132}$

## Dal 1. Marzo 1761. a tutto Febbrajo 1762.

Mefi	Pollici	Linee
Marzō £	u I	11. 6
Aprile !	3.	3. II
Maggio	3.	10. 3
Giugno.	· 4.	3. 11
Luglio "	.:	1, 2
Agoito	-	1. $\frac{2}{3}$ 7. $\frac{3}{4}$
Secrembre	I.	6. 12
Ottofre	. 4.	1. <sup>1</sup> / <sub>6</sub>
Novembre	12.	6. 11
Dicembre	4.	- E
Gennajo [	1.	3. Z 3. Z
Febbrajo	· 20	3
		4
Primavera	9•	2
State	<b>5.</b>	5 6 2
Autunno	18.	, ,
	G.	3.
Verne		4. 2
In tutto l' Anno	38.	8. <u>11</u>

#### Dal 1. Marzo 1762. a tutto Febbrajo 1763.

Meli :	Pollici	Linee
Marzo .	. <b>S</b> o	3. 4
Aprile	t Tr	5 11
Maggio	4+	4 5
Giugno	. 2.	4.
Luglio		<b>7.</b> (iii)
Agosto		11. 12
Settembre	1. 1.	· -51
Ottobres	8.	7. 3/4
Novembre		11. 3
Dicembre		:7•
Gennajo	2.	31, 3/4
Gebbrajo	<b>9.</b>	8. 5.
Primayera .	7.	1, 2
State '	4.	10. 11
Autunno	II.	-
Verno	5.	3. 12
In tutto P Anno	2 <b>8.</b>	4. 7

# PROBLEMA

SCIOLTO DAL SIGNORE DOTTORE

### CANDIDOPISTOJ

Dato il quadrante BFDA ritrovare, nel raggio AD prolunde gato se sa bisogno un punto tale, dal quale si possa tirare all'arco del quadrante diviso in parti eguali il maggior numero di linee che sia possibile, te quali sieno in una progressione aritmetica, della quale il primo termine sia e.g.
ED, e l'ultimo EB.



Ia E il punto che si cerca (Tav. IX.

Fig. 1.) e si chiami DE = x, AB = a.

Dal punto E si tiri all'altra estremità B del quadrante la linea EB,
indi al punto F, che è alla metà
del quadrante si conduca la retta
EF, e dal punto F abbassata la perdendicolare FO al raggio DA, sarà

FO il seno dell'arco di 45. gradi, e petò eguale ad OA; sicche tirata FA, per la proprietà del triangolo ret-

tangolo FOA (arà FO=  $y = y = FA^2 = y = 3$ )  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ 

ta -) a ; AE = a tx; EB = y'xxfzaxfzaa; EF = y xxtzax zx

Fd essendo vella progressione Antinetica
la somma degli estremi eguale al doppio

del medio sarà l'equazione EB+ ED= 2EF, ed in ter-

assimetria sara primieramente 2xx + 2ax + 2x 3xx + 2ax + 2aa 4xx + 8ax - 8x 3aa + 8aa , dalla quale togliendo i termini comuni, e dividendo per 2 sarà

drando sarà

 $x^{4} + 2ax^{3} + 10a^{2}x^{2} + 16a^{3}x + 8a^{4} + 8xx + 2a^{3}x + 2a^{4} + 8ax$   $y^{2^{2}}_{ax+ax+a} = x^{4} + 6ax^{3} + 15a^{2}x^{2} + 18a^{3}x + 9aa, e \text{ levando i termini comuni rettara}$   $8xx y^{2^{2}}_{ax+ax+a} = 4ax^{3} + 5aax + 2a^{3}x + a^{4}, e$ 

quadrando un altra volta

3 2 a a x 6 † 1 2 8 a 3 x 5 † 2 2 4 a 4 x 4 † 1 9 2 a 5 x 3 † 6 4 a 6 x 2 = 16 a 2 x 6

† 40 a 3 x 5 † 4 1 a 4 x 4 † 2 8 a 5 x 3 † 1 4 a 6 x 2 † 4 a 7 x † a 8 dalla quale levando i termini comuni relterà

16 a 2 x 6 † 8 8 a 3 x 5 † 1 8 3 a 4 x 4 † 16 4 a 5 x 3 † 5 0 a 6 x 2 - 4 a 7 x - a 8 = 0

1a quale divisa per 16 a a diventerà

x 6 † 8 8 a x 5 † 1 8 3 a 2 x 4 † 1 6 4 a 3 x 3 † 5 0 a 4 x 2 - 4 a 5 x - a 6 = 0

Per liberar poi l'ultima equazione dalla frazione si faccia

 $x = y_3 x^2 = y_3; x^3 = y_3; x^4 = y_4; x^5 = y_5; x^6 = y_6$  e si sostituiscano questi valori della x, e sue potettà, e diventerà  $y^6 + 88ay5 + 183a^2y4 + 164a3y3 + 50a4y^2 - 4a5y - a^6 = 0$ ,

e moltiplicando per 4096 farà  $y^6 + 2ay^5 + 183a^2y^4 + 656a^3y^3 + 800a^4y^2 - 256a^5y - 256a^6 = 0$ ;
e dividendo per yy + 8ay + 16aa = 0 relterà finalmente

114

y+† 14ay3† y 5a²y²-8a³y-16a4 = o la qual equazione non è divisibile per alcun altro divisiore nè lineare, nè di alcuna dimensione, sicchè per averne le sue radici converrà costruirla per l'intersecazione di due curve; s' introduca perciò nell' equazione una nuova incognita facendo yy† 7ay = a²; onde sarà I. yy† 7ay az = o Per aver poi il valore dell' y+† 14ay3 dato per le z si faccia il quadrato di yy† 7ay = az, che sarà y+† 14ay3 = aazz-49aayy, sicchè posto il valore d' y+† 14y3 nell'equazione y+† 14y3 &c. Averemo

II. zz†6yy 8ay-16a2 = 0 e sostituito in questa il valo-

re dell' yy preso della prima

III. 22 †6a2-50ay-16aa= 0, e sottratta da questa la pri-

IV. 22†7az 57ay yy 16aa= o ed aggiunta la terza alla prima nascerà la

V. zz + 5az-43ay+99-16aa = 0

La prima di queste equazioni, come ben si vede è alla parabola, e la quinta è al cerchio; perciocchè mandando dall' altra parte l' yy-43ay-16a², ed aggiugnendo ad ambi i membri il quadrato 25aa sarà

zz† 5az† 25aa= 16aa† 25aa-yy† 43ay, e facendo z† 5a=

pp = 89aa-yy + 43ay, e rendendo positivo l' yy averemo

99-43 ay = \$ 9 aa- pp, ed aggiunto ad ambi i membri 'l quadrato della metà del coefficiente del secondo termino sarà

3y-43ay + 1849aa = 89aa + 1849aa pp, e fatto y-43a = 9

Sarà

Parabola e 49aa

Questa Parabola adunque segherà il cerchio in due punti, che saranno N ed V e così ci sa sapere che

Questa Parabola adunque segherà il cerchio in due punti, che saranno N, ed Y, e così ci sa sapere che la nostra equazione ha due valori immaginari, e due reali, de' quali uno è positivo l'altro è negativo, il positivo è TQ, e il negativo è GN il primo =y, il secondo =-y; ma si è satto x=y, onde se si prenda

la quarta parte delle y, cioè la quarta parte di TD e la quarta di GN si avrà la ricercata DE positiva e negativa. Noi piu sopra abbiamo divisa la nostra equazione del sesto grado per il quadrato w + 8 ay + 16 aa la quale ci da il valore negativo y = -4a, e per conseguenza x=-a, sicche anche il centro è un punto che sodissà alla domanda.

Si sono avuti i valori della x sin qui col mezzo della prima, e della quinta equazione una alla Parabola, e l'altra al cerchio, si possono per altro avere gl'istessi prendendo la quarta, e la quinta; questa al cerchio, e quella all'Iperbola equilatera; poichè aggiunto nella quinta il quadrato 49aa ad ambi i me-

bri ( resi prima positivi i termini che erano negativi) sarà zz + 7az + 49aa = yy + 57ay + 163aa, e fatto z + 7a = 1

u sarà uu = yy + 57ay + 113aa, ed aggiunto ad ambe le parti il quadrato 3136aa sarà uu + 3136aa = yy + 57ay + 3249aa, e sostituito y + 57a = r rimarrà uu = rr - 3136aa equazione come si vede all' Iperbola Equilatera prese l'assisse dal centro.

Per costruirla adunque, fatto il cerchio del raggio  $AB = y_{\frac{969aa}{2}}^{\frac{969aa}{2}}$  Tav. 9. Fig. 3., e presa  $AC = \frac{5a}{2}$  sa sa-

rà C il principio delle z, laonde calata  $CE = \frac{43a}{43a}$ , e tirata la TE Parallela al diametro BZ, su la TE si dovranno prendere le y. Di poi presa sopra CE prolungata la DE = 57a, e parimente presa verso E

dal punto D la D2 eguale a 56a, che sarà il semi-

diametro trasverso dell' Iperbola, il punto 2 sarà suori del cerchio; Poiche il quadrato CX essendo eguale al rettangolo ZCB, cioè = 1913aa, EX sarà eguale alla y 191300 - 430, la quale si vede chiaramente esser eguale ad una quantità minore di a, sicche EXiè minore di EQ, che è = a, adunque il punto 2 è fuori del cerchio. Fatta per tanto col semidiametro trasverso D2= 56a l' Iperbola equilatera M2M, questa taglierà il cerchio da una parte sola ne' due punti O s ed in fatti che non lo tagli dall' altra parte è chiaro, osservandos che EK è maggiore di EN; poichè essendo il quadrato PN eguale al rettangolo TPU, = 89aa farà  $EN = \sqrt{89aa - 5a}$ , ed  $\frac{2}{FD}$  per la proprietà dell' Iperbola equilatera essendo eguale a 113aa, sarà I' istessa  $EK = \sqrt{11348}$ , che si vede chiaramente esser maggiore di EN; che poi tagli il cerchio dalla parte opposta è chiaro osservandosi che alla PN, o PS va aggiunta la PE; adunque lo taglierà ne' due punti O e però le TO saranno le y una positiva, e l'altra negativa tanto nel cerchio, quanto nell' Iperbola. Questo serva per conferma che la nostra equazione ha due radici reali una positiva, e una negativa, due radici immaginarie, e due eguali fra loro, ed eguali al raggio del dato quadrante. I punti adunque da prendersi nel raggio del quadrante proposto saranno il cen-tro Tav. 9. Fig. 1., e i due punti E, ed e Rimane adesso ad esaminare, se il punto E già

Rimane adesso ad esaminare, se il punto E già ritrovato serva per le sole tre linee, ED, EF, EB, ovvero se da questo punto E si possano tirare altre linee a parti eguali del quadrante intermedie alle tre accen-

nate

nate, che formino colle medesime una progressione aritmetica. Per veder ciò si risletta, che volendo tirare a parti eguali del quadrante cinque linee, che vengano a formare una progressione aritmetica, il punto per queste, o sarà il già ritrovato punto E, ovvero un altro da questo diverso. Se dunque sia tale, cioè diverso dal punto E, anche in questo si versicherà, che la somma della prima, e dell' ultima delle cinque linee è il doppio di quella di mezzo; questa condizione poi forma l'essenza della nostra prima equazione, onde ella dovea darci alla fine nella sua costruzione tutti quei valori, per i quali la somma degli estremi è uguale al doppio del medio, e pertirar le cinque; ma non ne ha dato, che uno solo positivo, e uno negativo, adunque il punto per le cinque linee e il già ritrovato punto E, o non vi è del tutto. Il discorso, che abbiamo fatto per le cinque, si puo applicare per sette, per nove, per undici, e così all'infinito. Laonde il punto E già ritrovato odovrà servire per tre sole, o per tutte le altre di qualunque numero purche dispari, che da esso si tirino al quadrante diviso in numero pari.

Di più il ritrovato punto E o dovrà servire per quattro, per sei, per otto, e così all'infinito, o per celle non vi è. Che deva servire per quattro, per sei, per otto &c. Si dimostra così; Noi abbiamo veduto poci anzi, che dovrebbe servire per sette, per undici, per 15. servendo per sette è chiaro, che dovrebbe servire anco per quattro; perche fra i medessimi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che sono in una progressione aritmetica, vi sono ancora i quattro termini 1, 3, 5, 7, che sono pure in progressione aritmetica. Come ancora nella propressione

gressione aritmetica, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, vi sono i sei 1,3,5,7,9,11, che sono pure in progressione
aritmetica. Se poi se ne prenderanno quindici in progressione aritmetica, fra questi se ne troveranno 8 nella stessa progressione. Colla stessa industria si troveranno numeri dispari di termini, nei quali si potranno trovare gli altri numeri pari dieci, dodici &c. Adunque il
punto E già ritrovato o dovrà servire per le sole tre,
o per qualunque altro numero dispari, e pari di linee, cioè per tutte.

Vediamo adesso, se il punto E, che sicuramente serve per tre linee in progressione aritmetica, serva ancora per quattro, che sieno nella stessa progressione; che se il punto per quattro non sarà diverso dal ritrovato punto. E, si dovrà concludere, che il punto per tre dovrà servire per tutte.

Imperciocche servendo per quattro è chiaro, che

serve ancora per tredici, perche nella serie aritmetica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vi sono ancora i quattro numeri 1, 5, 9, 13, che sono in progressione aritmetica, e vi sono pure i cinque numeri 1, 4, 7, 10, 13, che sono in progressione aritmetica; parimente se il punto E serve per cinque servirà anche per ventuno, e per conseguenza anche per sei, poiche nella serie aritmetica. metica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vi fono i sei numeri 1, 5, 9, 13, 17, 21, che formano anch' essi una serie aritmetica; con la stessa industria si troverà, che il punto, che serve per quattro, serve per tutte le altre. Adunque se il punto E già ritrovato ci verrà dato con altra equazione anche per le quattro, il punto E servirà per tutte, e se que-sta equazione non ci darà il punto E sarà segno, che il punto E serve per le sole tre, e che per le altre

di qualunque numero, o pari, o dispari, che sia, è assatto

impossibile.

Poiche siccome noi porremo fra poco l' equazione per quattro linee facendo la somma della prima coll' ultima uguale alla somma delle due medie, la costruzione della finale equazione ci dovrà dare tutti quei punti, dai quali tirate quattro linee al quadrante diviso in tre parti eguali, la somma della prima coll' ultima venga sempre ad essere eguale alla somma delle due intermedie.

S' avverta per altro, che questo puo esser vero in molti casi nei quali le quattro linee non sieno in progressione aritmetica; come per esempio nelle quattro grandezze 1,3,4,6, si verifica, che la somma delle due estreme è uguale alla somma delle due medie, benchè non sieno in una progressione aritmetica. Per altro tra i valori, che ci darà la costruzione della sinale equazione, dovrà esserci anche quello, che serva per le quattro grandezze in progressione aritmetica, e questo non dovrà differire, come dissemo, dal già ritrovato per le tre. Che se poi tra quei valori non ve ne sarà uno, che sia eguale alla ritrovata linea DE che serve per le tre comcluderemo Tav. 9. Fig. 1.che tutti quei valori servono per quei casi, nei quali la somma delle estreme è uguale alla somma delle due medie, che per altro non sono in progressione aritmetica, e che per questo caso delle quattro linee in progressione aritmetica non v'è valore di sorta alcuna. Vediamo adunque

Dato il quadrante BEOC. Fig. 4. ritrovare nel raggio AC. prolungato, se sa bisogno, un punto D tale, da cui tirate all' arco del quadrante diviso in tre parti eguali le quattro linee DC, DO, DE, DB, la somma delle due estreme sia eguale alla somma delle due medie. Sia

Sia  $\mathcal{D}$  il punto, che si cerca, e si chiami  $\mathcal{DC}$ = x', AC raggio del quadrante = a. Dal punto D si tiri all' altra estremità B del quadrante la linea DB; indi dal punto O, che è la terza parte del suddetto quadrante, si conduca la retta BO, e dal punto O abbassata OF per pendicolare al raggio AC, sarà OF il seno di 30. gradi, e però = a. parimente dal medesimo punto  $\mathcal D$  si conduca al punto E, che è l'altro punto, che divide il quadrante in tre parti eguali, la retta DE, e dal punto E abbassata la perpendicolare EG al medesimo raggio AC, sarà EG seno di 60. gradi. Inoltre dal punto E si abbassi la E2 perpendicolare al raggio AB. questa essendo il seno di 30. gradi, sarà  $=OF=\frac{a}{2}$ ; e però condotta dal centro A la retta AE,  $farà EG = y^{\frac{3aa}{4}}$  Dal punto O poi si conduca OP perpendicolare al medesimo raggio AB, che essendo seno di 60. gradi sarà  $= EG = \sqrt{\frac{3\pi a}{4}}$ . Sicchè ancora la FA farà =  $y^{\frac{3\pi a}{4}}$  e confeguentemente la FD = a + x - asarà  $DE = \sqrt{xx + ax + aa}$ ; e finalmente la  $DB = \sqrt{xx + 2ax + 2aa}$ . Ed essendo per la condizione del Problema la somma degli estremi eguale alla somma de' medi sarà l'equazione DC+DB = DO+DE, e mella in termini analitici  $x+\sqrt{xx+2ax+2aa} = \sqrt{xx+ax+aa} + \sqrt{xx+2ax+2aa-ax}\sqrt{3-aa}\sqrt{3}$ , da cui dovendosi levare l'assimetria, sarà, quadrando per la prima volta,  $\frac{1}{2xx+2ax+2aa+2x}$   $\frac{1}{xx+2ax+2\cdot a}$  =  $\frac{2xx+3ax+3aa}{2xx+3ax+3aa}$ 

GX

245  $-axy_3 - aay_3 + 2\sqrt{x+3}ax^3 + 5aaxx + 4a^3x + 2a^4 - ax^3y_3$ - 2aaxxy3-2a3xy3-a4y3, dalla quale togliendo i termini comuni, farà 2x 1 xx + 2ax + 2aa - 2 x4 + 3ax3 + 5aaxx + 4a3x + 2a4 - ax3y3 - 2aaxxy3 - 2a3xy3 a4y3 = aa + ax - axy3- aay3, e di nuovo quadrando, averemo 8x4 + 20ax3 + 28 aaxx + 16 a3x + 8 a4 - 4 ax3 y 3 - 8 aaxx y 3 - 8 a3x y 3 - 4 a4y 3 -8x x6+5ax5+13aax4+20a3x3+20a4xx+12a5x+4a6 - ax5= 4aaxx + 8a3x + 4a4 - 2aaxxy 3 - 4a3xy 3 - 2a4y 3, cioè le-

 $= y_3 - 4aax^4y_3 - 8a^3x^3y_3 - 9a^4xxy_3 - 6a^5xy_3 - 2a^6y_3 =$ vando i termini, che si dittruggono, sarà 8x1+20a- $-x^3 + 24aaxx + 8a^3x + 4a^4 - 4ax3y_3 - 5aaxxy_3 - 4a^3xy_3 - 2$  $a^4y_3 = 8x \sqrt{x^6 + 5ax5 + 13aax4 + 20a^3x^3 + 20a^4xx + 12a^5x + 4a^6}$ 

 $-ax5y_3 - 8a3x3y_3 - 9a4xxy_3 - 6a5xy_3 - 2a6y_3$ , e dividendo per 2. resta

4x4+10ax3+12aaxx+4a3x+2a4-2ax3y3-3aaxxy2-

 $2a^3x/3 - a4y3 = 4x/x675ax57.3uux4720a3x3720a4xx712a5x7$ 

4a6 - ax5y3 - 4aax4y3 - 8a3x3y3 - 9a4xxy3 - 6a5xy3 - 2ayz; e di nuovo quadrando avremo 16x8 † 80ax7 † 208a ax6+308a3x5+291a4x4+184a5x3+94a6xx+28a7x+9a8 -16ax7  $\sqrt{3} - 64aa^{x6}\sqrt{3} - 124a_3^{x5}\sqrt{3} - 136a^{4x4}\sqrt{3} - 100a^{5}x^{3}\sqrt{3} 52a6xxy_3 - 16a7xy_3 - 4a8y_3 = 16x^8 + 83ax^7 + 208aax6+320$  $a_3x_5 + 3_20a_4x_4 + 19_2a_5x_3 + 6_4a_6x_x - 16a_x_7y_3 - 6_4a_x_6y_3 - 128a_3x_5y_3$ - 14494x4y3- 9695x3y3 - 3296xxy3; dalla quale levando i termini communi, resta 12a3x5†2ya4x4†8a5x3 - 30a6xx - $28a_7x - 7a_8 = 4a_3x_5y_3 + 8a_4x_4y_3 - 4a_5x_3y_3 - 20a_6x_5y_3 - 16a_7x_5y_3$ - 4081/3, e dividendo per a3 sarà

12x5+29ax4+8aax3 - 30a3xx - 28a4x - 7a5 = 4x5y3+8ax4y3 - 4aa $x_3y_3 - 20x_3xxy_3 - 16a4xy_3 - 4a5y_3$ , e finalmente quadrando farà 144x10 + 696ax9 + 1033aax8 - 256a3x7 - 2348a4x6 - 2272

a3x5+46a6x4+1568a7x3+1204a8xx+392a9x+49a10 = 48x10+1924x9+ 9644x8 -67243x7 - 129644x6 - 384e3x5+139246x4+201647x3+1248 a8xx † 384a9x † 48a10, e levando i termini communi, e paragonando l'equazione al Zeros, si avrà 96x10+504ax9+937aax8+416a3x7 - 1052a4x6 -1888a5x5 - 1346a6x4 -44807x3 - 4408xx + 809x + 0 10= 0 i e dividendo per 96 per liberare dai coefficenti la x 10 farà x10 + 504ax9+937aax8+416a3x7 - 1052a4x6 -1888a5x5 - 1346a6x4

96

448a7x3 - 44a8xx+8a9x+a10

Per poter liberare dalla frazione l' equazione si faccia = zz, e così di mano in mano, x = z; xx fará

fintanto che si giunga alla x 10, che

solstituito in luogo della s, e sue potenze nell' equazione la z &c, sarà

504029 69253399582448026 . 46 66483263599150104576 9370028 75144747810816 . 96 188 0525 448a7 23

84934656. 96

9216 . 96 884736 . 96 = 0, e moltiplicando per il denominatore del primo termine,

farà

210

 $z^{10} + 504az^9 + 89952aaz^8 + 3833856a^3z^7 - 93074272a^4z^6$   $- 160356630528a5z^5 - 10974916509696a^6z^4 - 350$   $675489783808a^7z^3 - 3306368903675904a^8zz + 57711$  $166318706688a^9z + 692533995824480256a^{10} = 0$ 

1663 18706688 a<sup>9</sup>z † 692533995824480256a<sup>10</sup> = 0

Si sono cercati tutti i divisori lineari dell' ultimo termine, e per z più, o meno ciascuno di essi si è tentata la divisone, la quale si è trovato succedere non per altro divisore, che per z † 96a sino a sei volte, cioè si è trovata divisibile per z † 96a, e in fatti divisa per z † 96a, resta

24 —72az3 — 6816aazz † 18432a3z † 884736a4 = 0 la quale, come dissi, non essendo divisibile non solo per altri divisori lineari, ma ne tampoco per divisori d'altro grado, si tenti se può risolversi per mezzo dell'intersecazione di due Curve, per averne le sue radici. S'introduca pertanto nell'Equazione una nuova incognita, per indiavere due Equazioni, ciascuna delle quali contenga ambe l'incognite, e tutte due assieme le cognite tutte dell'Equazione proposta, e sia questa y. si faccia adunque l'equazione

I.  $zz = 36a^z = ay$ e quadrando, affine di avere il valore di  $z^4 = 72az^3$ ,
e sostituirlo nella finale Equazione, sarà  $z^4 = 72az^3$ † 1296aaz = aayy, e  $z^4 = 72az^3 = aayy = 1296aazz$  e
sostituito nascerà quest' altra Equazione

II. W - 811222 † 18432az † 884736aa = 0 e ponendo in luogo di zz il suo valore dato dalla prima Equazione, cioè ay † 36az, nascerà la

III. yy - 8112ay - 273600az + 884736aa = 0 da cui finalmente, se si sottragga la prima ridotta al zero, cioè zz - 36az - ay = 0, ed indi ad essa si aggiunga, nel primo caso nascerà la

IVyy — \$111ay — zz — 273564az † 884736aa = 0
e nel fecondo la

V. yy — \$113ay — 273636az † zz † 884736aa = 0
Si prenda la prima, e l'ultima Equazione. Egli è chiaro esser la prima una Equazione alla Parabola, poichè aggiunto ad ambi i membri dell' Equazione il quadrato della metà di 36a, sarà zz - 36az † 324aa = ay † 324aa, e fatto z — 18a = q, ed y † 324a = p, sarà qq = ap. Equazione alla Parabola Apolloniana. L'ultima Equazione poi, cioè la quinta, che è yy — 8113ay — 273636az † zz †884736aa = 0, è un Equazione al Cerchio. Imperciocche mandato dalla parte del zero la quantità zz — 273636az † 884736aa, ed aggiunto il quadrato satto dalla metà di 8113a secondo termine sarà yy - 8113ay = -zz † 273636az † 884736aa = -zz † 273636az †

6228182500, e fatto  $y - \frac{4}{8 \cdot 130} = p$ , farà pp = -zz

†273636az † 62281825aa, e mandando dall' altra par-

te  $-zz^{\dagger}$  273636az, e da quest' altra pp, affine di render positivo zz, e di lasciare da una sol parte zz -273636az, sarà zz  $-273636az = -pp^{\dagger}$  62281825aa; ed

aggiungendo parimente il quadrato fatto dalla metà del secondo termine, cioè di 273636a, sarà zz - 27. 3636az † 18719165124aa = -pp † 74938942321aa, e fat-

 $to^2 = 136818a = q$ , fara qq = -pt + 74938942321aa. Equa-

zione al Cerchio.

Col

Col raggio adunque AB = y7493894232100 fi descriva il

Cerchio BCDE Fig. 5. e si prenda dal centro A verso  $\mathcal{D}$ ,  $AF = \frac{8^{11}3^a}{2}$ , e dal punto F si abbassi la perpendicolare  $F\mathcal{Q}=\frac{2}{3}$  136818a, la quale, come con dimostrazione farò vedere, esce fuori del Cerchio. imperocche il rettangolo di BF in  $F\mathcal{D}$ , cioè ponendolo in termini Analitici di  $\mathcal{Y}^{\frac{749389423210a}{4}}$  + 8113a in  $\mathcal{Y}^{\frac{749389423210a}{4}}$ 

- 8113a è eguale al' quadrato dell' ordinata FT, ma

questo rettangolo è minore del quadrato fatto da 135818a = F2, poiche facendo il rettangolo viene ad eliere 74873121552aa, ed il quadrato di 136818a è

74876660496aa, che chiaramente si vede esser mag-

giore di quello, dunque ancora il quadrato dell' ordinata FP sarà minore del quadrato 74876660496aa,

e per conseguenza la radice di questo maggiore della radice di quello, onde FP è minore della F2 = 136818a, ciò che si doveva dimostrare. Dal punto 2 si tiri la retta 2K parallela al diametro del Cerchio, prolungandola quanto uno vuole, e dal medesimo punto 2 sulla retta F2 si prenda un pezzo di detta linea p. e. 2R = 18a, la quale dico, che entrerà nel Cerchio: imperciocche se io dimostrerò, che il quadrato dell' ordinata FP è maggiore del quadrato fatto da F2 -2R, cioè da 136818a - 18a, sarà segno evidente, che la quantità 18a = 2R è maggiore della quantità P2 eguale alla radice della quantità, che rimane dalla sottrazione satta del quadra to

LI

## $74873121552aa = FP^2$ dal quadrato 74876660496aa,

=  $F \bigcirc^2$ . Sottratto pertanto 18a dalla quantità 1368 18a; rimane 136800a, la quale moltiplicata in se stessa affine di avere il quadrato, da per prodotto 1871424 00000aa, che è minore di 74873121552aa=  $\overline{F}P^2$ , e

per conseguenza la radice di quello minore della radice di questo, dunque 18a è maggiore della radice della quantità, che rimane dalla sottrazione satta del quadrato 74873121552aa dal quadrato 74876660496aa

sicchè presa 2R = 18a, questa entrerà nel Cerchio. Per lo punto R si tiri ORZ parallela al diametro prolungandola, quanto uno vuole, ed indi su di questa si prenda RI = 324a, la quale, dico, che non scappa suori del Cerchio; poichè condotta la retta CAE per il Centro, il rettangolo di CS in SE, cioè ponendolo in termini Analitici di  $\sqrt{74938942321aa}$  † 1368

00a in 174938942321a2 - 136800a è eguale al quadrato

della sua corrispondente ordinata SO, ma facendo il rettangolo, e poi cavando, se non la vera, almeno la prossima radice, ed inoltre da questa medesima radice sottraendo 8113a = AF = SR, ritroviamo, che

il resto = RO è maggiore della quantità 324a = RI; dunque la RI = 324a resterà nel Cerchio e che sia vero, che ciò che rimane dalla sottrazione satta di 8113a dal-

la radice del rettangolo fatto da 174938942 21aa † 136800 a

nella medesima radice — 136800a, si faccia il rettangolo &c., e la sottrazione, e satto il rettangolo viene ad essere 81982321aa, della qual quantità la

radice prossima, giacche la vera non si puo cavare, è 9054a, e satta la sottrazione di 8113a, rimane 941a,

che evidentemente apparisce esser maggiore di 324a, dunque &c Vedutosi tutto questo al vertice I col parametro = a si descrivi la Parabola TIT, la quale passerà per lo punto 2; poichè il rettangolo fatto dall' assissa per lo punto 2; poichè il rettangolo fatto dall' assissa RI nel parametro a è = 324aa, ma 324aa è eguale ancora al quadrato di R2 = 18a, dunque la R2 sarà un ordinata della nostra Parabola, e per conseguenza dovrà &c. Rimane ora a sapersi in quanti punti il Cerchio vien tagliato dalla Parabola. Egli è chiaro, che tra i punti O, e 2 la Parabola taglia il Cerchio, dovendo essa passare per lo punto 2, siccome ancora è chiaro, che lo taglia in un punto dalla parte dell' ordinate positive della Parabola, dovendo essa Parabola uscire, nel prolungarsi, fuori del Cerchio; sicchè altro non ci resta a vedere, che se dalla parte dell' ordinate negative la Parabola torna a tagliare il Cerchio, il che potrebbe succedere, se la Parabola ritornasse nel detto Cerchio. Per saper questo si cavi la radice prossima, se non si puo la vera dal quadrato 74938942321aa = ĀE², e cavata la prossima,

giacche la vera non si puole, è 273749a, da cui sottratta la quantità 273600a = AS, rimane 149a = SE. si quadri questa quantità, e poi il quadrato si para-

paragoni col rettangolo fatto dall' assista SI nel parazimetro, che è eguale al quadrato della sua corrispondente ordinata; se da questo paragone si ricaverà, che il quadrato fatto da 149a è maggiore del rettan

golo fatto dalla nominata assissa nel parametro a, sarà segno evidente, che la Parabola è nel prolungarsi entrata di nuovo nel Cerchio. Si faccia pertanto il quadrato, e poi il rettangolo; satto il quadrato viene ad essere = 22201aa, ed il rettangolo di SI nel

parametro  $a = 876 \cdot aa$ , che moltiplicato per 2, affi-

ne di ridurlo al comun denominatore colla quantità 222010a, viene 17522aa, che chiaramente si vede es-

ser minore di 22201aa, dunque la Parabola entra di.

nuovo nel Cerchio, e conseguentemente lo taglia in due altri punti T, uno de' quali sarà avanti al punto E, e l'altro dopo, cioè la Parabola ritagliando il Cerchio, lo taglia avanti, e dopo l'ordinata AE. I valori adunque della nostra Equazione saranno cinque, uno avutosi dalla divisione di  $96a^6$ , che diviso per 96 ci da il centro, poichè per avere la x devesi dividere la z per 96 essendosi satto x = z, e gli altri quattro saranno le TK avute dall'inges tersecazione delle due Curve, divise parimente per 96. imperciocchè alzate le MT perpendicolari al diametro DB del' Cerchio, che passino per i punti dell'intersecazione, e prolungate, se fa bisogno, sino sulla retta KGK, sulla quale è il, principio delle z, a vremo tanto dal Cerchio, che dalla Parabola due valori

lori KT positivi, cioè il primo, e l' ultimo, o il più vicino, ed il più lontano dal vertice I della Parabola, e l'altri due negativi. E che sia così è chiaro, mentre nel Cerchio all' ordinate q. dovendosi aggiungere 136818a per avere le z, cioè alle MT le MK per avere le KT, averemo il primo KT positivo, sottraendo dalla MK positiva la MT negativa, e si avranno l'altri due, cioè secondo, e terzo, KT negativi, se dalle MT negative si levino le MK positive, e si avrà l' ultimo KT positivo, levando dalla MK po-sitiva la MT negativa, se la Parabola taglia il Cerchio sotto il punto B, o aggiungendo alla MK positiva la MT positiva, se lo taglia di fopra del punto B. Nella Parabola ancora, dovendosi alle q aggiungere 18a per avere le  $\infty$ , cioè alle  $NT_1$  le NK per avere le KT, è chiaro, che avremo la prima, e l' ultima KT positive, levando dalla NK positiva la prima NT negativa, ed aggiungendo all' ultima NT positiva la NK positiva, e avremo la seconda, e la terza KT negative, sottraendo dalle NT. negative le NK positive. Onde le TK avute nel Cerchio, sono l'istesse, che quelle avute nella Parabola.

Per vedere ora se fra quattro valori, che abbiamo da questa sinale Equazione per mezzo dell' intersecazione delle due Curve, ve ne sia alcuno eguale a due dati dall' altra Equazione per le tre linee, bisogna mettere in confronto questi con quelli. E per ciò sare sarebbe necessario aver i veri valori, ed espressi in quantità commensurabili, ma non potendosi aver tali, si prenderanno altre quantità in vece de i veri valori,

che da essi sian poco differenti, come ora faccio.

Il valore negativo GN potrà prendersi =  $\frac{383a}{708}$ ,

M m che

che sarà minore del vero di una piccolissima quantità, la quale è minore di a . E per vederlo, supposta la  $GN! = 383\alpha$ , sarà nel Cerchio ZNB Fig. 2. la 768 4 6 HN = 383a + HG = 383a + 43a = 16895a. E poi-768 chè HN2 è eguale al rettangolo BHZ, e questo è eguale al quadrato di AB - AH<sup>2</sup>, farà AH<sup>2</sup> eguale AB<sup>2</sup> -HN2, e fatto il quadrato di HN, che è 285441025aa, 589824 farà AHz = 1938aa - 285441025aa = 328803aa, e 589824 AH = y328803aa. Parimente nella Parabola DNF 589824 farà NR = TT - NG = 7a - 383a = 2305a, e fatto il quadrato di NR, che è 5313025aa, avremo 589824 = 5313025a, e RT = DT - DR = 49a589824 DE 1912319a. Ma essendo AH = RT-589824 AC, se fosse NG = 383a, sarebbe la γ328803aa = 1912319a - 5a, cioè = 437759a; e se 589824 2 589824 589824 383a è minore di GN, sarà la y 328803 aa maggiore di 768 589824 437759a, poichè se 383a è minore di NG, ancora 768 589824 16895a è minore di HN, e consequentemente la y 3 2

1328803 aa è maggiore di AH. e nella Parabola avre mo 2305a maggiore di NR, e 5313025a maggiore di DR, e però 437759a minore di RP - AC, e minore di AH. Ma la 1/3 2880 3 aa è maggiore di AH; 589824 dunque sarà maggiore ancora di 437759a, come in fatti lo è. Poichè quadrando l' uno, e l' altro, e poi riducendo al comun denominatore si vede chiaramente, che il quadrato della suddetta radice, cioè 193946900672aa è maggiore del quadrato di 437759a, che tè 191632942081aa. Sicchè GN è maggiore di 383a Che poi la differenza tra 383a, e GN sia minore di a, lo provo così. Se questa disferenza non fos-1530 se minore di a, potrebbe essere GN = 383a + a =1536 767a, ed allora sarebbe HN = 43a + 767a = 33791a, ed essendo  $AH = \gamma AB^2 - HN^2$ , sarebbe = VI247221aa. Così nella Parabola sarebbe NR = 9609a, e RP - AC = 49a - il quadrato di 4609a,

1536

diviso per il parametro, - 5a cioè = 1760255a, e poiche RP - AC è = AH sarebbe la V1247231aa 1760255a; ma quadrando ambi questi termini, e ri-2359296 ducendo al comun denominatore si trova, il quadrato del primo termine, cioè della radice esser minore di quello dell' altro termine; dunque GN non è = 767a, ma bensi minore, come facilmente puo , 1536 vedersi, se si considera, che supposta GN minore di 767a la y 1247231aa è minore di AH, e 1760255a 2359296 1536 è maggiore di RT - AC L' altro valore positivo Il si puo supporre = 875a, che è minore del vero di meno, che di a. im-1536 perciocche supposta la 27 = 875a, sarebbe nel Cer-· 153 chio la KT = CT - 875a = 32149a, ed AK = alla radice di 1938aa -il quadrato di 32149a, cioè = 1536 V109520711aa. E nella Parabola sarebbe la LT = 2359296 PT + 875a= 6251a e DL = al quadrato di 6251a, 1536 1536 diviso per il parametro, cioè = 39075001a, e TL † AC = 39075001a - 49a † 5a = 16071855a; eper

essere

essere AK = PL + AC sarebbe ancora la V109520711aa = 16071865a. Ma essendo la prima 2359296 2359296 maggiore della seconda è segno, che 21 è maggiore di 875a. Poichè presa 21, come maggiore di 875a, nel Cerchio l' ordinata CT - 475a è più accosto alla LK di quello, che li è l'ordinata TT † 875anella Parabola, e però deve essere la y 109520711aa maggiore di 16071865a. Che la differenza, per cui 2359296 21 è maggiore di 875a, sia minore di a, sarà chia-1536 ro, quando si dimosti, che 21 è minore di 875a † a, cioè minore di 219a. Imperocchè essendo 21 tale, sarà nel Cerchio l' ordinata CT – 219a minore di KY, ed accosto alla LK più che l'ordinata PT + 219a nella Parabola, che è maggiore di LY, e però l'intercetta tra il Centro A, e l' ordinata CT-219a nel Cerchio è minore della AC † l' intercetta 384 fra il punto P, e l' ordinata TT † 2190 nella Parabola. Ed in fatti sarà l' ordinata CT - 219a = 8037a, e l'intercetta tra questa ordinata, ed il Cen-384 N n tro

tro sarà = alla radice di 1938aa — il quadrato di 8037a,

il quadrato di 8037a,

cioè = y6849063aa, e nella Parabola l' ordinata TT† 219a = 1563a, e la AC + 1' intercetta fra il punto T, e l' ordinata TT + 219a farà = 5a + 1 quadrato di 1563a, diviso per il Parametro — 49a,

cioè = 1005273a, che chiaramente puo vedersi esser maggiore dell' intercetta tra il Centro, e l' ordinata TT - 219a; onde la T0 è minore di T19a, e maggiore di T19a; onde la T1 è minore di T19a, e T19a; onde la T2 è minore di T19a, e T19a; onde la T2 è minore di T19a, e T19a; onde la T2 è minore di T19a, e T19a;

Ritrovati i valori prossimi dell' Equazione per le tre, resta ora di ritrovare quelli per le quattro; ma in questi non curerò quella prossimità, che ho curato in quelli, mentre basta solamente, che io faccia vedere, che di questi non ve ne sia alcuno eguale a quelli.

Dico pertanto, che il valore KT più vicino al vertice I della Parabola Fig. 5. TIT, è minore di 47a. Si rifletta, che essendo 47a maggiore di KT,

nel Cerchio l' intercetta tra il Centro A, e l' ordinata corrispondente F2 - 47a sarà maggiore dell' in-

tercetta fra il punto S, e l'ordinata corrispondente RQ - 47a nella Parabola, ma appunto, calcolando

al solito, nel Cerchio l' intercetta tra il Centro, el'

dinata F2 – 47a è la y300568659aa, e nella Parabola l' intercetta tra il punto S, è l' ordinata R247a è = 6946:a, e la prima è maggiore della seconda; dunque 47a è veramente maggiore di KT.

Parimente la seconda KT è minore di 47a. Poichè per mezzo de' soliti calcoli si trova nel Cerchio l' intercetta tra il centro, e l' ordinata MK † 47a
eguale alla y197681523aa, e nella Parabola l' intercetta tra il punto S, e l' ordinata NK † 47a eguale
a 55927a, e la prima intercetta maggiore della seconda; come deve essere, perchè la seconda KT sia
minore di 47a.

La terza KT poi è maggiore di 24a; imperciochè  $NK \dagger 24a$  è = 42a, il quadrato della quale considerata, come ordinata alla Parabola TIT, diviso per a, che è il Parametro della medesima, ci darà la respettiva ascissa = 1764a, che è minore di IS, e però 42a è minore di SX, e 24a minore di GX. Ma si vidde, che la Parabola taglia il Cerchio ancora dopo il punto E, che ci da il terzo valore, dunque 24a tanto più è minore della terza KT.

Per fare il confronto delle x dell' Equazione per le tre linee della Progressione Aritmetica colle x di quella per le quattro, essendosi fatto nella prima

x = y, e nella seconda x = z, i valori prossimi della prima dovranno dividersi per 4, ne in questa maniera si accresce punto la differenza, che è tra i prosfimi, ed i veri, ma più tosto si diminuisce, e le quantità prese per paragonare quelli della seconda si divideranno per 96, giacche così non si altera niente il confronto. Sicchè i due della prima Equazione, cioè 383a, e 439a divisi per 4, saranno 383a, e 439a, 768 768 e quelli della seconda, due cioè 47a, è divisi per 96, saranno i due 47a, e l'altro a, che ridotti al comun denominatore con quelli della prima, saranno i due 376a, e l'altro 768a. Si provò a die-3972 tro, che i due valori prossimi della prima Equazione erano minori de veri, ed i due primi della seconda maggiori de' veri, cioè quelli della prima uno 383a, e l' 307 2 altro 439a, ed i primi due della seconda 376a; ma quelli sono maggiori di questi: dunque molto più i veri della prima saranno maggiori de' veri della seconda : Il terzo poi della seconda si provò minore del vero, e quantunque i due della prima siano minori de' veri lo sono però di una quantità minore di a. 1536 Onde i veri della prima, benchè maggiori uno di 383a, e l'altro di 439a, saranno nondimeno mino-3072

ri del terzo della seconda Equazione, perchè i pros-

fimi

simi della prima sono minori di 768a, che è minore

del terzo vero della feconda, di una quantità assaimaggiore di a. Il quarto valore della seconda non si è

considerato, mentre chiarissimamente si vede esser mag-

giore del terzo, ed in conseguenza di tutti.

Dovrà dunque concluders, che nessun valore de quattro dell' Equazione per le quattro linee è eguale a nessuno dei due dell' Equazione per le tre, e per il discorso satto più sopra, i punti per le tre linee della progressione aritmetica non servono non solo per le quattro, ma nè per le cinque, nè per le sei, nè per altre di maggior numero; e che nel raggio prolungato del quadrante non vi sono, che due punti, dai quali si possano tirare a parti eguali dello stesso Quadrante solo tre linee, e non altre, le quali stiano in Progressione Aritmetica.

Io non considero i valori, che mi danno il centro avuti da ambedue l' Equazioni, benchè questo sia uno di quei punti, dal quale tirate a parti eguali un numero infinito di linee, queste stanno nella suddetta Progressione, non essendo questo uno di quei punti, che si cercava, mentre a tutti è ben noto, che nel

Centro quelto punto è tale.

Quelto Problema mi fu proposto nella maniera divisata dall' Illustre Autore della Porta Armonica, per regolare il punto, dove attaccare un certo suo Cor done, di cui egli parla alla pag 150. di questo Volume.

Si potrebbe per altro ricercare il domandato punto secondo il medesimo Autore anche in una linea BE Fig. 6. perpendicolare al piano del Quadrante al punto B, e così facendo, l' Equazione va a finire in una lineare.

Poi-

Poichè se si chiami BE = x, BD corda dell' ottagono =  $\sqrt{2aa}$ — aa y 2 BC corda del quadrante =  $\sqrt{2}$ , sarà DE = yxx + 2aa— aa y 2, EC = y2aa + xx; sicchè l' Equazione sarà x + yxx + 2aa = 2 yxx + 2aa— aa y 2; alla quale facendo le debite operazioni, resta finalmente  $x = \frac{1}{2} y + \frac{1}{2} y^{200720a} + \frac{1}{2} 48aa$ ; Di cui per esser

facilissima la costruzione la ometto per brevità; si vede però, che in questa si hanno due soli valori della x, e questi eguali, uno positivo, e l'altro negativo. Se poi si faccia l' Equazione per quattro, la cui finale sarà  $x = \frac{1}{3aa + 5aa} \frac{1}{3}$ , nella quale quattro sono

i valori della x due positivi, e due negativi, facilmente si puo vedere, che frà questi non ve n'è uno; che sia eguale a nessuno de i due valori della sopra
accennata sinale Equazione per le tre linee. Laonde si
vede succedere nella perpendicolare ciò, che si è veduto avvenire nel raggio prolungato, cioè che ripetendo
su i valori avuti nella perpendicolare il discorso, che si
è fatto su quelli avuti nel raggio prolungato, si troverà, che anche nella perpendicolare non vi è che due
punti, da cui si possano tirare che tre sole linee ai
tre punti del quadrante diviso in due parti eguali, le
quali linee siano in progressione Aritmetica, e se si
volesse dire che nella perpendicolare al piano del quadrante vi sono vari punti, dei quali uno serva per
dieci linee, uno più lontano per cento, ed un altro
più lontano di questo per altre di maggior numero,

e così all' infinito, cioè se si prenda il punto per le dieci si dicesse, che dividendo il quadrante in nove parti eguali, e da esso tirando le dieci linee, queste fossero in progressione Aritmetica, e che dividendo il quadrante in un numero qualunque di parti vi sosse su questa perpendicolare un altro punto, dal quale tirate tante linee ai punti delle divisioni, queste sossero tutte in progressione Aritmetica, che tutto ciò non possa succedere, si è di sopra bastantemente dimostrato. La svantaggio poi che si ha a prendendimostrato. ciò non polla succedere, si è di sopra bastantemente dimostrato. Lo svantaggio poi, che si ha a prendere il punto sulla linea BE perpendicolare al piano del quadrante, si è, che la differenza tra il primo, ed il terzo termine, è assai minore di quella, che è fra il primo, ed il terzo termine, quando il punto si prende nel raggio prolungato del quadrante, e noi sappiamo, che per la Porta Armonica è necessario, che questa differenza sia grande, e si accosti più che è possibile alla corda BC del quadrante.

lo oltre a ritrovare il punto nel raggio prolungato potrei trovare tutti i punti possibili anche nelle parallele ad esso, da i quali tirate le tre note linee sossero sempre in una progressione Aritmetica, e questo luogo sarebbe, a mio credere, una Curva, che passerebbe certamente per il punto E già titrovato, e di cui la finale Equazione sarebbe la seguente,

 $16y^6 - 32xy^5 + 48xxy^4 - 64x^3y^3 + 48x^4yy - 32x^5y + 16x^6$  $+88ay^5 - 168axy^4 + 192axxy^3 - 192ax^3y$   $+104ax^4y - 24ax^5$ † 183aay 4- 292aaxy3 † 186aaxxyy- 132aax3y † 39aax4 -20a5x

ILFINE

Le x s' intenderanno prese sopra una linea perpendicolare al raggio nel punto D Tav. 9. Fig. 1. e la Curva si potrà ritrovare con i metodi insegnati dal grande Eulero nella sua Introduzione all' Analisi dell'

Infiniti, e da altri Analısti.

## INDICE

Α	
A Cido universale trovasi sparso da per tut-	
A to nella Natura pag.	- 85.
Acqua acida della Merfa Savioli.	17.
Acqua Borra, minerale, nelle vicinanze di	
Siena, e Scrittori, che ne hanno fatta menzione.	44.
Sue qualità.	45., e 46.
Acqua di S. Casciano bevuta coll' aggiunta del	
Sal marino, o di altri simili purganti.	104.
Acqua termale, e quantità di essa, che si può	
bere in ciascun giorno.	102.
Acqua veicolo universale.	II.
Affusioni varie fatte nell'Acqua Borra, e loro	
effetti.	53•
Affusioni fatte nella Termale di S. Casciano	
dell' olio di Tartaro, del Sal di Tartaro, e	
del Sale ammoniaco,	
Del Sublimato corrofivo,	
Dell' Allume,	
Dello Spirito acido di Aceto, di Nitro, di	
Sale, e di Vetriolo, e loro effetti.	89,, e 90.
Del Latte finalmente, e del Sangue, e loro ef-	
fetti Nell' aggiunta in fine.	
Alcalı nativo minerale nell' acqua Borra.	54.
Sua natura.	56.
Amianto della Rocca Tederighi.	- 35.
ARDUINO GIOVANNI.	7.9.10.16.20.
Argilla matrice della Miniera di Rame della	
Mersa di Prata.	5.
Argilla base del Quarzo, o Cristallo di monte.	13.
Argilla base della Lavagna talcosa.	15.
Aigilla bianca, e nera con miniera di Rame,	
e Marcassite di color d'oro della Piaggia	
Ansedonia.	25.
Aritmetica Progressione. Vedi Progressione.	
Arsenico si mescola con i metalli.	11.
ARRIGHI ANDREA, Istoria della fua Malattia	176.
В	•
Bagni di S. Casciano, e loro scelta,	104,
О о	BA-

9	6	6
-	$\sim$	•

BASTIANI JACOPO FILIPPO, e fua opi-	
nione intorno alle Terme di S. Casciano.	79., e 80.
BECCARI.	68.
Bevanda giornaliera dell' acqua termale ripar-	7 -
tita in certe moderate dosi.	101.
Bevute, e lavande delle termali in che tempo	
della giornata debbono usarsi.	106.
BIRINGUCCIO VANNOCCIO.	9.
BOERAAVE, sua opinione intorno a i Sali	
alcalici esaminata.	55.
Bollore alzato piu tardi nella Termale di S.	
Casciano, che nell' acqua fresca di un poz-	-
zo, o piovana.	77., e 89.
Bollore nell' acqua Borra alzato piu presto.	77•
BUDDEUS, fua opinione intorno alle offifi-	
cazioni preternaturali del Corpo Umano.	188. in not.
Colominana Madi Diana	
Calaminare. Vedi Pietra	
Calamita, periodo diurno della sua declina- zione.	0.0
	107.
Metodo, con cui è stato osservato. Tempo della massima, e minima declinazione,	108.
e differenza tra esse.	
Calore della Termale di S. Casciano, e suoi	119, e 121.
gradi.	86., e 87.
S. Casciano, descrizione del suo suolo.	81., e 82.
Abbondante di acque termali.	83.
Descrizione de' suoi Bagni, e loro uso par-	
ticolare.	86.
Cave della Porta al Ferro.	27,
Cave di Rame della Merfa di Prata.	2.
Ceruleo, e Verde montano del Cagnano.	4 22.
China china, e suo Magistero maniera di	
usarne nelle febbri suppuratorie.	180.
COCCHI ANTONIO	96.
Concrezioni preternaturali. Vedi Morgagni.	
Convulzioni, e dolor di testa continuo ac-	
compagnate da una ossificazione della falce	
messoria.	190.
Se siano, o no queste malattie derivate dalle	
fuddette Offificazioni.	190. in not.
- O	pi-

	267
Opinione di Morgagni su tale articolo.	191 in not.
Coronopo marittimo.	78.
Coste, loro eccessiva fragilità.	:18:2.
CRELLIO, suo sistema intorno a una delle car	1-
fe delle concrezioni preternaturali del Cor-	
po umano.	189. in :not.
Cristallo di Monte, suoi primi rudimenti.	6.
Cuore, sua membrana muscolare diventata	01
	or in mot
Osfea.	185. in not
D 11 1 1 1 1 1 0 1 m in P	
Declinazione della Calamita in Roma.	124.
In Parigi.	12.5.
Differenza media del calore, che concepifce	
un Corpo, come sarebbe il Mercurio, quan-	
do ha la superficie bianca da quando l' ha	
ncra ·	r30.
La Doccia della Termale di S. Casciano to-	•
glie nelle ferite il dolore, e ferma l'emor-	
ragia.	99.
Docciature delle Termali di S. Casciano co-	27
me, e quando debbano praticarsi.	105.
Dura madre attaccata renacemente al Cranio.	182.
Se sia naturale, o nò la Coessone suddet-	3040
	, e seq. in not.
Opinione di Palfin, e di Pareo su tal articolo	
E E	103.111 1101.
_	
Effetti di varie affusioni fatte nell' Acqua Bor-	
ra, e nella Termale di S. Casciano. Vedi	
Affusioni.	
Esame delle grume depositate dalla Termale	
di S. Casciano, in cui si dimostra esser le	
medesime un Composto di terra alcalica, e	
di ocra.	96. e seq
Esperimento per conoscere, se i raggi solari	
traversano la superficie nera di un Corpo.	127.
F	
Ferro esistente nell' Acqua Borra.	70.
Flogistico compartisce lo splendore a i Metalli	•
Forni per fondere il Rame del Botro a Ca-	
gnano.	18.
ŏnano •	

268 G		
Gabbro verde, e nero con Talco della Rocca		
Tederighi.	34	
Galla, sua polvere insusa nella Termale di		
S. Casciano la colorisce di giallo, che si		
cangia in un colore di rose asciutte, se vi		
fi aggiunga lo spirito di Vetriolo.	90	
Giulebbo di viole colorisce di verde la Ter-	Ĺ	
male di S. Casciano.	90	٥.
Gravità specifica della detta Termale, e sua		_
proporzione.	88	8.
H		
HILDANO FABRICO, fua opinione intorno	0	
	183. in 1101	t.
HILL, sua osservazione intorno alle Marcassite		
cubiche.	4	4
Incomposite della finima al di dentro mello		
Incurvamento della Spina al di dentro nelle vertebre de i lombi.	182	,
Infiammazioni, e suppurazioni producono	102	. •
alle volte delle concrezioni osse, special-		
mente nelle arterie.	189. in not	t.
Opinione di Morgagni intorno al suddetto	209. 13	
filtema.	Ibio	d.
L		
Lagoni di Travale	3 1	1.
Latte minerale.		7.
Lavagna talcofa.	2	3.
Lavagna talcosa base visibile de i Monti.	9	9.
Lavagna talcosa indizio di Miniera di Ra-		
me.	.5	ą,
Lavagna talcosa resiste alla violenza del fer-		
ro .	10	
Lavagna talcosa è vetriscibile.	10	۰ر
M MAIRAN Confirments and Const		
M: DE MAIRAN, suo sentimento verificato		<b>^</b> _
circa l'acqua gelata falata.	50	•
Marcassite cubiche della Cava della Mersa di Prata.		2 -
Marchassita Botryites di detto Luogo.		3• 3•
Marchassita tubolosa di detto luogo.		) ·
Marchassite, loro composizione	4	
N. A. C. Componenting	Lat-	

	269
Marcassita di ferro, e di rame.	4.
Marcassite del Vadino.	26.
MARGGRAFF, sua scoperta intorno allo Zinco.	16.
Matrici della Miniera del Rame della Mersa di	
Prata.	5.
Meningi, loro insensibilità.	201.
Menyngophylax, Istromento della Chirurgia	
nocivo nell' operazione del Trapano	184. in not-
Mese il più piovoso in Siena quale sia.	226.
Metalli, loro composizione	11.
Minerali della Fossa di Colle pelato.	26.
Miniera di Rame del Botro a Cagnano.	
Miniera di Rame del Botro de' Cani.	17.
	25.
Miniera di Rame di Gretaja.	26.
Miniera di Rame della Fonte Grilli.	26.
Miniera di Rame del Vadino.	26.
Miniera di Rame della Rocca Tederighi.	34.
Miniera di Ferro de' Gorgoni.	29.
Miniera di Allume della Rocca Tederighi.	36
Miniera di Vetriolo in terra nera del Botro	
Mulinello.	25.
MORGAGNI, sua opinione intorno alle con-	
crezioni preternaturali, che talora s' incon-	
trano nel Corpo umano. 188.	, e feg. in not.
Muri, loro resistenza contro la spinta de'	
Terreni.	158.
Musica composta in modo di Canone retto,	
retrogrado, e reciproco fra le parti.	148.
N	
NAPOLITANI ACCADEMICI, loro offerva-	
zione fopra il Sale del Vessuvio.	51.e 52.
0	
Ossi piccoli ritrovati entro un rene: Descri-	
zione de' medesimi perche meritassero di	
esser chiamati Osi . 187.,	e 188. in not.
Ossi preternaturali ritrovati nella falce Mes-	
foria:	185., e feg.
Loro descrizione	189.,e 190.
	109.,0 1900
Ossificazioni preternaturali del Corpo Umano. Vedi Buddeus.	
rear Dundens.	DATUIN

270 P	
PALFIN, sua opinone intorno alla dura Madre.	183. in not.
Palma, o Mano marina de' Botanici, sua de-	203, 111, 110, 10
fcrizione.	222.
PAREO AMBROGIO, sua opinione intorno	1
alla Dura Madre.	183, in not.
M: PASCHAL, sua obiezione vana a M: du	J11 11011
Clos, ed agli altri Accademici Parigini.	49., e 51.
Petrificazioni del Poggione.	27.
Petrificazioni della Porta al ferro.	29.
Piante trovate nelle vicinanze di Prata	41.
Pietra Calaminare contiene lo Zinco.	16.
Pietra Calaminare unita alla Miniera di Rame	
di Pozzoja. e del Poggio alle Cave di Maf-	
sa di Maremma.	16.
Pietra Calaminare delle Miniere di Rame del-	
la Mersa.	16.
Pinguedine ritrovata in gran copia nel cada-	
vere di un Convulsionario.	181.
Piogge, osfervazioni della loro caduta in Siena	
da chi son fatte.	225.
PORT ENRICO.	66.
Porta Armonica.	332.
Parti esterne del primo modello.	133.
Parti interne del primo modello.	137.
Parti interne del fecondo modello.	143.
Problema spettante alla detta Porta Armonica.	151.
Sciolto.	235. e seq.
Progressione Arimetica. Non essere nel raggio	
prolungato del Quadrante che due punti, da	
cui si possano tirare tre sole linee all' arco	
del medesimo Quadrante, diviso in due par-	
ti eguali, che siano in Progressione Aritme-	
tica.	261.
Potersi dare quattro linee, in cui si verisi-	
chi, che la somma dell' estreme è eguale	
alla somma delle medie, ma che non siano	
in Progressione Aritmetica.	243.
I valori, che si hanno, quando si cerca,	
se nel raggio prolungato sia un punto, da cui si possano tirare all' arco del Quadran-	
cui si possano tirare all' arco del Quadian-	
te, diviso in tre parti eguali, quattro linee,	
che	

	278
che siano in Progressione Arimetica, essere	,
affatto diversi da quelli, che si hanno per	
tre linee	261.
Nella perpendicolare al piano del quadrante	
non essere, che due punti, da cui si possano	
non encie, the due puner, da cui n ponano	
calare al quadrante diviso in due parti egua-	
li tre sole linee in Progressione Aritmetica.	262.
Credersi falsamente da chiunque credesse, che	
nella perpendicolare al piano del quadrante	
possano essere vari punti, dai quali si possano	
tirare all' arco dell' istesso Quadrante, di-	
viso in parti eguali, varj numeri di linee,	
che siano in Progressione Aritmetica.	262., c 263
Vantaggio, che si ha dal prendere il ricer-	- , 3
vantaggio, che il ha dai prendere il licera	
cato punto nel raggio prolungato, che non	
si ha dal prenderlo nella Perpendicolare al	
piano del Quadrante.	263.
	203.
Purganti, ed altri rimedj non sempre necessarj	
per preparare il corpo di chi intraprende l'	
uso delle Termali.	ToI.
alo delle Terman;	101.
Q	
Quarzo, o Cristallo di Monte, matrice della	
Miniera di Rame della Mersa di Prata.	5.
	6.
Quarzo, indizio di Miniere.	0•
Quarzo non si unisce intimamente colle materie	
Metalliche.	12.
R	
Raggi Solari traversano la nera superficie di	
un Corpo.	129.
Rene sinistro, sua configurazione straordinaria	18 7. in not.
Off ' ' 1 11 1 1 Constitution	
Ossificazioni delle parti interne del medesimo.	ibid•
Reni, descrizione di una stravagante malattia	
	, 186. in not.
	, 100. 111 110.
Risposta, che NeWton propone nel fine del-	
la fua Ottica.	126.
Rocca Tederighi.	
POOMITIVE Chin - OL 16	34°
ROONHUYSE, Chirurgo Olandese.	183. in not.
S	
Sale alcalico dell' Acqua Borra.	<sub>fe</sub> 48.
Sale alcelico dell' Anno Denne differente del	j. 40.
Sale alcalico dell' Acqua Borra differente dal	
Sale di Tartaro.	55.
Sa <sub>*</sub>	1
21.	1

272	
Sale alcalico nativo base del Sal Marino.	56.
Sale amaricante in gleba con marcassite del	,
Cagnano,	21.
Sale concavo piramidale.	63.
Sale marino dell' Acqua Borra.	
Sale felenitico.	46.
	73.
Sasso peperino della Rocca Tederighi.	34.
Sasso serpentino della Rocca Tederighi.	34.
Scioglimento di corpo è un fegno fatale della	
morte vicina nelle malattie inveterate de'	
nervi.	182.
Sedimenti ricavati dalla Termale di S. Cascia-	
no per mezzo della evaporazione, e loro	
natura.	90, , e feg.
Specchietti Selenitici ritrovati ne' fedimenti	,
fuddetti, e loro cagione.	93•
Perche questi sedimenti, che si riducono a una	
terra alcalica pestati insieme col Sale ammo-	
niaco non producono, come doverebbero, al-	
cuna esalazione, che sappia di orina.	94.
Acido contenuto nel Sedimento Selenitico,	
è di natura vitriolica, o suflurea.	93
Maniera di ricavare un Sal terzo dal detto	
fedimento.	93.
Proporzione di questo Sale con quello che	- 3
ricavasi dalle Termali Pisane.	96.
Selenite de' Lagoni di Travale.	33.
Sentenza di Ippocrate intorno a i grandi, e	2,5
frequenti svenimenti senza manifesta cagio-	
ne confermata.	196.
Spato lenticolare della Rocca Tederighi.	37.
Spirito acido minerale dell' Acqua Borra.	67.
Spirito acido volatile contentuto nella Ter-	,
male di S. Casciano.	84.
Spirito minerale volatile è la parte piu attiva,	•
e operante, che in se contenga la Terma-	
le di S Cafciano.	98.
Stagione dell' anno la piu piovosa in Siena	90.
quale sia, e quale la piu scarsa al contrario	
di quello, che ayviene in Parigi.	226.
TA_	220

## <sup>274</sup>COSE DA AGGIUNGERSI, E CORREGGERSI.

Alla pag. 90. dopo il verso 24. si aggiunga = Provai finalmente, se rimescolando colla Termale del latte, e del sangue comparisse in questi due liquori mutazione alcuna sensibile, onde si potessero dedurre quegli effetti immediati, che si producono da essa introdotta nel nostro Corpo. E primieramente osservai, che il latte rimesco. lato con essa non dava alcun contrassegno di ribollimen. to, nè cangiava punto di colore, ma persisteva nella sua candidezza natia, conservandosi fluido, e dolce, e sin dopo trent' ore, entro lo spazio delle quali anche allungato con qualche porzione di acqua comune si coagulava, ed inacidiva. Sicche null' altra differenza sep. pi rinvenire fra il latte naturale, e quello mescolato colla Termale fuori che questo si era ricoperto in superficie di un velo butirrofo di qualche confistenza. Mutazione di piu importanza offervai nel sangue di un Pleuritico, rimescolato che fu colla Termale suddetta. Perocchè questa impedì in esso non solo il naturale suo confueto accagliamento, ma quella crosta codennosa ancora che vi suol comparire poche ore dopo estratto dai vasi, essendosi mantenuto sin dopo tre giorni sempre fluido, porporino, e senza il minimo contrassegno di vicina putrefazione. =


Alla pag. 8. lin. 30. si levi il periodo, che comincia = In qualche luogo = sino a = Esistenti in quel letto =

	Errori		Correzzioni
pag. 17. lin. 16.	tal cosa		talcofa
pa8. 34. lin. 31.	della		- dalla
pag. 40. lin. 22.	di profonde	dą	profonde
pag. 52. lin. 21.	· di filvio		di Silvio
pag. 98. lin. 16.	esprimenti	ei	perimenti
pag. 105. lin, 24.	effectas.		affectas
pag. 115. a i 17. Novembre alle ore una, e trè			
	71. 0. 71. 0	70.	0. 70. 0.
pag. 226. lin. 3.	linnee		linee


pag.255.lin.16. HN2


6582076944

















Corde di Bude	llo Gr	offezza	e Lung	ghezza	delle re.	spetliv			)		segn a	to nel	la Ta	vola	Secor	ıda .	$\sim$ $\cdot$	
Qualità delle Corde.	Core	le da Viola	ncello	Corde da Violino												Corde da Chitarra		
	Des	eta Second	e grolle Te	ordin	la Sol.r arie	Dette più S	un poco	Seco	nde	Dette Sott	più ili	Canti da	ni ord Violin	inarj	Canti	ni Soti ne fili	ili a	
uno hazza della Corda mi Braccio Frorentino divini in 2	urate Sold	Soldi .	Soldi. S	olde Sol	di Soldi	Soldi	Soldi	Soldi.	Soldi.	Soldi	Soldi	Soldi.	Soldi	Sold i.	Soldi	Soldi.	Sold	
Iom: delle Corde e Tin	Fa.	. Si.1.	Ut.I. F	a.2 So	I.2 La.2	Si.2	Ut.2	Re.2	Mi. 2.	Fa.3	Sol.3.	La.3.	Si.3.	Ut.3.	Re.3	Mi.3	Fa. 4	
	-						-	^										
Fig.2.	C							X-	1				-6-	-	-			
113.2.								1	-									
													- 1					













TAVOLA.V. Sol. Fa.mi. re. ut. si. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Scala di Braccia due Fiorentine.


## PORTA ARMONICA.



DE' MURI CONTRO LA SPINTA DE TERRENI.







RESISTENZA DE MURI CONTRO LA SPINTA DE TERRENI

